

Zur floristischen Struktur
der Pflanzengesellschaften in der
Waldstufe des Nationalparks Berchtesgaden
und ihrer Abhängigkeit vom Standort
und der Einwirkung des Menschen

Michael Storch

Diss.
München
1984

Zur floristischen Struktur der Pflanzengesellschaften
in der Waldstufe des Nationalparks Berchtesgaden
und ihrer Abhängigkeit vom Standort
und der Einwirkung des Menschen

Dissertation
der Fakultät für Biologie
der Ludwig-Maximilians-Universität München

vorgelegt von Michael Storch
aus München

Januar 1983

1. Berichterstatter: Prof. Dr. P. Seibert

2. Berichterstatter: Prof. Dr. D. Podlech

Tag der mündlichen Prüfung: 31. 7. 1984

DISSERTATIONS - UND FOTODRUCK FRANK GmbH
8000 München 2, Gabelsbergerstraße 15, Tel. 2809090

Vorwort

Die Anregung zur pflanzensoziologischen Analyse und Kartierung der Wälder Berchtesgadens gab wohl erstmals KÖSTLER (1950). Trotzdem ist nach wie vor weder aus dem Berchtesgadener Raum noch aus dem ganzen bayerischen Kalkalpengebiet eine umfangreichere großmaßstäbliche Kartierung der Waldvegetation bekannt geworden. Allgemein scheinen neue vegetationskundliche Arbeiten in diesem Bereich nicht vorzuliegen. Frühere Untersuchungen durch H. MAYER waren mehr daraufhin ausgelegt, einen Gesamtüberblick über die natürlichen Waldgesellschaften des Berchtesgadener Landes zu erhalten. Sie erfaßten deshalb vorwiegend naturnah ausgebildete Bestände und erstrebten keine flächendeckende Erfassung aller, auch der weniger charakteristischen und insbesondere der anthropogen veränderten Gesellschaften, was aber im Rahmen von großmaßstäblichen Vegetationskartierungen unumgänglich ist.

In ähnlicher Weise konnte auch LIPPERT (1966) bei seiner Bearbeitung der Pflanzengesellschaften des ganzen Naturschutzgebiets Berchtesgadens nicht den Vollständigkeitsgrad in der Erfassung der Vegetation anstreben, wie er für eine Kartierung auf dem Niveau der kleinsten floristisch auszuscheidenden Einheiten nötig ist. Vor allem wurden die Wälder hier nur am Rande und ohne besondere Berücksichtigung anthropogener Einflüsse behandelt. Der Maßstab der erarbeiteten Vegetationskarte ist mit 1:25000 relativ klein und ermöglicht deshalb nur die Wiedergabe komplexerer, mehr physiognomisch charakterisierter Einheiten.

Recht kurz werden die Wälder, und hier v.a. die Hauptwaldgesellschaften, auch bei H.W. SMETTAN (1981) abgehandelt, der die Pflanzengesellschaften des nahegelegenen Kaisergebirges untersuchte. Die Gliederung erfolgte dabei im Sinne von H. MAYER vorwiegend nach Baumarten. Besonderes Gewicht auf anthropogene Einflüsse wird auch hier nicht gelegt. Der Maßstab der Vegetationskarte SMETTANs kann in Anbetracht des ausgedehnten Untersuchungsgebiets wie bei LIPPERT 1:25 000 nicht überschreiten.

Ausführliche pflanzensoziologische Untersuchungen liegen über die Wälder anderer Alpentteile vor. Hier ist zunächst KUOCH (1954) zu nennen, der die Wälder der Schweizer Alpen im Verbreitungsgebiet der Weißtanne bearbeitete. Die Wälder am Alpenostrand untersuchte ZUKRIGL (1973). Die beiden Arbeiten schließen allerdings keine Vegetationskartierung ein.

Die vorliegende Arbeit über die Wälder Berchtesgadens beschränkt sich auf einige ausgewählte, vorwiegend im Nationalparkbereich liegende Teilgebiete. Sie berücksichtigt in besonderem Maße, allerdings nur, so weit es die Methodik der floristischen Analyse der Vegetation nach BRAUN-BLANQUET erlaubt, die direkte und indirekte Beeinflussung der Vegetation durch den Menschen. Zwar wurde das Gebiet um den Königssee bereits 1910 zum Pflanzenschonbezirk und am 18.7.1978 zum Nationalpark erklärt. Trotzdem sind speziell die Wälder in Berchtesgaden stärker durch menschliche Tätigkeit verändert als in manch anderen Teilen der bayerischen Alpen. Ursache hierfür sind v.a. die umfangreichen Salzvorkommen des Gebiets, deren Nutzung in früheren Jahrhunderten große Mengen Holzes erforderte. Daneben ist auch die Weidebelastung der Berchtesgadener Wälder ausgesprochen hoch. Für Maßnahmen zur Rückführung der Wälder des Nationalparks in einen möglichst naturnahen Zustand, aber auch für die weitere Nationalparkforschung mag die vorliegende vegetationskundliche Bestandsaufnahme als Planungsgrundlage dienen.

Zu Dank bin ich in erster Linie meinem verehrten Lehrer Herrn Prof. Dr. P. Seibert verpflichtet, der die vorliegenden Untersuchungen anregte und betreute und eine Arbeit unter besonders günstigen Bedingungen ermöglichte.

Für Anregungen im bodenkundlichen Bereich danke ich v.a. Herrn Prof. Dr. K. E. Rehfuess. Herr Dr. H. Rodenkirchen half mir bei der Ansprache der Bodenprofile.

Herzlich danken möchte ich auch für die Hilfe bei der Bestimmung der gesammelten Pflanzen. Herr Prof. Dr. H. Hertel bearbeitete hierbei die Flechten, Herr Dr. W. Lippert die Gefäßpflanzen. Herr R. Lotto war wesentlich an der Bestimmung der umfangreichen Moosaufsammlungen beteiligt. An mehreren Tagen war ich bei Herrn und Frau Lotto zur Moosbestimmung zu Besuch und möchte deshalb an dieser Stelle auch für deren Gastfreundschaft danken.

Dem Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen und der Nationalparkverwaltung Berchtesgaden danke ich für die großzügige finanzielle Unterstützung der Arbeit. Den Mitarbeitern der Nationalparkverwaltung wie auch des Forstamtes Berchtesgaden und den Revierförstern im Untersuchungsgebiet schulde ich daneben auch für vielerlei weitere Hilfestellungen großen Dank. So war insbesondere für die kostenlose Unterkunft im Arbeitsgebiet, für Kfz-Fahrgenehmigungen,

Schiffsfahrscheine und Kartenunterlagen gesorgt und auch sonst stand man mir mit Rat und Tat zur Seite. Nicht zuletzt soll hier des tödlich verunglückten Försters der Ramsau, des Herrn Hofherr, gedacht werden, in dessen Revier ich besonders lange gewohnt und gearbeitet habe und dem ich auch manche Informationen verdanke.

Für die nicht ungefährlichen Kartierungsarbeiten danke ich den studentischen Hilfskräften A. Childs, P. Drecker, T. Feuerer, J. Knoph, X. Menhofer, G. Rambold, F. Seidenschwarz, W. Traunspurger und U. Voigt. J. Knoph stürzte bei der Kartierung ab und zog sich schwerwiegende Verletzungen zu.

Das Ablochen der Aufnahmedaten erfolgte ebenfalls größtenteils durch studentische Hilfskräfte, denen ich an dieser Stelle danken will.

Die Herstellung der Reinkarten erfolgte mit freundlicher Unterstützung durch die kartographische Anstalt des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung Landwirtschaft und Forsten. Herrn H. Seuffert vom Lehrstuhl für Landschaftstechnik der Universität München sei für die kartographischen Arbeiten herzlich gedankt, die er trotz erschwelter Bedingungen mit der denkbar größten Sorgfalt durchführte. Für die Kolorierung der Karten danke ich Frau G. Hamann und v.a. Frau E. Seibert.

Die tabellarische Auswertung des Datenmaterials erfolgte auf der EDV-Anlage des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. An dieser Stelle danke ich neben dem Personal des Rechenzentrums v.a. Herrn Forstoberrat H. Flurl, Herrn Forstoberrat F. Meyer und Herrn Dr. B. Zenke für die vielfache Hilfestellung bei der EDV-Arbeit recht herzlich. Ohne deren bereitwillige Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen, die vorhandenen technischen Möglichkeiten in einem vertretbaren Zeitraum für die vorliegende Arbeit nutzbar zu machen.

München, im Januar 1983

Michael Storch

Inhaltsverzeichnis

Seite

A) Probleme der pflanzensoziologischen Arbeit in den Kalkalpen	1
B) Methodik	2
a) Floristische Analyse	2
1. Vegetationsaufnahme	2
2. Tabellenordnung	4
3. Erfassung der Waldweide	5
b) Systematik und Namensgebung	7
c) Ökologische Zeigerwerte	9
d) Kartendarstellung	10
e) Maschinelle Hilfsmittel	12
C) Gebietsbeschreibung	13
a) Geologie	13
b) Böden	14
c) Klima	15
D) Pflanzengesellschaften	16
1. Hainlattich-Tannen-Buchenwald (Aposerido-Fagetum)	16
1.1 Subassoziationen der tieferen Lagen	26
1.1.1 Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald	27
1.1.1.1 Reine Ausbildung	30
1.1.1.2 Frangula-Ausbildung	31
1.1.1.3 Galium rotundifolium-Ausbildung	32
1.1.1.4 Soldanella-Ausbildung	33
1.1.1.5 Luzula luzulina-Ausbildung	34
1.1.1.6 Thelypteris-Ausbildung	35
1.1.1.7 Calamagrostis-Ausbildung	35
1.1.1.8 Astrantia-Ausbildung	36

1.1.1.9 Lotus-Ausbildung	36
1.1.1.9.1 Reine Lotus-Ausbildung	37
1.1.1.9.2 Lotus-Ausbildung mit Hippocrepis	37
1.1.2 Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald	38
1.1.2.1 Reine Ausbildung	41
1.1.2.2 Kiefern-Ausbildung	42
1.1.2.3 Campanula-Ausbildung	42
1.1.2.4 Molinia-Ausbildung	43
1.1.2.5 Polystichum-Ausbildung	44
1.1.2.5.1 Reine Polystichum-Ausbildung	44
1.1.2.5.2 Polystichum-Ausbildung mit Blechnum	44
1.1.3 Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald	45
1.1.3.1 Reine Ausbildung	47
1.1.3.2 Hypericum maculatum-Ausbildung	49
1.1.3.3 Chrysosplenium-Ausbildung	49
1.1.3.4 Galium rotundifolium-Ausbildung	50
1.1.4 Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald	51
1.1.5 Reiner Hainlattich-Tannen-Buchenwald	53
1.1.5.1 Eschen-Ausbildung	54
1.1.5.1.1 Reine Eschen-Ausbildung	55
1.1.5.1.2 Eschen-Ausbildung mit Impatiens	55
1.1.5.2 Fichten-Ausbildung und artenarme Buchen-Fazies	56
1.1.5.2.1 Fichten-Ausbildung	56
1.1.5.2.2 artenarme Buchen-Fazies	57
1.2. Subassoziation der höheren Lagen - Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald	58
1.2.1 Sanicula-Ausbildung	61
1.2.2 Reine Ausbildung	62
1.2.2.1 Reine Ausbildung, verarmt	62
1.2.2.2 Reine Ausbildung, rein	63
1.2.2.3 Reine Ausbildung mit Luzula luzulina	63
1.2.2.4 Reine Ausbildung mit Calamagrostis villosa	64
1.2.3 Saxifraga rotundifolia-Ausbildung	64
1.2.3.1 Reine Saxifraga rotundifolia-Ausbildung	65
1.2.3.2 Saxifraga rotundifolia-Ausbildung mit Stellaria nemorum	66

1.2.3.3 Saxifraga rotundifolia-Ausbildung	
mit Stachys alopecurus	67
1.2.3.4 Saxifraga rotundifolia-Ausbildung	
mit Calycocorsus	67
1.2.4 Erica-Ausbildung	68
1.2.4.1 Erica-Ausbildung mit Vaccinium vitis-idaea . . .	68
1.2.4.2 Erica-Ausbildung mit Selaginella	69
2. Ahorn-Buchenwald (Aceri-Fagetum)	70
2.1 Sanicula-Ausbildung	73
2.1.1 Sanicula-Ausbildung mit Calamagrostis varia	73
2.1.2 Sanicula-Ausbildung mit Stellaria nemorum	73
2.2 Reine Ausbildung	74
2.3 Luzula sylvatica-Ausbildung	74
3. Edellaubwälder (Aceri-Fraxinetum)	75
3.1 Ahorn-Eschenwald i.e.S.	75
3.1.1 Reine Ausbildung	78
3.1.2 Eschen-Ausbildung	78
3.2 Schluchtwald	79
3.2.1 Waldgeißbart-Bergahornwald (Arunco-Aceretum) . . .	81
3.2.2 Hirschzungen-Bergahornwald (Phyllitido-Aceretum) . .	81
3.2.3 Schluchtwald i.allg.	82
3.2.3.1 Tannen-Ausbildung	82
3.2.3.2 Galium odoratum-Ausbildung	83
3.2.3.3 Reine Ausbildung	83
3.3 Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft	84
3.3.1 Reine Ausbildung	86
3.3.2 Buphthalmum-Ausbildung	87
3.3.2.1 Buphthalmum-Ausbildung mit Aquilegia	87
3.3.2.2 Buphthalmum-Ausbildung mit Molinia	87
4. Auwälder	88
4.1 Bach-Grauerlenwald (Carici remotae-Fraxinetum)	89
4.1.1 Mentha-Ausbildung	89
4.1.2 Eschen-Ausbildung	90
4.2 Grauerlen-Auwald (Alnetum incanae)	90

5. Labkraut-Buchen-Tannenwald (<i>Galio-Abietetum</i>)	91
5.1 Waldschachtelhalm-Labkraut-Buchen-Tannenwald (<i>Galio-Abietetum equisetetosum sylvaticae</i>)	92
5.2 Labkraut-Buchen-Tannenwald, Reine Ausbildung	93
5.3 Labkraut-Buchen-Tannenwald, <i>Cardamine trifolia</i> -Ausbildung	94
6. Weißseggen-Fichtenwald	95
6.1 Reine Ausbildung	97
6.2 <i>Deschampsia</i> -Ausbildung	99
6.3 <i>Angelica</i> -Ausbildung	100
7. Alpenlattich-Fichtenwald (<i>Homogyno-Piceetum</i>)	101
7.1 Rippenfarn-Alpenlattich-Fichtenwald	103
7.1.1 <i>Bazzania</i> -Ausbildung	103
7.1.2 <i>Plagiothecium undulatum</i> -Ausbildung	104
7.1.3 <i>Anemone</i> -Ausbildung	105
7.2 Frauenfarn-Alpenlattich-Fichtenwald	105
8. Karbonat-Fichtenwälder (<i>Asplenio-Piceetum</i>)	106
8.1 Block-Fichtenwald	108
8.2 Karbonat-Fichtenwald, <i>Luzula sylvatica</i> -Ausbildung	109
9. Schneeheide-Alpenrosenbusch (<i>Erico-Rhododendretum</i>)	111
9.1 <i>Lycopodium</i> -Ausbildung	111
9.1.1 Reine <i>Lycopodium</i> -Ausbildung	112
9.1.2 <i>Lycopodium</i> -Ausbildung mit <i>Pinus mugo</i>	113
9.2 <i>Amelanchier</i> -Ausbildung	113
9.2.1 Reine <i>Amelanchier</i> -Ausbildung	115
9.2.2 <i>Amelanchier</i> -Ausbildung mit <i>Pinus mugo</i>	115
9.2.3 <i>Amelanchier</i> -Ausbildung mit <i>Calluna</i>	116
10. Hochmontan-subalpine Hochstaudenfluren und -gebüsch	116
10.1 Alpendostflur (<i>Adenostylo-Cicerbitetum</i>)	116
10.1.1 <i>Petasites</i> -Ausbildung	118
10.1.2 <i>Heliosperma</i> -Ausbildung	118
10.2 Grünerlenbusch (<i>Alnetum viridis</i>)	119

11. Dost-Buntreitgrasflur (<i>Origano-Calamagrostietum</i>)	121
12. Rostseggenrasen (<i>Caricetum ferrugineae</i>)	123
13. Blaugras-Horstseggenrasen (<i>Seslerio-Caricetum sempervirentis</i>)	125
13.1 Reine Ausbildung	127
13.2 <i>Hippocrepis</i> -Ausbildung	127
13.3 <i>Molinia</i> -Ausbildung	128
13.3.1 Reine <i>Molinia</i> -Ausbildung	128
13.3.2 <i>Molinia</i> -Ausbildung mit <i>Allium</i>	128
13.3.3 <i>Molinia</i> -Ausbildung mit <i>Convallaria</i>	129
13.4 <i>Primula auricula</i> -Ausbildung	129
13.5 <i>Hookeria</i> -Ausbildung	130
13.6 <i>Luzula sylvatica</i> -Ausbildung	130
14. Polsterseggenrasen (<i>Caricetum firmae</i>), Schneeheide-Variante .	131
14.1 <i>Biscutella</i> -Ausbildung	133
14.2 Latschen-Ausbildung	133
14.3 <i>Salix elaeagnos</i> -Ausbildung	133
14.3.1 <i>Salix elaeagnos</i> -Ausbildung mit <i>Petasites paradoxus</i> .	134
14.3.2 <i>Salix elaeagnos</i> -Ausbildung mit <i>Parnassia</i>	134
15. Gehölzreiche Gesellschaften auf Feinschuttstandorten	135
15.1 Verarmte Kalkschuttflur	136
15.2 Schneepestwurzflur (<i>Petasitetum paradoxo</i>)	136
15.3 Lavendelweidenbusch (<i>Salicetum elaeagni</i>)	137
16. Schildampferflur (<i>Rumicetum scutati</i>)	137
17. Rostseggen-Alpenrispengrasweide (<i>Prunello-Poetum alpinae</i> <i>caricetosum ferrugineae</i>)	138
18. Rotschwingelweide (<i>Alchemillo-Cynosuretum</i>)	140
19. Borstgrasrasen (<i>Nardetum alpigenum</i>)	141
20. Quellfluren und Rispenseggenried	143
21. Braunseggensumpf (<i>Caricetum fuscae</i>)	144

E) Beschreibung der Einzelgebiete	147
1. Schapbach	147
2. Eckau	149
3. Gotzenthal	151
4. Jennerbahn	154
5. St. Bartholomä	155
6. Röth	156
7. Hirschbichtal II	158
8. Hirschbichtal I	160
F) Arealtypenspektren	164
G) Vergleich der vegetationskundlichen Ergebnisse mit Resultaten anderer Fachgebiete	167
1. Waldgeschichte	167
2. Wildbiologie	169
3. Bodenkunde	170
4. Klimatologie	173
H) Diskussion	179
1. Vegetationskundlich erfaßte Umweltfaktoren	179
a) Abiotische Faktoren	179
b) Biotische Faktoren	183
2. Vegetationsgliederung	190
I) Zusammenfassung	192
Literaturverzeichnis	194
Anhang	
1. Erläuterung bodenkundlicher Begriffe	213
2. Beschreibung des für die Bearbeitung der Vegetationstabellen entwickelten FORTRAN-Programms	215
3. Arealtypenspektren und Zeigerwerte	235

4. Vegetationstabellen

4.1	Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald	243
4.2	Labkraut-Buchen-Tannenwald, Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald	261
4.3	Reiner Hainlattich-Tannen-Buchenwald	279
4.4	Weißseggen-Fichtenwald, Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald	287
4.5	Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald	292
4.6	Ahorn-Buchenwald	304
4.7	Edellaubwald	308
4.8	Hasel-Felsenbirnengesellschaft	313
4.9	Auwald	318
4.10	Alpenlattich-Fichtenwald, Braunseggensumpf	321
4.11	Karbonat-Fichtenwald, Schneeheide-Alpenrosenbusch	324
4.12	Alpendostflur, Grünerlenbusch	329
4.13	Dost-Buntreitgrasflur	333
4.14	Rostseggenrasen	335
4.15	Blaugras-Horstseggenrasen	337
4.16	Polsterseggenrasen, Schneeheide-Variante	342
4.17	Gehölzreiche Gesellschaften auf Feinschuttstandorten . .	345
4.18	Rostseggen-Alpenrispengrasweide	348
4.19	Rotschwingelweide	350
4.20	Borstgrasrasen	351
4.21	Quellfluren, Rispenseggenried	352
4.22	Stetigkeitstabelle	355

5.	Verzeichnis der Aufnahmeorte	371
----	--	-----

A) Probleme der pflanzensoziologischen Arbeit in den Kalkalpen

Vergleicht man die Vegetation der Kalkalpen mit derjenigen des Flachlandes, so beeindruckt in erster Linie die starke kleinräumliche Differenzierung der kalkalpinen Pflanzendecke. Sie wird geprägt durch eine Vielfalt von Standortsbedingungen, die der Landschaft des Kalkgebirges einerseits ihren besonderen ästhetischen Reiz verleiht und sie andererseits zu einem Refugium zahlreicher Arten macht, die in unserer eintönig gewordenen Kulturlandschaft keinen Platz mehr finden. Für die vegetationskundliche Arbeit, insbesondere die Vegetationskartierung, bedeutet jedoch die kleinräumliche Vielfalt der Pflanzendecke eine beträchtliche Erschwernis.

Ein besonders charakteristisches Merkmal der kalkalpinen Landschaft ist ihr unausgeglichenes, stark gegliedertes Relief, ein rascher Wechsel der Bodeneigenschaften und entsprechend auch der Pflanzengesellschaften. Das harte karbonatische Ausgangsgestein liefert bei seiner Verwitterung nur wenig Residualton. Dieser wird aufgrund hoher Niederschläge seinerseits oft rasch vom Bildungsort wegtransportiert und steht deshalb vielerorts als Füllmaterial nur noch in geringen Mengen zur Verfügung. Zur stärkeren Reliefdifferenzierung kommt es dabei v.a. im Bereich anstehenden Gesteins, das zur Bildung zerklüfteter Geländeformen neigt. Stärkere Kontraste in der Pflanzendecke entstehen hier zum einen durch große Unterschiede im Wasser- und Nährstoffhaushalt zwischen Felsrippen und benachbarten m.o.w. tief eingegrabenen Rinnen. Auf dem Grund der Vertiefungen sammeln sich mit verlagertem Kalkverwitterungslehm und organischen Bodenbestandteilen größere Nährstoffmengen an, die den Felsköpfen verloren gehen. Auch das Wasser sammelt sich in flüssiger und fester Form in den Rinnen und sorgt hier für gleichmäßig günstige Feuchtigkeitsverhältnisse. Daneben mildert es auch Temperaturextreme, zumal im Winter, wenn die niedrigeren Vegetationsschichten und die Bodenorganismen durch eingewehte Schneemassen vor Frost geschützt werden. Auf Felsköpfen leidet das Bodenleben dagegen zweifellos viel mehr unter stärkeren Temperaturschwankungen und periodischer Austrocknung. Die Streuzersetzung erfolgt deshalb nur langsam; es bilden sich Auflagen von oberflächlich saurem Tangelhumus mit entsprechend azidophiler und von derjenigen der Rinnen völlig verschiedener Vegetation. Auch auf den Felsköpfen selbst ist die Vegetation ebenfalls nicht einheitlich, sondern variiert in ihrem azidophilen Charakter je nach der Mächtigkeit der Humusaufgabe und dem Grad der Beeinflussung durch das basenreiche Ausgangsgestein.

So extrem differenziert, wie eben dargestellt, ist die Vegetation im Kartierungsgebiet freilich nicht allzu häufig. Die hier weitverbreiteten Moränen sind zu locker gefügte Sedimente, als daß daraus besonders extreme Reliefformen hätten entstehen können. Zwar sind auch in diesem Material zahlreiche größere oder kleinere Felsblöcke eingelagert und bedingen einen raschen Wechsel verschieden tiefgründiger Kleinstandorte. Die Vegetation folgt diesem Wechsel jedoch offenbar nicht in vollem Ausmaß, weil die gegenseitige Beeinflussung der eng aneinandergrenzenden, ineinander übergehenden und von vornherein nicht besonders deutlich unterschiedenen Vergesellschaftungen zu stark ist. Auch aufnahmetechnisch kann ein derart rascher Wechsel nicht ohne größeren Aufwand und ohne die Gefahr subjektiver Beeinflussung der Aufnahmedaten nachvollzogen werden. Der ausgleichenden Wirkung der Vegetation ist es zu verdanken, daß letztere in gewisser Hinsicht einfacher zu kartieren ist, als es bei den Böden der Fall ist. Zwar sinkt im selben Maße auch der Informationsgehalt der Vegetation, dessen wesentlichste Komponente ja innerhalb kleiner Landschaftsausschnitte normalerweise die Charakterisierung der Bodeneigenschaften bildet; die noch verbleibenden Informationen über das Substrat entsprechen jedoch in ihrer generalisierten Form praktischen Bedürfnissen wohl am besten. (Es hat sich beispielsweise nach MISHRA (1982) gezeigt, daß die Bodeneigenschaften kaum einen Einfluß auf das Verjüngungsverhalten der Baumarten im Bergmischwald ausüben.)

B) Methodik

a) Floristische Analyse

1. Vegetationsaufnahme

Geländeaufnahmen und Auswertung erfolgten nach der Methode von BRAUN-BLANQUET. Im Gelände wurden hierbei Vegetationsflecke von meist 200 qm in ihrer gesamten Artenkombination erfaßt. Die Auswahl der Flächen erfolgte subjektiv; als Auswahlkriterium diente v.a. die standörtliche und floristische Homogenität der Aufnahmefläche, wobei angesichts der kleinflächigen Standortsvariation im Kalkalpenbereich auch bei einem einheitlichen Vegetationsmosaik die Homogenitätsanforderungen als erfüllt betrachtet werden müssen. Hierbei ist v.a. zu berücksichtigen, daß nicht nur die einzelne Aufnahme homogen sein sollte, sondern insbesondere auch die einzelnen Aufnahmen untereinander. Es sollte also die Aufnahmemetho-

de möglichst nicht geändert, und somit nicht in einem Fall ein Mosaik in Einzelkomponenten zerlegt werden, das in der Mehrzahl der Fälle untrennbar ist. Derart verschiedene Aufnahmen können im Grunde nicht mehr gemeinsam ausgewertet werden. Es ist jedoch sehr schwer, Kriterien dafür zu finden, was noch auseinandergehalten werden sollte und was nicht. Ein häufig auftretendes Problem ist hier z.B., ob der Bewuchs der Felsblöcke mit aufgenommen werden soll oder nicht. Es scheint zunächst klar, daß ein einzelner auf der Fläche liegender Block ausgeschlossen bleiben sollte. Andererseits gibt es jedoch auch Wälder auf Bergsturmassen, die nur aus Felsbewuchs bestehen und trotzdem aufgenommen werden müssen. Man könnte nun in jedem Fall Boden- und Felsvegetation getrennt aufnehmen. Die Trennung beider ist jedoch nicht immer eindeutig und läßt viel Raum für subjektive Manipulationen. Nicht zuletzt gestaltet sich dann auch die Aufnahmetätigkeit ebenso umständlich wie die Handhabung des dann völlig zerstückelten Datenmaterials. Im Grunde gibt es wohl kaum eine andere Möglichkeit, als ausnahmslos alles aufzunehmen, was auf der einmal festgelegten und für genügend homogen erachteten Aufnahmefläche wächst. Auch Mosaik lassen sich letztlich wie normale Einheiten behandeln, und die Grenze zwischen Mosaik und homogener Gesellschaft ist gerade im Gebirge oft nur schwer zu ziehen. Für praktische Zwecke ist ihre peinliche Unterscheidung ohnehin meist uninteressant. Allzu untypische Artenkombinationen fallen außerdem allein aufgrund ihrer entsprechenden Seltenheit nicht ins Gewicht (WILMANN, 1970).

Die Artmächtigkeit jeder Art wurde nach folgender Skala geschätzt:

5: mehr als 75 % der Fläche bedeckend

4: 50 bis 75 % bedeckend

3: 25 bis 50 % bedeckend

2: 5 bis 25 % bedeckend oder weniger, aber sehr zahlreiche Exemplare

1: weniger als 5 % bedeckend, aber zahlreiche Exemplare
oder mehr, aber wenige Einzelexemplare

+: spärlich

r: selten

Auch die Soziabilität als Maß für die Einheitlichkeit der Artenverteilung auf der Aufnahme­fläche wurde erfaßt. Auf ihre Wiedergabe in den Tabellen wurde jedoch verzichtet, da der Tabellenumfang dann viermal so groß geworden wäre.

2. Tabellenordnung

Die Ordnung des Aufnahmema­terials erfolgte nach den empirisch aufgefundenen lokalen Charakter- und v.a. Differentialarten. Beide Kategorien von Arten treten, zumeist gruppenweise gemeinsam, nur in bestimmten Gesellschaften auf und dienen damit zu deren Unterscheidung. Charakterarten besitzen dabei ihr Optimum in einer einzigen Gesellschaft, während Differentialarten mehrere Optima aufweisen.

Bei der Zusammenstellung von Artengruppen ist zu berücksichtigen, daß im Grunde keine Art der anderen in ihrem soziologischen Verhalten völlig gleicht. Deshalb divergieren die Artengruppen, auch wenn sie innerhalb einer kleineren Zahl von Gesellschaften noch gemeinsame Optima aufweisen, umso mehr, je größer die Zahl der in Betracht gezogenen Einheiten wird. Die Divergenz der Arten fällt besonders in der Stetigkeitstabelle auf, in der alle Gesellschaften zusammengefaßt sind. Trotzdem wurden dort die zur Unterscheidung der verschiedenen Gesellschaften herangezogenen Artengruppen möglichst wenig aufgespalten, auch wenn sie außerhalb des Bereiches, in dem sie für die Differenzierung von Bedeutung sind, keine besonderen Gemeinsamkeiten mehr aufweisen.

Um die natürliche Vielfalt im Aufbau der Pflanzendecke auch in der Tabelle andeutungsweise wiederzugeben, wurden fast alle vorhandenen Aufnahmen irgendeiner Einheit zugeordnet und in die Tabelle übernommen. Gerade angesichts der Vielgestaltigkeit der Vegetation im Kalkalpenbereich fällt es schwer, irgend etwas als untypisch einzustufen. Da es außerdem bei der Kartierung in besonderem Maße notwendig ist, jeden genügend großen Vegetationsfleck einer bestimmten Einheit zuzuordnen und dabei nicht wie bei der Vegetationsaufnahme von dem Vorteil Gebrauch gemacht werden kann, nur besonders einheitliche oder gar nur besonders typische Flächen zu berücksichtigen, sollte es auf alle Fälle möglich sein, wenigstens die unter relativ günstigen Voraussetzungen erstellten Aufnahmen einzuordnen. Wenn auch die Tabelle dadurch an Homogenität verliert, so dokumentiert sie auf diese Weise doch am besten die auf der Karte dargestellten Einheiten.

3. Erfassung der Waldweide

Der Einfluß der Waldweide wurde auf folgende Weise zu erfassen versucht: Da anzunehmen war, daß bestimmte Ausgangseinheiten fast in ihrer Gesamtheit einem gewissen Weideeinfluß unterliegen, konnte zunächst nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß durch Vergleich beweideter und unbeweideter Ausbildungsformen die auf Beweidung ansprechenden Arten direkt zu ermitteln sein würden. Aus diesem Grunde, und auch auch um evt. doch erste floristische Hinweise auf unterschiedliche Beweidungsintensitäten zu erhalten, wurde m.o.w. auf Verdacht hin eine Gruppe von Grünland- und weideresistenten Arten als hypothetische Weidezeiger ausgewählt. Teilweise stützte sich diese Auswahl auch auf den Vergleich mit der Vegetation der Aschau am NW-Abhang der Reiter Alm, die in der vorangegangenen Diplomarbeit untersucht worden war. Die Wälder erschienen dort wesentlich naturnäher als in den meisten jetzt untersuchten Gebieten; beweidete Vegetationseinheiten wurden dort nicht gefunden. Freilich besitzt dieses Gebiet klimatisch und geologisch eine deutliche Sonderstellung, so daß es nur bedingt zum Vergleich herangezogen werden kann.

Mit Zunahme der Aufnahmenzahl und nach genauerer Tabellenauswertung konnten dann in der Tat innerhalb enger umgrenzter Einheiten verschieden stark beweidete Ausbildungsformen aufgefunden werden, durch deren Vergleich je nach Ausgangsgesellschaft anders zusammengesetzte soziologische Gruppen von Weidezeigern herausgestellt werden konnten; über 90 % der anfangs noch hypothetischen Weidezeiger konnten letzten Endes derartigen pflanzensoziologisch fundierten Weidezeigergruppen angeschlossen werden.

Floristische Vergleiche innerhalb einzelner Gesellschaften erlauben es aber, wie erwähnt, nicht, einen gewissen Grundpegel des Weideeinflusses festzustellen, der bisweilen in jeder der miteinander verglichenen Aufnahmen anzunehmen ist. Deshalb ist es sicher nicht nur als Nachteil zu werten, daß bei der Kartierung der Weideintensität nicht nur die erst nach Kartierungsbeginn aufgefundenen gesellschaftsspezifischen soziologischen Weidezeigergruppen, sondern immer auch die eingangs angesprochene gesellschaftsübergreifende, zunächst hypothetische, später aber tabellenstatistisch verifizierte ökologische Gruppe von Weidezeigern berücksichtigt wurde. Auf diese Weise ist am ehesten Gewähr dafür geboten, daß Weidezeiger, die in einer bestimmten durchgehend beweideten Gesellschaft aufgrund ihrer diffusen Verteilung in der Tabelle sich nicht als Differentialarten abheben, zumindest bei der Kartierung nicht untergingen. In der Tabelle wurde auf ihre Hervorhebung verzichtet.

Bei der Kartierung wurde versucht, unterschiedliche Intensitäten des Weideeinflusses zu erfassen. In der Karte sind 4 verschiedene Stufen zwischen unbeweideter und stark beweideter Ausbildungsform unterschieden; sichere floristische Kriterien waren jedoch meist nicht aufzufinden. Die Beurteilung richtete sich eher gefühlsmäßig nach der m.o.w. großen Menge aller als Weidezeiger in Frage kommenden Arten, deren Liste den Kartierern mitgegeben wurde. Ein allzu großer Wert kann dieser Unterscheidung nicht beigemessen werden; in der Tabelle kann jedenfalls bis auf eine Ausnahme pro Einheit höchstens eine einzige soziologische Gruppe von Weidezeigern festgestellt werden, die durch ihr Vorhandensein oder Fehlen höchstens zwei Beweidungsstufen definieren kann.

Eine größere Zahl an Beweidungsstufen kann allerdings bei Berücksichtigung verschiedener Ausgangsgesellschaften erhalten werden. Es gibt zum Beispiel Einheiten, die aus strukturellen Gründen eine Beweidung kaum ermöglichen; hierher gehört v.a. die Vegetation auf Bergsturzstandorten. Das andere Extrem bilden reine Weiderasen. Zwischen beiden sind solche Waldgesellschaften einzuordnen, die in drei durch zwei Differentialartengruppen deutlich unterschiedenen Weideintensitätsstufen auftreten, deren niedrigste Stufe jedoch ebenfalls noch einen leichten, wenn auch durch keine genau definierte Artengruppe mehr angezeigten Weideeinfluß aufweist. Der Vergleich von Natur aus standörtlich sehr verschiedener Ausgangsgesellschaften läßt jedoch nicht mehr erkennen, welche floristischen Merkmale nun speziell der Beweidung zuzuschreiben sind.

Eine Zuordnung der floristisch definierten Beweidungsstufen zu zahlenmäßig angebbaren Einflußgraden des Weideviehes stößt auf Schwierigkeiten. Abgesehen davon, daß schon die genaue floristische Definition einer Beweidungsstufe meist gar nicht möglich war, fehlt es naturgemäß an genauen Angaben über die Häufigkeit, mit der eine bestimmte Fläche von den Tieren aufgesucht wird. Auftriebszahlen allein sind hier sicher nur von beschränktem Wert, da das Vieh sich allein aufgrund der reichgegliederten Oberflächenformen zweifellos recht ungleichmäßig im Gelände verteilt. Schwierig wäre auch die Bewertung von Weideeinflüssen der Vergangenheit, die in unterschiedlichem Ausmaß auch die gegenwärtig anzutreffende Vegetation mitbeeinflussen. Zum Einfluß des Weideviehes müßte schließlich auch derjenige des Wildes hinzugerechnet werden, der kleinräumlich ebenfalls kaum anzugeben ist und der, z.B. in Betritthäufigkeiten gemessen, sicher anders zu werten ist als der des Viehes.

b) Systematik und Namensgebung

Bei der Beurteilung der Namen der im folgenden beschriebenen Pflanzengesellschaften ist zu berücksichtigen, daß die Benennung auch bei anthropogen - wenn auch nicht allzu stark - veränderten Gesellschaften weitgehend nach der vermutlichen natürlichen Ausgangsgesellschaft erfolgte. So wurden insbesondere selbst reine Fichtenbestände als Hainlattich-Tannen-Buchenwald bezeichnet, sofern nicht silikatreiches Ausgangsgestein und entsprechend azidophiler Artenbestand eine Parallelisierung mit nadelbaumreicheren Waldgesellschaften nahelegten. Als Forstgesellschaft kann eine anthropogene Fichtenfazies des Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes nicht betrachtet werden, weil die Fichte von Natur aus wesentlichen Anteil an dieser Mischwaldgesellschaft hat. Auch von der Möglichkeit, deutsche Gesellschaftsnamen, die nicht offiziell festgelegt sind, nach eigenem Gutdünken der lokalen Physiognomie einer Gesellschaft anzupassen, wurde meist kein Gebrauch gemacht. Es ist sicher wichtiger, an einem allgemein eingeführten Namen die Stellung einer Gesellschaft im bekannten System der Pflanzengesellschaften erkennen zu können, als durch eine neue Bezeichnung die lokale Struktur einer ansonsten nicht näher zuzuordnenden Gesellschaft zu erfahren.

Etwas ungewöhnlich mag trotz allem die Zuordnung von Schlagfluren zu den ihnen entsprechenden Waldgesellschaften anmuten. Es erschien jedoch nicht zuletzt auch in Bezug auf die Frage nach dem Einfluß des Menschen interessant, außer den rein physiognomischen Unterschieden zwischen Waldgesellschaft und davon abgeleiteter Schlagflur die unterscheidenden Arten tabellarisch deutlich zu machen. Die Gesellschaften wurden deshalb in der Tabelle nebeneinander gestellt. Die Benennung der Schlagfluren als Untereinheiten der Ausgangsgesellschaft folgt unmittelbar aus dieser Darstellungsweise in der Tabelle; sie kann nicht ohne weiteres aufgegeben werden, da es bei der Abgrenzung von Schlagfluren anhand einer für sie charakteristischen Artengruppe nicht völlig auszuschließen ist, daß auch Pflanzenbestände unter die Schlagfluren geraten, die noch zuviele Bäume aufweisen, um als "richtige" Schlagflur verstanden werden zu können. (Bei der Kartierung im Gelände wurde der Physiognomie trotz allem größere Bedeutung beigemessen.) Auch in der Karte, in der die anthropogen bedingten Merkmale der Vegetation isoliert von den natürlich bedingten dargestellt werden sollten, erscheinen die Schlagfluren notwendigerweise nicht als eigenständige Gesellschaft, sondern als Kahlschlag-ausbildung einer Waldgesellschaft.

Ganz allgemein sei hier darauf hingewiesen, daß in der vorliegenden Arbeit die Vegetationsgliederung in erster Linie nach der gesamten floristischen Zusammensetzung und nicht nach der v.a. vom Baumbestand bestimmten Physiognomie der Gesellschaften erfolgte. Obwohl die Physiognomie, also v.a. Art und Dichte des Baumbestandes, meist sehr deutliche Auswirkungen auch auf die Zusammensetzung der Bodenvegetation hat und deshalb selbstverständlich allein anhand des Unterwuchses Wald- von Nichtwaldgesellschaften unterschieden werden können, so gibt es doch in Grenzbereichen häufig den Fall, daß eine nach dem Gesamtartenbestand als Nichtwaldgesellschaft einzuschätzende Vegetationseinheit von m.o.w. zahlreichen Bäumen überstanden ist (weil sie z.B. viel Seitenlicht erhält) oder sich trotz einer Lücke im Baumbestand die Bodenvegetation nicht wesentlich von der einer Waldgesellschaft unterscheidet. Die Grenze zwischen Wald- und Nichtwaldgesellschaft sollte in jedem Fall nach der Gesamtartenzusammensetzung gezogen werden und nicht bei irgendeinem definierten Deckungsgrad der Baumschicht, der an unterschiedlichen Standorten sicher auch unterschiedliche Auswirkungen auf die Lebensbedingungen eines Pflanzenbestandes ausüben kann.

Die genaue Zuordnung zu einer bestimmten Formation und die Einordnung ins allgemein übliche System der Pflanzengesellschaften wurde prinzipiell an vollständigen, durch lokal aufgefundene Differential- oder Charakterarten definierten Einheiten anhand der Mengenverhältnisse der großräumig gültigen, der Literatur entnommenen Charakterarten vollzogen. (Die vorausgehende Gliederung der lokalen Pflanzengesellschaften ist dagegen mit den für größere Gebiete gültigen Charakterarten nicht ohne weiteres möglich, da spezielle lokale Standortbedingungen häufig zu "untypischen" Vergesellschaftungen der Arten führen und die Vergesellschaftung der Charakterarten aufheben können.) Einzelne Aufnahmen einer an sich schon randständigen Gesellschaft, und u.U. auch einzelne randständige Untereinheiten einer umfassenderen Gesellschaft, können dabei durchaus schon einer anderen Formation angehören, ohne daß deshalb eine durch lokale Differentialartengruppen verbundene Gruppe von Aufnahmen auseinandergerissen wurde.

Die Benennung von Gesellschaften niedrigen Ranges erfolgte durch Aufzählung der wesentlichen Differentialartengruppen anhand jeweils eines charakteristischen Vertreters. Die Reihenfolge entpricht der Hierarchie der Gesellschaften. Dabei wurden v.a. in der Tabelle, aber auch in der Kartenlegende Fehlstellen am Ende weggelassen. Anstatt "Reine Ausbildung, rein, rein" wurde z.B. nur noch "Reine Ausbildung" geschrieben,

ohne daß sich an der hierarchischen Rangstufe der Gesellschaft etwas ändert. Eine Verwechslungsgefahr mit höheren hierarchischen Ebenen besteht nicht, da in Tabelle und Legende nur die niedrigsten vorkommenden Rangstufen eine Gesellschaftsbezeichnung bzw. Kartensignatur zugeordnet bekamen.

Die Nomenklatur der Gefäßpflanzen folgt OBERDORFER (1979), die der Moose FRAHM und FREY (1983).

c) Ökologische Zeigerwerte

Die Berechnung mittlerer Zeigerwerte erfolgte anhand der Angaben in ELLENBERG (1979). Es wurden zunächst für jede Aufnahme getrennt die Mittelwerte der vorkommenden Arten berechnet. Die Durchschnittswerte für ganze Gesellschaften wurden durch erneute Mittelung der Mittelwerte der Einzelaufnahmen erhalten. Unterschiede in der Artmächtigkeit fanden keine Berücksichtigung. Dies erleichtert die Berechnung, schließt Fehler bei der naturgemäß ungenauen Mengenschätzung aus und vermeidet die Überbewertung konkurrenzkräftiger, massenhaft auftretender aber wenig standortsspezifischer (z.B. *Calamagrostis varia*) gegenüber konkurrenzschwachen und auch im Optimalfall nur spärlich vertretenen, aber trotzdem sehr standortsspezifischen Arten (z.B. *Listera cordata*). Standortabhängige Variationen der Artmächtigkeit könnten nur dann richtig bewertet werden, wenn für jede Art das Verhältnis zwischen aktueller und unter günstigsten Bedingungen in der Natur zu beobachtender Artmächtigkeit in Rechnung gestellt würde.

Dieser Aufwand lohnt jedoch schon deshalb wohl nicht, weil die Zeigerwerte meist gar nicht auf exakten Messungen beruhen und darüber hinaus noch mit den je nach Vergesellschaftung unterschiedlichen Konkurrenzbedingungen variieren. Die Werte liefern trotzdem oft interessante Hinweise, und ihre Allgemeingültigkeit kann ihrerseits daran gemessen werden, ob sie bei der Anwendung in neuen Gesellschaften oder zumindest neuem Aufnahmемaterial noch plausibel erscheinen.

Anzumerken wäre an dieser Stelle evt. noch, daß die aus dem Artenbestand errechneten Reaktionszahlen keine pH-Werte darstellen, obwohl sie sich in einem ähnlichen Größenbereich bewegen.

Zur Veranschaulichung der Zahlenwerte und um den Überblick über sämtliche größeren Vegetationseinheiten des Gebiets zu erleichtern, sind die meisten der im Text aufgeführten Zeigerwerte in einer beiliegenden Graphik in der Form von Säulendiagrammen zusammengefaßt. Diese Graphik beinhaltet auch Arealtypenspektren, auf deren Berechnung am Ende der Arbeit noch näher eingegangen wird. Auf der Basis der Zeigerwerte wurde auch das Ökogramm auf S. 181 erstellt.

d) Kartendarstellung

Bei der Kartierung im Kalkalpenbereich stellt, wie erwähnt, der kleinflächige Wechsel der Vegetation ein besonderes Problem dar. Obwohl die erfaßbaren Pflanzengesellschaften sicher weniger stark variieren als die Bodenverhältnisse, verbietet sich eine naturgetreue Wiedergabe der Pflanzendecke hier noch mehr als in Gebieten mit weniger differenziertem Relief. Statt dessen muß weithin zur Darstellung von Vegetationskomplexen übergegangen werden. Inhaltlich sind die dargestellten Komplexe primär als topographische Gesellschaftskomplexe (SEIBERT 1968) zu klassifizieren; es können hier beliebige räumlich benachbarte Gesellschaften zusammengefaßt sein. Strukturell handelt es sich meist um Dominanzkomplexe, in denen eine bestimmte Gesellschaft überwiegt. Sie sind wie diese dominierende Gesellschaft dargestellt und daher nicht als Komplex erkennbar. Es wurden daneben nur wenige Mosaikkomplexe kartiert, deren Bestandteile gleichberechtigt gedacht und in der Legende im einzelnen aufgeführt sind. Bei Dominanzkomplexen kann demgegenüber die genaue Angabe des Inhalts unterbleiben, und sinnvollerweise wird man auch auf diese verzichten, will man nicht eine unüberschaubare Vielzahl verschiedener Kartiereinheiten aufstellen. Um jedoch kleinflächiger verbreitete, aber regelmäßig wiederkehrende Einheiten nicht völlig untergehen zu lassen, wurden auch diese möglichst im richtigen Flächenanteil, nicht jedoch in richtiger Position und Flächengestalt hin und wieder eingezeichnet.

Die engültige Karte gliedert sich jeweils in die Grundkarte und das Deckblatt. In der Grundkarte sind Ausgangsgesellschaften dargestellt, nicht jedoch deren Untereinheiten, soweit sie durch die Felsigkeit des Geländes und die meist anthropogenen Faktoren der Beweidung, des Schlagens und des Eingriffes in die Baumartenzusammensetzung bedingt sind. Diese Faktoren sind über die Artengruppen, die ihnen ihr Vorkommen verdanken, auf dem Deckblatt dargestellt. Im Falle der Baumartenveränderung

ist hier die negative Darstellung wesentlich einfacher; in Anbetracht der meist forstwirtschaftlich bedingten starken Fichtendominanz auf dem größten Teil der Untersuchungsflächen erscheinen auf dem Deckblatt die wenigen laubbaum-, und d.h. v.a. buchenreichen und daher meist als relativ naturnah anzusehenden Bestände. (Diese wurden außer durch Geländekartierung v.a. durch die Auswertung von Infrarotluftbildern ermittelt).

Da in der Grundkarte die als solche erkennbaren biotischen Einflüsse weitgehend nicht dargestellt wurden, kann sie mit Einschränkung als Karte der potentiellen natürlichen Vegetation angesehen werden. Allerdings wurden anthropo-zoogen in andere Assoziationen verwandelte Gesellschaften nicht auf ihre Ausgangsgesellschaften zurückgeführt. Statt der real meist vorgefundenen fichtenreichen Bestände sind weiterhin mit Ausnahme der Flächen, wo natürliche bodensaure Fichtenwälder oder natürliche Nichtwaldgesellschaften kartiert sind, Mischbestände mit reichlicher Beimengung von Buche, Bergahorn und Tanne anzunehmen. Weiterhin sind, wie erwähnt, die durch die Felsigkeit des Geländes bedingten Untereinheiten zur Entlastung der Grundkarte auf dem Deckblatt dargestellt. Letzteres ist im wesentlichen als Karte des anthropogenen Einflusses zu betrachten, wenn von den durch die Felsigkeit des Geländes bedingten Gesellschaften und von natürlicher Schlagvegetation abgesehen wird, die ebenfalls auf dem Deckblatt wiedergegeben sind.

Bei der Kartierung im Gelände dienten als Hilfsmittel verschiedene Kartierungsschlüssel in Form von vereinfachten Vegetationstabellen, in denen nur noch die Differentialarten aufgeführt sind. Als Kartengrundlage dienten photogrammetrisch erstellte topographische Karten im Maßstab 1:10 000. Luftbilder sind im Bereich der dichtgeschlossenen Hangwälder von geringerem Wert. Als apparative Hilfsmittel dienten Kompaß und Höhenmesser. Die Orientierung erfolgte v.a. anhand der Höhenlinien.

An der Kartierung hatten studentische Hilfskräfte wesentlichen Anteil. In einigen Tagen der Einarbeitung wurden sie mit den in ihrem speziellen Arbeitsgebiet am häufigsten vorkommenden Einheiten vertraut gemacht und lernten die wesentlichsten Differentialarten kennen. Einen Überblick über alle in sämtlichen Teilgebieten aufgefundenen Einheiten konnten sie in dieser kurzen Zeit und auch in der Gesamtzeit ihrer wenige Wochen dauernden Kartierungstätigkeit sicher nicht erwerben, weshalb die Erfassung kleinflächig aus anderen Teilgebieten übergreifender Einheiten auf Schwierigkeiten gestoßen sein dürfte. Angesichts der komplizierten Vegetationsverhältnisse stimmt auch der Kartierungsschlüssel

häufig nicht genau mit den tatsächlich vorgefundenen Pflanzengesellschaften überein, so daß oft für die Auswahl der jeweils am besten passenden Einheit ein gewisser Ermessensspielraum blieb. Derartige Entscheidungen sind für kurzfristig angeworbene Hilfskräfte sicher nicht leicht zu treffen, so daß von der vorliegenden Karte nicht die höchstmögliche Zuverlässigkeit erwartet werden kann.

Einzusehen sind die Karten im Bedarfsfall am Nationalparkamt Berchtesgaden; ihre Drucklegung ist erst nach Vollendung der Kartierung des gesamten Gebiets sinnvoll.

e) Maschinelle Hilfsmittel

Für die praktische Handhabung und die statistische Auswertung der Vegetationstabellen wurde in Ermangelung eines geeigneten fremden Programmes unter optimalen technischen Voraussetzungen ein eigenes FORTRAN-Programm geschrieben (s. Erläuterung im Anhang). Es diente v.a. dazu, den Computer als Schreibmaschine für die Tabellenarbeit nutzbar zu machen, die im Prinzip jedoch m.o.w. nach der herkömmlichen Methode ablief. Auf maschinelle Sortierung wurde aus Kostengründen weitgehend verzichtet. Einige versuchsweise nach STRENG und SCHÖNFELDER (1978) durchgeführten Sortierläufe bestätigten recht befriedigend das Ergebnis der bereits vorher erfolgten manuellen Sortierung des Aufnahmемaterials. Auch die herkömmliche Tabellenbearbeitung wird jedoch durch die EDV wesentlich erleichtert. Sie ermöglicht einerseits ein sehr häufiges, garantiert fehlerfreies Umschreiben der Tabellen. Andererseits bietet sie manche zusätzlichen Hilfen, wie etwa die Zeigerwertberechnung oder die automatische Zusammenstellung der zuvor nach Literaturangaben gekennzeichneten Charakterarten in einer Tabelle. Auch andere Gruppen von Arten mit gemeinsamen Merkmalen, was z.B. Lebensformen oder geographische Verbreitung betrifft, können aussortiert werden. Die Zahl der ausgewählten Arten wie auch die Gesamtartenzahl kann in allen Aufnahmen einer Tabelle automatisch bestimmt werden; ebenso wird auch die Stetigkeit der Arten ermittelt. Falls vom Bearbeiter nur eine Teiltabelle fest vorgegeben wurde, können außerdem die Arten, die dort noch keinen Platz zugewiesen bekamen, nach Stetigkeit sortiert automatisch ergänzt werden.

C) Gebietsbeschreibung

a) Geologie (GANSS, o.J., Geologische Karte von Bayern 1:100 000,
Blatt 667 Bad Reichenhall, KÖSTLER, 1950)

Die Grundgliederung des geologischen Aufbaues der Berchtesgadener Kalkalpen ist durch drei Stufen charakterisiert. Die Basis bildet die skythische Stufe der alpinen Trias mit Werfener Schichten und Haselgebirge. Die Gesteine des Skyth sind einerseits aufgrund ihres Vorkommens in den siedlungsfähigen Tallagen und andererseits aufgrund ihres spezifischen Mineralgehalts von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung. Die Werfener Schichten stehen in der Ramsau auf größerer Fläche an. Meist bestehen sie aus Tonschiefern und Mergeln und liefern Böden, die der Grünlandwirtschaft günstige Voraussetzungen bieten.

Obwohl oberflächlich nur gering in Erscheinung tretend, besitzt das salzführende Haselgebirge wirtschaftlich ebenfalls größere Bedeutung. Insbesondere während der vergangenen Jahrhunderte lebte das Berchtesgadener Land wesentlich von der Salzgewinnung, die aufgrund ihres hohen Holzbedarfes nicht zuletzt auch auf die Struktur der hier zu betrachtenden Waldvegetation großen Einfluß besaß.

Die zweite Stufe bilden weithin dolomitische Gesteine, die die Hanglagen der Bergstöcke aufbauen und normalerweise von Wäldern bestockt sind. Als Formationen sind hier Unterer und Oberer Ramsadolomit und auch die teilweise dolomitischen Reichenhaller Schichten von Bedeutung. Dolomit unterliegt einer ausgesprochen langsamen Lösungsverwitterung. Die physikalische Verwitterung läuft dagegen, v.a. wenn es sich um tektonisch beanspruchtes Material handelt, besonders intensiv ab und liefert grusige, wasserdurchlässige Schuttmassen.

Die oberste Stufe der Berchtesgadener Berge wird vom Dachsteinkalk eingenommen, der v.a. die Plateaus von Reiter Alm und Steinernem Meer einnimmt. Stellenweise wird er von Gesteinen des Jura überlagert, die bevorzugte Almstandorte bilden. Die jurassischen Gesteine sind meist m.o.w. silikatreich; Mergel treten häufiger in Erscheinung.

Selten stehen in den Berchtesgadener Alpen - z.B. in Form der Schrambach- und Roßfeldschichten - Gesteine der Kreide an. Auch hierbei handelt es sich um Mergel.

In den Untersuchungsgebieten selbst spielen quartäre Bildungen die

größte Rolle. Meist handelt es sich um Moränen und Hangschuttmaterial; seltener kommt interglazialer Nagelfluh vor. Die relativ lockeren, kalkreichen Ablagerungen des Quartär erleichtern die Basennachlieferung und ermöglichen kaum die Bildung saurer Substrate, so wie sie sich in Form stärkerer Humusakkumulationen häufig auf anstehendem Dachsteinkalk entwickeln. Letzterer wurde ebenso wie dolomitische Gesteine relativ selten im Untersuchungsgebiet angetroffen. Noch seltener treten hier jurassische Gesteine auf, die jedoch, besonders wenn es sich um Kieselkalk oder Radiolarit handelt, recht auffällige azidophile Vegetationstypen tragen. Die geringste Rolle spielen die in ihrem Silikatreichtum den Gesteinen des Jura ähnlichen Schichten des Skyth und der Kreide.

(Die Erläuterung der speziellen geologischen Ausgangssituation der Einzelgebiete erfolgt zusammen mit der allgemeinen Beschreibung dieser Gebiete in einem Schlußkapitel.)

b) Böden (BOCHTER 1977, RÖHLE 1978)

Entsprechend der geologischen Situation dominieren im Gebiet v.a. Böden der auf Karbonat anzutreffenden Entwicklungsserie. Es sind dies insbesondere verschiedene Arten von Rendzinen, wie Mull-, Lehm-, Moder- und Blockschuttmoderrendzinen, die v.a. auf karbonatreichem Hangschuttmaterial ausgebildet sind. In höheren Lagen kann es unter Umständen zur Ausbildung von Tangelrendzinen kommen. Kleinflächig, und v.a. in Dolomitgebieten, scheinen *Terrae fuscae* aufzutreten, die möglicherweise aufgrund eines relativ basenarmen Hangwassers besonders leicht versauern. Sie mögen ihre Entstehung einem relativ hohen Nichtkarbonatanteil des Ausgangsgesteins verdanken. Auf besonders silikatreichen Gesteinen ist mit Parabraunerden oder Braunerden zu rechnen, die, zumindest in den niederschlagsreicheren Hochlagen, auch Podsolierungserscheinungen aufweisen können. Selbst im Bereich mergeliger Gesteine zeigen sich im Gebiet deutliche Hinweise auf Bodenversauerung, die nur durch große Niederschlagsmengen und entsprechend intensive Auswaschung zu erklären sind. Unter besonderen Umständen, z.B. im Bereich ebener Talböden, treten in lehmreichen Böden auch hydromorphe Merkmale auf.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten nur recht wenige und oberflächliche Bodenuntersuchungen durchgeführt werden. Die ergrabenen Profile werden im Zusammenhang mit den jeweils zugehörigen Vegetationseinheiten beschrieben.

c) Klima

Das Klima des Untersuchungsgebiets ist zweifellos räumlich stark differenziert. Es variiert je nach Föhnexposition, Einfluß größerer Wassermassen und insbesondere der Höhenlage. Meßstationen gibt es im Kartierungsgebiet nicht. Einen ersten Eindruck von den klimatischen Bedingungen mögen die Daten der Station Berchtesgaden geben (Klimakunde des Deutschen Reiches, 1939). Die Jahresdurchschnittstemperatur lag hier zwischen 1881 und 1930 bei 6,9 Grad Celsius. Die Jahresschwankung von 18,9 grd deutet ein relativ kontinentales Klima an. Eistage gab es im Jahresmittel zwischen 1905 und 1919 sowie 1921 und 1930 26,3, Frosttage 122,3 und Sommertage 16,3. Die frostfreie Zeit betrug im Jahresmittel 167 Tage. Der mittlere Bewölkungsgrad lag zwischen 1904 und 1930 bei 6,1/10. Heitere Tage gab es um diese Zeit 53,5 pro Jahr, trübe Tage 132,2. Die Zahl sonnenscheinloser Tage betrug zwischen 1921 und 1930 im Mittel 82,7. Die mittlere tägliche Sonnenscheindauer lag in derselben Zeit bei 4,5 h und 37 % des maximal möglichen Wertes.

Niederschläge fallen im Gebiet, wie am Alpenrand üblich, verstärkt bei NW-Wetterlagen, die ihrerseits bevorzugt im Sommer auftreten. Entsprechend traf das Niederschlagsmaximum zwischen 1891 und 1930 in Berchtesgaden auf den Monat Juli, in dem im Mittel 199 mm fielen; die geringste Niederschlagsmenge fiel mit mittleren 75 mm im Februar. Die Vegetationsperiode erhielt im Mittel 511 mm und der mittlere Jahresniederschlag betrug 1447 mm; er fiel an mittleren 54,3 Tagen als Schnee. Insgesamt sind also die Niederschlagsmengen recht bedeutend und weisen auf die Lage im unmittelbaren Staubereich der Alpen hin. Angesichts dieser Niederschlagsbeträge erscheint die Zahl sonniger Tage ausgesprochen hoch. Dies weist darauf hin, daß die Niederschläge in recht konzentrierter Form fallen müssen.

Wie bereits angedeutet, können die Klimadaten der Station Berchtesgaden auf das eigentliche Untersuchungsgebiet meist nicht voll übertragen werden. Flächendeckende Werte für den ganzen Alpenpark erhielt ENDERS (1979) auf theoretischem Weg. Sie werden in ihren Beziehungen zur Vegetation am Ende der Arbeit näher erläutert.

D) Pflanzengesellschaften

1. HAINLATTICH-TANNEN-BUCHENWALD (Aposerido-Fagetum)

Zum Hainlattich-Tannen-Buchenwald wurde der größte Teil der Wälder im Untersuchungsgebiet gerechnet. Er besiedelt die Durchschnittsstandorte des ganzen montanen Bereichs von den Tallagen in 600 m Meereshöhe bis zur aktuellen Waldgrenze in etwa 1600 m. Die Zuordnung der hier betrachteten Wälder zum Verband der Buchenwälder erfolgte ausschließlich nach der Zusammensetzung der Bodenvegetation: In der Baumschicht tritt fast nur die Fichte in Erscheinung. Dies ist jedoch zweifellos auf forstwirtschaftliche Eingriffe zurückzuführen. Der allgemeine Fichtenreichtum der Wälder im Nationalpark machte es auch unmöglich, mit der gegebenen Methode eine natürliche subalpine Fichtenstufe abzugrenzen.

Im Bereich des Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes sind zwei Höhenformen zu unterscheiden: Die höheren Lagen werden von einer an Fichtenwald- und Hochstaudenarten reichen Subassoziatio**n** besiedelt; in den tiefergelegenen Bereichen erscheint eine Reihe von Subassoziatio**n**en mit stärkerem Buchenwaldcharakter.

Gebietsvergleich

Anhand einer Vergleichstabelle wurde der Artenbestand des Berchtesgadener Aposerido-Fagetum mit demjenigen des Schweizer Abieto-Fagetum nach KUOCH (1954), des Allgäuer Aposerido-Fagetum nach OBERDORFER (1957), des *Adenostylo glabrae*-Abieti-Fagetum des Kaisergebirges nach SMETTAN (1981) und des Helleboro-Fagetum vom Alpenostrand nach ZUKRIGL (1973) verglichen. Um den Vergleich zu erleichtern, wurden die eigenen Daten einerseits in einer den Tabellen speziell von KUOCH und ZUKRIGL entsprechenden Anordnung der Arten, andererseits als alphabetisch geordnete Stetigkeitstabelle ausgedruckt. Die Vergleichstabelle enthält keine absoluten Häufigkeitswerte, sondern stellt die Differenz zwischen den Berchtesgadener Werten und denen der jeweils damit verglichenen Tabelle der anderen Alpengebiete dar. Arten ohne wesentlichen Häufigkeitsunterschied sind nicht aufgenommen. Der Häufigkeitsunterschied wurde grob in 7 Stufen (3-, 2-, -, +, 2+, 3+) geschätzt. Eine Art, die mit 3- erscheint,

ist viel seltener, eine solche mit 3+ viel häufiger als in Berchtesgaden; + und - deuten einen gerade eben wesentlich erscheinenden Unterschied an. Eine genauere Quantifizierung erscheint unnötig. Den Berchtesgadener Verhältnissen entsprechende Vorkommen erhielten keine Eintragung. Arten, die in der Tabelle eines bestimmten Autors ganz fehlen, wurden mit 0 gekennzeichnet. Hierunter können sich auch seltenere Arten befinden, die nur in einer zum Vergleich herangezogenen Sammeltablette weggelassen wurden. Steht 0 direkt hinter dem Namen einer Art, so kommt sie in den eigenen Tabellen nicht vor. Hierbei ist zu beachten, daß die eigenen Daten den Nationalpark nicht gleichmäßig flächendeckend erfassen sondern sich eher punktuell auf die an anderer Stelle näher beschriebenen Teilgebiete konzentrieren. Deshalb fehlen in diesen Daten zweifellos Arten, die im Nationalpark durchaus vorkommen, wie z.B. *Galium sylvaticum* oder *Pulmonaria officinalis*, die nur in den relativ warmen und an Lehm Böden reichen Tallagen vorkommen.

In der Vergleichstabelle wird zunächst die bewußte Selektion naturnaher Bestände durch alle genannten Autoren sichtbar. Dies drückt sich im allgemeinen Reichtum an Buche, Bergahorn und Tanne einerseits und im Fehlen vieler Weidezeiger andererseits aus. Mit dem Laubbaumreichtum mag z.T. das in allen Vergleichsgebieten mit Ausnahme des Kaisergebirges wesentlich häufigere Vorkommen von *Galium odoratum*, *Elymus europaeus*, *Festuca altissima*, *Aruncus dioicus*, *Bromus ramosus* und nicht zuletzt *Polystichum lobatum* zusammenhängen. Letzterer ist auch in Berchtesgaden besonders eng an laubholzreiche Bestände gebunden. Die übrigen genannten Arten kennzeichnen zumeist noch spezifischer als *Polystichum* die Schluchtwälder Berchtesgadens. Es handelt sich dabei durchweg um anspruchsvollere Lehmzeiger, die damit offensichtlich auch gewisse, auf höherem Silikatreichtum der Böden beruhende Standortunterschiede andeuten.

Als spezifische Arten der westlichen Alpentteile finden sich bei KUOCH v.a. subatlantische bis atlantische Arten wie *Sambucus racemosa*, *Blechnum spicant* und nicht zuletzt *Ilex aquifolium* besonders häufig. Eine noch größere Eigenständigkeit weist das Helleboro-Fagetum ZUKRIGLs auf. Hier finden sich naturgemäß zahlreiche Arten mit Verbreitungsschwerpunkt im östlichen, kontinentaleren Bereich Mitteleuropas wie *Cyclamen purpurascens*, *Asarum europaeum*, *Symphytum tuberosum*, *Pulmonaria officinalis*, *Digitalis grandiflora*, *Galium sylvaticum*, *Chrysanthemum corymbosum*, *Campanula persicifolia*, *C. rapunculoides*, *Luzula luzuloides*, *Knautia drymeia* u.a.. Ungewöhnlich ist allerdings, daß *Cirsium erisithales* und

Daphne laureola, also Arten mit atlantischer bzw. westlicher Verbreitung sich gerade am Alpenostrand häufen. *Helleborus niger* als namengebende Art der östlichsten Gebietsassoziation kalkalpiner Buchenwaldgesellschaften ist in Berchtesgaden nicht viel seltener als am Alpenostrand und zeigt zusammen mit anderen verbindenden östlich verbreiteten Arten wie *Dentaria enneaphyllos*, *Veratrum album*, *Senecio abrotanifolius*, *Erica herbacea*, *Heracleum austriacum* und auch *Cyclamen purpurascens* (das zwar im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht erfaßt wurde, aber durchaus in Berchtesgaden vorkommt) die Verwandtschaft des Berchtesgadener Aposerido-Fagetum mit dem Helleboro-Fagetum.

Vergleichstabelle

K: KUOCH 1954
O: OBERD. 1957
S: SMETTAN 1981
Z: ZUKRIGL 1973

	K	O	S	Z
<i>Abies alba</i>	3+	3+	3+	3+
<i>Fagus sylvatica</i>	++	++	++	++
<i>Acer pseudoplatanus</i>	++	++	++	++
<i>Galium odoratum</i>	3+	3+		3+
<i>Festuca altissima</i>	3+	++		++
<i>Epipactis helleborine</i>	++	++		++
<i>Primula elatior</i>	++	++		++
<i>Milium effusum</i>	++	++		++
<i>Impatiens noli-tangere</i>	++	++		++
<i>Bromus ramosus</i>	++	++		+
<i>Polystichum lobatum</i>	++	+		++
<i>Fissidens taxifolius</i>	3+		++	++
<i>Elymus europaeus</i>	3+	++	-0	++
<i>Aruncus dioicus</i>	3+	+	-	+
<i>Rubus fruticosus</i>	3+	++		
<i>Lonicera alpigena</i>	++	3+		
<i>Hedera helix</i>	++	3+		
<i>Petasites albus</i>	++	++		

		K	O	S	Z
<i>Euonymus latifolius</i>	0	+	++		
<i>Neottia nidus-avis</i>		+	+		
<i>Lonicera xylosteum</i>		+	+		
<i>Ranunculus lanuginosus</i>		3+			3+
<i>Pyrola secunda</i>		3+			+
<i>Heracleum sphondylium</i>		++			++
<i>Ulmus glabra</i>		++			++
<i>Allium ursinum</i>	0	++			+
<i>Circaea lutetiana</i>		++			+
<i>Lathyrus vernus</i>	0	+			++
<i>Veronica montana</i>		+			++
<i>Astrantia maior</i>			++		++
<i>Actaea spicata</i>			3+		+
<i>Corylus avellana</i>			++		++
<i>Dentaria bulbifera</i>	0		+		3+
<i>Lonicera nigra</i>		3+	3+	--	
<i>Rosa pendulina</i>		+	+	--	
<i>Dryopteris austriaca s.str.</i>		+	+	--	
<i>Carex sylvatica</i>		+	+	3-0	
<i>Sambucus racemosa</i>		3+			
<i>Ilex aquifolium</i>	0	3+			
<i>Blechnum spicant</i>		3+			
<i>Valeriana officinalis</i>		3+			
<i>Hookeria lucens</i>		3+			
<i>Pellia epiphylla</i>		3+			
<i>Eurhynchium hians</i>	0	++			
<i>Cardamine pentaphyllos</i>	0	++			
<i>Equisetum sylvaticum</i>		++			
<i>Dentaria polyphylla</i>	0	++			
<i>Equisetum arvense</i>		++			
<i>Platanthera bifolia</i>		++			
<i>Lophocolea heterophylla</i>		++			
<i>Luzula nivea</i>	0	++			
<i>Cirsium oleraceum</i>		++			
<i>Ranunculus aconitifolius</i>		++			
<i>Vicia sylvatica</i>		+			
<i>Galeopsis tetrahit</i>		+			
<i>Fraxinus excelsior</i>		+			
<i>Vaccinium myrtillus</i>		+			

		K	O	S	Z
Mnium spinosum		+			
Taxus baccata				+	
Cyclamen purpurascens	0				3+
Asarum europaeum					3+
Symphytum tuberosum					3+
Pulmonaria officinalis	0				3+
Cirsium erisithales	0				3+
Digitalis grandiflora	0				3+
Galium sylvaticum	0				++
Hypericum hirsutum					++
Euphorbia dulcis					++
Clematis vitalba					++
Daphne laureola	0				++
Tanacetum corymbosum	0				++
Campanula persicifolia	0				++
Campanula rotundifolia					++
Luzula albida					++
Soldanella montana	0				++
Pinus sylvestris					++
Knautia drymeia	0				+
Campanula rapunculoides	0				+
Campanula baumgartenii	0				+
Arabis turrita	0				+
Melittis melissophyllum	0				+
Cephalanthera damasonium	0				+
Rosa arvensis					+
Sambucus nigra					+
Galium lucidum	0				+
Carduus crassifolius	0				+
Melampyrum angustissimum	0				+
Tanacetum subcorymbosum	0				+
Senecio subalpinus	0				+
Deschampsia flexuosa					+
Linaria vulgaris	0				+
Polytrichum formosum		+			-
Atrichum undulatum		++		--	
Galium rotundifolium		++	--0		
Thalictrum aquilegifolium					-0 ++
Polygonatum multiflorum					-0 ++

	K	O	S	Z
<i>Sorbus aria</i>	+	3-0		-
<i>Anemone nemorosa</i>	++	-	-	
<i>Stachys sylvatica</i>	++	-0	-0	
<i>Centaurea montana</i>	+	-0	-0	
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	+	--0	--	
<i>Veronica urticifolia</i>				3-0
<i>Athyrium filix-femina</i>			-	
<i>Carex ornithopoda</i>			-	
<i>Scrophularia nodosa</i>			-	
<i>Pellia endiviaefolia</i>			-0	
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>			-0	
<i>Circaea intermedia</i>			-0	
<i>Moehringia trinervia</i>			-0	
<i>Brachythecium salebrosum</i>			--0	
<i>Rubus idaeus</i>			--	
<i>Sorbus aucuparia</i>			--	
<i>Thelypteris phegopteris</i>			--	
<i>Solidago virgaurea</i>			--	
<i>Aconitum vulparia</i>			--	
<i>Geranium robertianum</i>			--0	
<i>Veronica officinalis</i>			--0	
<i>Senecio fuchsii</i>			3-	
<i>Eurhynchium striatum</i>			3-	
<i>Lamium galeobdolon</i>			3-	
<i>Luzula sylvatica</i> s.l.			3-	
<i>Carex flacca</i>			3-0	
<i>Epilobium montanum</i>			3-0	
<i>Plagiomnium affine</i>		--0		
<i>Hypnum cupressiforme</i>		2-0		
<i>Ctenidium molluscum</i>		3-0		
<i>Picea abies</i>	-			
<i>Melica nutans</i>	3-			
<i>Daphne mezereum</i>	3-			
<i>Salvia glutinosa</i>	3-0			
<i>Helleborus niger</i>	3-0	3-0	-	+
<i>Thelypteris limbosperma</i>			--0	-
<i>Luzula pilosa</i>			3-	--
<i>Blepharostoma trichophyllum</i>		-0		-0
<i>Eurhynchium striatum</i>		3-0		--

	K	O	S	Z
<i>Fragaria vesca</i>	-	3-		
<i>Isothecium alopecuroides</i>	-0	-		
<i>Adenostyles glabra</i>	--0	--0		
<i>Crepis paludosa</i>	--0	--0		
<i>Dactylorhiza maculata</i>	--0	--0		
<i>Rubus saxatilis</i>	--0	--0		
<i>Valeriana tripteris</i>	3-	3-0		
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	3-0	--		
<i>Dicranum scoparium</i>	3-0	--		
<i>Knautia dipsacifolia</i>	3-0	3-		
<i>Ranunculus nemorosus</i>	3-0	3-		
<i>Ajuga reptans</i>	3-0	3-0		
<i>Deschampsia caespitosa</i>	3-0	3-0		
<i>Aposeris foetida</i>	3-0		3-0	
<i>Carex digitata</i>	-		3-	
<i>Poa nemoralis</i>	-		--0	
<i>Maianthemum bifolium</i>	--		-	
<i>Campanula trachelium</i>	--0		-	
<i>Aconitum napellus</i>	-0	-0		
<i>Carduus defloratus</i>	--0	--0		
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	--0	--0		
<i>Polypodium vulgare</i>	--0	--0		
<i>Asplenium viride</i>	3-	3-0		
<i>Moehringia muscosa</i>	3-0	3-0		
<i>Carex alba</i>	3-0	3-0		
<i>Listera ovata</i>	-0	3-	-	
<i>Calypogeia trichomanis</i>	-0	-0	-0	
<i>Neckera crispa</i>	-0	-	-0	
<i>Lysimachia nemorum</i>	--	-	--	
<i>Cirriphyllum piliferum</i>	--0	--0	--0	
<i>Geum rivale</i>	--0	--0	--0	
<i>Melandrium rubrum</i>	--0	--0	--0	
<i>Plagiochila asplenioides</i>	3-	3-	-	
<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	3-	3-	--	
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	3-0	3-0	-	
<i>Hylocomium splendens</i>	3-0	3-	--	
<i>Thuidium tamariscinum</i>	3-0	3-	--	
<i>Rhizomnium punctatum</i>	3-0	3-	--	
<i>Plagiomnium undulatum</i>	3-0	3-0	3-	

	K	O	S	Z
<i>Rhytidiadelphus loreus</i>		3-0	3-0	3-
<i>Frangula alnus</i>	-0	-0		-0
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	3-		--	--
<i>Gentiana pannonica</i>	-0	-0		-
<i>Thymus polytrichus</i>	-0	-0		-0
<i>Briza media</i>	-0	-0		-0
<i>Campyllum halleri</i>	-0	-0		-0
<i>Sorbus chamaemespilus</i>	-0	-0		-0
<i>Cerastium fontanum</i>	-0	-0		-0
<i>Phleum alpinum</i>	-0	-0		-0
<i>Carex pallescens</i>	-0	-0		-0
<i>Phyteuma orbiculare</i>	--0	--0		-
<i>Bazzania trilobata</i>	--0	--0		--
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	--0	--0		--0
<i>Gentiana asclepiadea</i>	3-	3-0		-
<i>Myosotis sylvatica</i>	-	--0	--0	
<i>Veratrum album</i>	-	--0	--0	
<i>Encalypta streptocarpa</i>	-0	-0	-0	
<i>Lathraea squamaria</i>	-0	-0	-0	
<i>Taraxacum officinale</i>	-0	-0	-0	
<i>Senecio abrotanifolius</i>	-0	-0	-0	
<i>Silene vulgaris</i>	-0	-0	-0	
<i>Stachys alopecurus</i>	-0	-0	-0	
<i>Barbilophozia lycopodioides</i>	-0	-0	-0	
<i>Ranunculus platanifolius</i>	-0	-0	-0	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	-0	-0	-0	
<i>Calamintha alpina</i>	-0	--0	-0	
<i>Dactylis glomerata</i>	--	--0	--0	
<i>Tussilago farfara</i>	--	--0	--0	
<i>Lycopodium annotinum</i>	--0	--0	-	
<i>Erica herbacea</i>	--0	--0	-	
<i>Eupatorium cannabinum</i>	--0	--0	--	
<i>Asplenium trichomanes</i>	--0	--0	--	
<i>Heracleum austriacum</i>	--0	--0	-0	
<i>Urtica dioica</i>	--0	--0	--0	
<i>Cirsium palustre</i>	--0	--0	--0	
<i>Euphorbia cyparissias</i>	--0	--0	--0	
<i>Pimpinella maior</i>	--0	--0	--0	
<i>Cephalanthera rubra</i>	--0	--0	--0	

	K	O	S	Z
<i>Cystopteris fragilis</i>	--0	--0	--0	
<i>Pseudoleskea incurvata</i>	--0	--0	--0	
<i>Polystichum lonchitis</i>	--0	--0	3-	
<i>Tortella tortuosa</i>	--	3-0	-	
<i>Huperzia selago</i>	--	3-0	-	
<i>Homogyne alpina</i>	3-	3-0	--	
<i>Calamagrostis varia</i>	3-	3-0	-	
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	3-0	3-0	-	
<i>Larix decidua</i>	3-0	3-0	--	
<i>Dentaria enneaphyllos</i>	3-0	3-0	--	
<i>Ranunculus montanus</i>	3-0	3-0	3-	
<i>Luzula luzulina</i>	3-0	3-0	3-0	
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	3-0	3-0	3-0	
<i>Cardamine flexuosa</i>	-	--0	--0	--
<i>Festuca gigantea</i>	-	--0	--0	--0
<i>Lophocolea bidentata</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Poa trivialis</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Ranunculus acris</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Scabiosa columbaria</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Crepis aurea</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Calamagrostis villosa</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Luzula glabrata</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Hypnum callichroum</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Agrostis alpina</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Alchemilla hoppeana</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Veronica aphylla</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Hylocomium pyrenaicum</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Coeloglossum viride</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Doronicum austriacum</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Peucedanum ostruthium</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Rumex arifolius</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Campylidium stellatum</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Poa supina</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Calycocorsus stipitata</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Myosotis palustris</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Plantago lanceolata</i>	-0	-0	-0	-0
<i>Veronica chamaedrys</i>	--	3-0	3-0	--
<i>Agrostis tenuis</i>	--0	--0	-0	-0
<i>Origanum vulgare</i>	--0	--0	--0	-

	K	O	S	Z
<i>Epipactis atrorubens</i>	--0	--0	--0	-
<i>Tofieldia calyculata</i>	--0	--0	--0	-
<i>Trollius europaeus</i>	--0	--0	--0	--
<i>Prunella vulgaris</i>	--0	--0	--0	--
<i>Leontodon hispidus</i>	--0	--0	--0	--
<i>Lotus corniculatus</i>	--0	--0	--0	--
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	--0	--0	--0	--
<i>Scapania aequiloba</i>	--0	--0	--	--0
<i>Rhynchostegium murale</i>	--0	--0	--	--0
<i>Cladonia pyxidata (sp.)</i>	--0	--0	--	--0
<i>Clematis alpina</i>	--0	--0	--	--0
<i>Aquilegia atrata</i>	--0	--0	-	--0
<i>Mnium thomsonii</i>	--0	--0	--0	--0
<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	--0	--0	--0	--0
<i>Trifolium pratense</i>	--0	--0	--0	--0
<i>Agrostis stolonifera</i>	--0	--0	--0	--0
<i>Trentepohlia aurea</i>	--0	--0	--0	--0
<i>Potentilla aurea</i>	--0	--0	--0	--0
<i>Festuca rubra</i>	--0	--0	-0	--0
<i>Pleurozium schreberi</i>	--0	--0	--0	--0
<i>Scapania aspera</i>	--0	--0	--0	--0
<i>Polygala amarella</i>	--0	--0	-0	--0
<i>Scleropodium purum</i>	--0	--0	-	--0
<i>Poa alpina</i>	--0	--0	--0	--0
<i>Selaginella selaginoides</i>	--0	--0	--0	--0
<i>Plagiomnium cuspidatum</i>	--0	--0	--	--0
<i>Polygonum viviparum</i>	--0	--0	-0	--0
<i>Conocephalum conicum</i>	--0	--0	--0	--0
<i>Peltigera praetextata</i>	--0	--0	--0	--0
<i>Ranunculus repens</i>	--0	--0	--0	--0
<i>Viola biflora</i>	3-	3-0	3-0	-
<i>Aster bellidiastrum</i>	3-	3-0	--	--
<i>Fissidens cristatus</i>	3-	3-0	3-	3-
<i>Polygala chamaebuxus</i>	3-0	3-0	3-	-
<i>Sesleria varia</i>	3-0	3-0	3-	-
<i>Gymnocarpium robertianum</i>	3-0	3-0	--	-
<i>Plagiomnium rostratum</i>	3-0	3-0	--	3-0
<i>Carex ferruginea</i>	3-0	3-0	3-	--
<i>Galium mollugo</i>	3-0	3-0	3-0	-

	K	O	S	Z
<i>Calamintha clinopodium</i>	3-0	3-0	3-0	--
<i>Geranium sylvaticum</i>	3-0	3-0	3-0	--
<i>Hypericum maculatum</i>	3-0	3-0	3-0	--
<i>Soldanella alpina</i>	3-0	3-0	3-	--
<i>Campanula cochleariifolia</i>	3-0	3-0	3-	--
<i>Potentilla erecta</i>	3-0	3-0	3-	3-
<i>Schistidium apocarpum</i>	3-0	3-0	3-	3-0
<i>Campanula scheuchzeri</i>	3-0	3-0	3-0	3-
<i>Galium anisophyllum</i>	3-0	3-0	3-0	3-0
<i>Alchemilla vulgaris</i>	3-0	3-0	3-0	3-0

1.1 Subassoziationen der tieferen Lagen

Die Höhenstufe von 600-1200 (1300) m ist (mit teilweiser Ausnahme des Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes) gekennzeichnet durch *Mercurialis perennis*, *Adenostyles glabra*, *Viola riviniana* + *reichenbachiana*, *Salvia glutinosa*, *Maianthemum bifolium*, *Sanicula europaea*, *Brachypodium sylvaticum*, *Origanum vulgare*, *Listera ovata*, *Calamintha clinopodium*, *Nettia nidus-avis* und die Moose *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium undulatum*, *Bazzania trilobata* und *Lophocolea bidentata*. Daneben sind noch einige häufige Weide- bzw. Störungszeiger auf die Tieflagen konzentriert, nämlich *Pimpinella maior*, *Dactylis glomerata* und *Tussilago farfara*. Die wesentlichen Arten sind in Laubwäldern verbreitet oder m.o.w. wärmeliebend. Sie stellen zumeist höhere Ansprüche an den Stickstoff- und Basenhaushalt des Bodens. Dies ist ein Hinweis auf den, verglichen mit den Hochlagen, raschen Umsatz der Streu, der zweifellos auf die höheren Temperaturen der Tieflagenstandorte zurückzuführen ist. Daneben

dürfte wohl auch die Verringerung der Niederschlagsmenge eine allzu starke Nährstoffauswaschung verhindern.

Folgende Subassoziationen wurden hier unterschieden:

- Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald
- Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald
- Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald
- Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald
- Reiner Hainlattich-Tannen-Buchenwald

1.1.1 WEISSEGGEN-HAINLATTICH-TANNEN-BUCHENWALD (Tabelle 1)

Diese Subassoziation besitzt die weiteste Verbreitung. Physiognomisch handelt es sich im typischen Fall um licht erscheinende, grasreiche Waldbestände mit sehr spärlicher Strauchvegetation. Neben der Fichte ist die Lärche hier anthropogen gefördert. Die Buche erscheint meist nur an schwer zugänglichen Stellen, z.B. am oberen Rand von Steilwänden.

Die Subassoziation wurde anhand von zwei Differentialartengruppen ausgeschieden. Die erste besteht aus *Larix decidua*, *Aster bellidiast-rum*, *Calamagrostis varia*, *Gymnocarpium robertianum*, *Melampyrum sylvaticum*, *Melica nutans*, *Ranunculus nemorosus*, *Sesleria varia*, *Veronica ur-*

ticifolia, *Valeriana tripteris* und *Knautia dipsacifolia*. Diese Arten differenzieren v.a. vom Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, treten aber auch im Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald des hochmontanen Bereichs auf. Die zweite Gruppe setzt sich zusammen aus *Carex alba*, *Carex flacca*, *Euphorbia amygdaloides*, *E. cyparissias*, *Polygala chamaebuxus* und *Sorbus aria*. Diese Gruppe fehlt in den Hochlagen.

Unter den genannten Differentialarten finden sich mehrere Arten der Schneeheide-Kiefernwälder und auch einige aus alpinen Kalksteinrasen. Die Arten sind insgesamt recht lichtbedürftig und ausgesprochen kalkliebend. *Gymnocarpium robertianum* weist speziell auf Kalkschutt hin. An die Stickstoffversorgung des Bodens werden nur geringe Ansprüche gestellt. In ihren Feuchtigkeitsansprüchen weisen die Arten im Mittel auf frische Bodenverhältnisse hin, wobei eine gewisse Tendenz zur Wechsell Trockenheit festzustellen ist. Unterschiede zwischen beiden Gruppen zeigen sich in den Wärmebedürfnissen: Die zweite Gruppe ist erwartungsgemäß deutlich thermophiler als die erste.

Entsprechend den Standortsansprüchen seiner Differentialarten findet sich der Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald typischerweise im hängigen Gelände, das zum einen trotz des ähnlichen Bestandesschlusses eine stärkere Durchlichtung ermöglicht als die relativ ebenen Standorte des Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Die Hangneigung beträgt im Durchschnitt etwa 30 Grad bei einer mittleren Exposition nach NNW. Das Substrat wird häufig von jungem Moränenmaterial gebildet, das oberflächlich noch etwas in Bewegung sein dürfte, so daß für ständigen Basennachschub gesorgt ist. Die aus Moränen entwickelten Böden sind sehr skelettreich. Sie besitzen deshalb nur eine relativ geringe Wasserspeicherkapazität, die höchstens durch die unterschiedlichen Mengen an lehmigem Zwischenmittel etwas angehoben wird. Verschlechtert wird der Wasserhaushalt sicher noch durch den verstärkten Oberflächenabfluß an steileren Hängen. Anhand von Thermographenaufzeichnungen wurde in einem Einzelfall auch eine Beeinflussung durch lokal begrenzte warme Fallwinde beobachtet, die zeitweise zu weiterer Austrocknung der Böden führen könnte. Stärkerer Föhn einfluß ist dagegen an den Nordhängen nicht zu erwarten, wie auch mit echtem Wassermangel angesichts der hohen Niederschläge des Gebiets nicht zu rechnen ist.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 60 +- 1
davon Gefäßpflanzen: 50 +- 1

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	7,0 +- 0,3
pralp:	20,1 +- 0,4
kont:	5,3 +- 0,1
smed:	17,6 +- 0,4
euras:	20,0 +- 0,6
subatl:	8,6 +- 0,2
no:	16,5 +- 0,4
arkt:	1,0 +- 0,1

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	5,13 +- 0,04 (Halbschatten)
Temperaturzahl:	4,06 +- 0,03 (kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,62 +- 0,01 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,27 +- 0,02 (frisch)
Reaktionszahl:	6,42 +- 0,03 (schwach sauer bis schwach basisch)
Stickstoffzahl:	4,76 +- 0,04 (mäßig stickstoffreich)

Auch in diesen Zahlenwerten spiegeln sich die schon beschriebenen Standortmerkmale des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes wider. Die Lichtzahl ist deutlich höher als bei dem in gleicher Höhenlage vorkommenden Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald. Mit dieser Lichtzahl mögen auch die relativ hohe Kontinentalitätszahl und die entsprechenden Anteile kontinentaler und subatlantischer Arten in Zusammenhang stehen, die evt. auf ein ausgeprägteres Strahlungsklima hinweisen. Die verglichen mit dem Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald erniedrigte Feuchte- und Stickstoffzahl sowie die erhöhte Reaktionszahl weisen durchweg auf einen höheren Karbonat- und geringeren Silikatanteil der Böden hin.

1.1.1.1 Reine Ausbildung

Die Reine Ausbildung stellt die weitverbreitete Normalform der Subassoziation dar, so wie sie oben beschrieben wurde. Sie entspricht in ihrer normalen, fichtenreichen Form der *Carex alba*-Ausbildung des *Piceetum montanum* und in ihrer buchenreichen Form ungefähr der *Carex digitata*-Ausbildung des *Abieti-Fagetum* LIPPERTs (1966). Vom Alpenostrand beschreibt ZUKRIGL (1973) eine typische Variante des Helleboro-(*Abieti*-)*Fagetum caricetosum albae*, die mit unserer Gesellschaft zu vergleichen ist.

Die Reine Ausbildung wurde in 8 Untereinheiten gegliedert. Die Einteilung erfolgte zum einen nach dem Auftreten von Blockschuttzeigern. Je nach Art des biotischen Einflusses wurde weiter unterschieden zwischen Einheiten mit und ohne Weidezeiger bzw. Schlagpflanzen. Größere Naturnähe zeichnet die Einheiten mit Buche aus. Die gefundenen Kombinationsmöglichkeiten dieser Differentialartengruppen zeigt die folgende Tabelle:

B	W	S	F
+	+	+	B (Blockschuttzeiger)
	+	+	W (Weidezeiger)
		+	S (Schlagpflanzen)
			+
			F (Buche)

Wie zu erwarten ist, fehlt also die Beweidung weitgehend auf blockschuttreichen Standorten. Buchenreiche Einheiten sind ebenfalls wenig weidebeeinflusst. Die Verjüngung der Buche scheint dies jedoch nicht zu erleichtern; Keimlinge finden sich hier zwar häufiger als in reinen Fichtenbeständen, in der Strauchschicht ist die Buche jedoch nicht zahlreicher vertreten.

Hinzuweisen ist noch darauf, daß nicht alle Schlagfluren, die an die-

ser Stelle eingeordnet wurden, im Artenbestand voll dem Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald entsprechen. Es wurden hier prinzipiell alle grasreichen Schlagfluren der tieferen Lagen untergebracht, auch wenn nur wenige Arten der Subassoziatiön auftraten.

Im Bereich der Aufnahme 15 - nördlich der Stuben-Alm in 860 m Meereshöhe wurde folgendes Profil einer aus Würmmoräne entwickelten Lehmrendzina gefunden:

OL	1 cm	Streu aus Gras und Fichtennadeln
Ah	0 - 15 cm	dunkelbrauner uL mit 10 bis 20 % Sand, Grus und gerundeten Steinen, krümelig, locker bis mäßig dicht, stark durchwurzelt
IIAhBv	15 - 30 cm	mittelbrauner, stark steinig-sandiger (50 %) uL, krümelig bis subpolyedrisch, humushaltig, mäßig dicht, mäßig durchwurzelt
Cv	29 - >38 cm	weißlich-braunes Moränenmaterial aus Kies mit uS als Zwischenmittel, Einzelkorngefüge, dicht, schwach durchwurzelt

1.1.1.2 Frangula-Ausbildung

Das Vorkommen dieser Ausbildung, von der nur wenige Aufnahmen existieren, ist auf St. Bartholomä beschränkt. Sie besiedelt dort im Unterschied zu fast allen anderen Ausbildungen des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes ausschließlich ebenes Gelände.

Typisch für die Frangula-Ausbildung ist ihr großer Laubholzreichtum; Buche und Bergahorn erscheinen reichlich in der Baumschicht; die Esche tritt in der Strauchschicht in größeren Mengen auf. An weiteren Differentialarten finden sich Frangula alnus, Hepatica nobilis und Rubus saxatilis.

Die Ausbildung verdankt ihr Entstehen sicher der Kombination zahlreicher Standortsfaktoren; der Reichtum an Laubholz mag auf geringe forstliche Beeinflussung hinweisen, obwohl sich in St. Bartholomä auch viele künstlich begründete Buchenbestände finden. Die Esche scheint im Umkreis des Königssees allgemein durch luftfeuchtes und milderes Klima begünstigt zu sein. Ebenso dürfte *Hepatica nobilis* auf eine höhere Jahrestemperatur hinweisen, die nicht zuletzt durch die geringe Meereshöhe bedingt ist. *Rubus saxatilis* verlangt ebenfalls höhere Temperaturen, wenn auch nur im Sommer. *Frangula alnus* schließlich kommt im Gebiet ganz allgemein nur auf ebenen Talböden geringer Meereshöhe vor und scheint hier auf eine gewisse Nährstoff- bzw. Basenverarmung hinzuweisen. Als Ursache hierfür kann einerseits die gegenüber Hangstandorten stärker fortgeschrittene Bodenreifung in Betracht gezogen werden. Andererseits sind solche Standorte auch besonders leicht zugänglich, so daß hier auch der Einfluß von Streunutzung nicht auszuschließen ist.

1.1.1.3 *Galium rotundifolium*-Ausbildung

Diese Einheit, die ungefähr der *Galium rotundifolium*-Ausbildung des *Piceetum montanum* bei LIPPERT (1966) entspricht, ist nur durch *Galium rotundifolium* selbst gekennzeichnet. Ob es sinnvoll ist, sie aufzustellen, ist zweifelhaft. Die Ausbildung ist jedoch weit verbreitet und scheint deutlich lehm- und tonreichere Böden anzuzeigen als die Reine Ausbildung. Mit dem Silikatreichtum dürfte auch ein etwas saurerer Charakter der Böden verbunden sein.

Im Bereich der Aufnahme 16, nicht weit entfernt von dem zuletzt beschriebenen Profil, wurde folgende Rendzina-Terra fusca aus Würmmoräne gefunden:

OL	0,5 cm	Streu aus Gras und Fichtennadeln
OF	1 cm	Gras und Fichtennadeln in beginnender Verwesung
Ah	0 - 9 cm	dunkel- (bis schwarz-) brauner uL mit feinkörnigem Grus, steinig, krümelig, locker, mit Regenwurmkot, stark durchwurzelt

AhBv1	9 - 17 cm	dunkelbraun, durch Humus gefleckt, 50 % steiniger Grus mit utL als Zwischenmittel, subpolyedrisch, mäßig dicht, gut durchwurzelt
AhBv2	17 - 29 cm	mittel- bis dunkelbraun, 50 % Grus mit utL als Zwischenmittel, durch eingearbeiteten Humus dunkel gefleckt, subpolyedrisch, mäßig dicht, mäßig durchwurzelt
AhBvCv	29 - >60 cm	grobblockiges, gerundetes Moränenmaterial (Blöcke bis 40 cm) mit hellbraunem, steinig-sandigem, (u)tL als Zwischenmittel, durch eingearbeiteten Humus dunkel gefleckt, subpolyedrisch bis polyedrisch, mäßig dicht, schwach durchwurzelt

Die Ausbildung gliedert sich in Varianten mit und ohne Blockschuttbesiedler, wobei Blockschuttstandorte offenbar bevorzugt werden. Des weiteren wurde eine etwas untypische Schlagform ausgeschieden.

1.1.1.4 Soldanella-Ausbildung

Die Soldanella-Ausbildung besiedelt die höchsten Lagen im Bereich des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Die mittlere Meereshöhe liegt bei 1180 m. Das Aufnahmematerial stammt vorwiegend aus der Umgebung der Stuben-Alm und damit weithin aus beweideten und evt. deshalb schwachwüchsigen Beständen.

Die Ausbildung stellt den Übergang zum Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald der Hochlagen dar und hat deshalb viele Differentialarten mit diesem gemeinsam. Es handelt sich dabei v.a. um Arten der Hochstaudenfluren und zum Teil auch der Rostseggenrasen und der Fichtenwälder. Gemeinsam ist den Differentialarten die Anpassung an kühles und feuchtes Klima. Sie verlangen relativ ozeanische Bedingungen, die sich üblicherweise mit steigender Meereshöhe zunehmend deutlicher ausprägen. Luzula

sylvatica weist auf eine klimabedingte Hemmung der Streuzersetzung hin.

Je nach biotischem Einfluß wurden zwei unterschiedlich stark beweidete Formen unterschieden. Auch Schlagfluren wurden hier eingeordnet. Diese Zuordnung ist freilich auch hier wieder etwas unsicher. Alle an Hochstaudenarten armen, also etwas trockeneren Schlagfluren der Hochlagen wurden dieser Einheit zugewiesen. Zur Unterscheidung von den Schlagfluren der Reinen Ausbildung diente bei der Kartierung oft nur *Luzula sylvatica*.

Neben Art und Ausmaß der anthropogenen Beeinflussung diente als Gliederungskriterium wiederum die Felsigkeit des Geländes, in der Tabelle also das Vorkommen von Felsbesiedlern, dabei v.a. der Felsmoose. Auch hier ist die beweidete Variante felsfrei.

Natürlich bedingt ist weiterhin die unbedeutende und nicht kartierte Ausbildung mit den feuchtigkeitsliebenden Moosen *Scleropodium purum*, *Lophocolea bidentata* und *Trichocolea tomentella*. Sie tritt offenbar an besonders sickerfeuchten Hängen auf.

Eine *Soldanella*-Ausbildung des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchengewaldes wird auch von THIELE (1978) unterschieden, die wohl ähnlich wie unsere Gesellschaft nicht zuletzt auch dem Weideeinfluß ihr Vorkommen verdankt. Mit unserer Gesellschaft vergleichbar ist dabei v.a. die Reine *Soldanella*-Ausbildung THIELEs.

1.1.1.5 *Luzula luzulina*-Ausbildung

Die *Luzula luzulina*-Ausbildung ist durch eine Reihe von Differentialarten des weiter unten besprochenen Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchengewaldes gekennzeichnet, zu dem sie überleitet. Die Arten sind sämtlich schatten- und zum Teil feuchtigkeitsliebend. Außerdem weisen sie auf relativ saure Böden hin.

Die angegebenen Standortsbedingungen finden sich v.a. im Bereich dichter Fichtenbestände. Ob neben der Beeinflussung durch die Fichte auch noch abiotische Standortsfaktoren für das Auftreten der Einheit verantwortlich sind, sei dahingestellt; sie ist wohl zu undeutlich von

anderen Ausbildungen abgehoben, als daß sie auf größere Standortssonderheiten hinweisen könnte.

Die weitere Untergliederung der Ausbildung erfolgte wieder anhand des Blockschuttreichtums der Standorte. Weideeinfluß ist kaum zu beobachten.

Die *Luzula luzulina*-Ausbildung wurde ursprünglich der *Soldanella*-Ausbildung, die ebenfalls etwas feuchtere und saurere Standorte einnimmt, untergeordnet. In den meisten ihrer Aufnahmen finden sich auch m.o.w. viele von deren Differentialarten. Bei der Kartierung wurde darauf jedoch meist nicht geachtet. Es wurden hier vielmehr alle möglichen schwer identifizierbaren und als Übergangsformen zwischen Weißseggen- und Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald betrachteten m.o.w. dichten Fichtenbestände eingeordnet. Der Informationsgehalt der Karte ist also im Bereich dieser Ausbildung recht gering.

1.1.1.6 *Thelypteris*-Ausbildung

Die *Thelypteris*-Ausbildung besitzt nur geringe flächenmäßige Bedeutung. Typisch ist ihr Reichtum an feuchtigkeitsliebenden Moosen und an azidophilen Arten. Sie tritt typischerweise an sickerfeuchten Hängen auf, deren lichter Baumbestand jedoch zeitweise auch eine stärkere Austrocknung des Bodens durch Sonneneinstrahlung und möglicherweise auch durch Föhn zulassen dürfte. Die Azidität der Standorte mag bedingt sein durch gehemmte Streuzersetzung - hier evt. hervorgerufen durch den Wechsel zwischen Überfeuchtung und Austrocknung.

1.1.1.7 *Calamagrostis*-Ausbildung

Auch die *Calamagrostis*-Ausbildung - charakterisiert durch *Calamagrostis villosa* und *Pteridium aquilinum* - ist eine flächenmäßig unbedeutende Spezialeinheit. Sie ähnelt der vorhergehenden in ihrem azidophilen Charakter bei gleichzeitig geringem Bestandesschluß, unterscheidet sich jedoch offenbar durch etwas größere Trockenheit der Standorte -

kenntlich an dem meist wesentlich geringeren Moosanteil. Hier mag besonders der Föhn die Streuzersetzung bremsen. Ganz allgemein scheint ja der Adlerfarn im Gebiet die stärker föhnbeeinflussten Bereiche zu bevorzugen. Es handelt sich dabei im Gebiet um die kontinentalere ssp. *aquilinum*, die in Kiefernwäldern weiter verbreitet ist und auch im Berchtesgadener Bereich besonders im Schneeheide-Kiefernwald und verwandten Gesellschaften auftritt.

Die Zugehörigkeit der *Calamagrostis*-Ausbildung zum Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald ist im übrigen bereits etwas fraglich; physiognomisch, d.h. aufgrund des Grasreichtums, paßt sie zwar hierher, die Differentialarten werden hier jedoch recht spärlich.

1.1.1.8 *Astrantia*-Ausbildung

Die *Astrantia*-Ausbildung ist nur durch eine Aufnahme aus dem Wimbachtal belegt. Ihre Differentialarten weisen auf einen höheren Lehm- bzw. Tongehalt des Bodens hin. Die vorliegende Aufnahme ist reich an Grünlandarten, die auf stärkeren Weideeinfluß hindeuten.

1.1.1.9 *Lotus*-Ausbildung

Die *Lotus*-Ausbildung ist charakterisiert durch einen besonders geringen Deckungsgrad der Baumschicht von durchschnittlich 13 %. Sie tritt häufig in kleineren Bestandeslücken auf. Die mittlere Meereshöhe der erhaltenen Aufnahmen ist mit 690 m auffallend gering.

Die Tendenz zur reinen Rasengesellschaft ist relativ stark; die Ableitung von einer bestimmten Rasengesellschaft fällt jedoch schwer: Es treten sowohl Arten der alpinen Kalksteinrasen als auch der Fettwiesen und z.T. auch der Kalkmagerrasen auf.

Die eigentlichen Differentialarten zeichnen sich erwartungsgemäß alle durch höhere Lichtansprüche aus, im Wärmebedürfnis sind sie auffällig indifferent, bezüglich der Stickstoffversorgung recht anspruchslos.

Soziologisch gehören sie verschiedenen Klassen von Rasengesellschaften an. Ein größerer Teil ist auch soziologisch m.o.w. indifferent, allerdings beschränkt auf die anthro-po-zoogenen Wiesen und Heiden. *Tofieldia calyculata* fällt als Kalkflachmoorart etwas aus dem Rahmen.

Die Lotus-Ausbildung gliedert sich in zwei Untereinheiten:

1.1.1.9.1 Reine Lotus-Ausbildung

Die weiter verbreitete Reine Lotus-Ausbildung erscheint normalerweise im geneigten Gelände und bei etwa größerer Meereshöhe. Sie wurde nach dem Beweidungsgrad weiter unterteilt. Die schwächer beweidete Form besitzt noch am ehesten Waldcharakter bei einem mittleren Bestandesschluß von 20 %. Die beweidete Ausbildung dagegen weist stärkere Anklänge an Grünlandgesellschaften auf, ohne jedoch als echte Wirtschaftswiese betrachtet werden zu können.

1.1.1.9.2 Lotus-Ausbildung mit *Hippocrepis*

Diese Einheit wurde nur in St. Bartholomä gefunden. Sie besiedelt dort ebenes Gelände v.a. in Seeufer-nähe oder am Bach, nicht allzuweit entfernt von den Schotterfeldern des Eisbaches.

Der Waldcharakter dieser Einheit ist besonders gering; nur in der Strauchschicht ist die Fichte - z.T. auch die Buche - noch reichlich vertreten.

Die Differentialarten stammen zumeist aus dem Bereich der Kalkmager-rasen und weisen vorwiegend auf trockene Verhältnisse hin. Auffällig ist besonders auch *Erica herbacea* als Art der Schneeheide-Kiefernwälder. Mit *Selaginella selaginoides* aus dem Bereich der Kalkflachmoore und *Succisa pratensis*, einer Charakterart der Pfeifengraswiesen sind jedoch auch ausgesprochene Feuchtezeiger unter den Differentialarten zu finden. Auch *Molinia* selbst erscheint z.T. in den Aufnahmen. Der Wasserhaushalt scheint also recht unausgeglichen zu sein: Der Grundwasserspiegel steht zwar sicher sehr nahe der Bodenoberfläche; die aus den Kiesablagerungen des Eisbaches gebildeten Böden dürften hier jedoch noch relativ wenig entwickelt sein. Ihre Wasserhaltekapazität ist entsprechend gering und die Tendenz zu oberflächlicher Austrocknung groß.

Weideeinfluß ist wohl für die meisten Vorkommen der Einheit anzunehmen. Die stets vorhandenen Sträucher sind meistens verbissen - wie üblich besonders die jungen Buchen.

1.1.2 SCHNEEHEIDE-HAINLATTICH-TANNEN-BUCHENWALD (Tabelle 4)

Die hier als Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald bezeichnete Subassoziation wurde auf föhnbeeinflussten Dolomitstandorten an den westlichen Hängen des Hirschbichtales angetroffen. Sie ist dem Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald nahe verwandt. Physiognomisch handelt es sich auch hier häufig um grasreiche, eher lichte Bestände. Unterschiedlich erscheint dagegen einmal der Grad der forstwirtschaftlichen Beeinflussung: Die Buche überwiegt im Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald ganz deutlich über die Fichte; sie bildet mitunter auch dicht geschlossene Bestände. Etwas häufiger ist auch die Tanne - in erster Linie allerdings nur im Keimlingsstadium.

Beim Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald wäre wohl die vorwiegend im Wimbachtal aufgenommene *Carex sempervirens*-Ausbildung des Abieti-Fagetum LIPPERTs (1966) anzuschließen, die sehr reich an *Erica herbacea*, aber auch an anderen Differentialarten des Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes ist. Ebenfalls im Wimbachtal kommt der Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald THIELES (1978) vor, dessen Reine und Reine *Moehringia*-Ausbildung in gleicher Weise dem Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald zugeordnet werden könnten. Auch bei ZUKRIGL finden sich in der *Calamagrostis varia*-Variante des Helleboro-(Abieti-) Fagetum *caricetosum* albae und v.a. dem Helleboro-Fagetum *calamagrostietosum variae* ähnliche, hier z.T. besonders kiefernreiche Gesellschaften der Sonnhänge.

Die Differentialartenkombination des Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes stimmt teilweise mit der des oben beschriebenen Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes überein. Trotzdem werden hier deutliche Unterschiede sichtbar. Am auffälligsten ist das regelmäßige Vorkommen von *Erica herbacea*, die im Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald normalerweise fehlt. Zur Schneeheide kommen außerdem *Hepatica nobilis*, *Carex ferruginea*, *Dentaria enneaphylos*, *Buphthalmum salicifolium*, *Heraclium austriacum*, *Carduus defloratus*, *Scabiosa columbaria*, *Laserpitium latifolium*, *Valeriana saxatilis*, *Rubus saxatilis*, *Centaurea montana*, *Lilium martagon*, *Amelanchier ovalis*, *Aquilegia atrata* und *Aconitum napellus*. Viele dieser Arten sind auch für die später zu besprechende Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft typisch, andere für den Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald und den Horstseggenrasen. Die Arten sind teils wärmeliebend; es finden sich jedoch auch ausgesprochene Kühlezeiger unter ihnen, wie v.a. *Carex ferruginea*, die vielleicht einem ausgeprägteren Strahlungsklima ihr Vorkommen verdanken.

Einheitlich verhalten sich die Arten indes in ihren hohen Lichtansprüchen und ihrer Vorliebe für karbonatreiche, oft auch flachgründige Böden. Auf eine geringe Stabilität des Dolomituntergrundes weist das häufige Vorkommen der Lausche hin. Der Dolomit ist an vielen Stellen in lebhafter physikalischer Verwitterung begriffen und neigt zur Bildung stark zerrissener Geländeformen mit abbröckelnden, zerklüfteten Felspartien, von denen Schutthalden aus grusigem Material ihren Ausgang nehmen.

Gegenüber dem Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald fehlen in der vorliegenden Gesellschaft andererseits auch wichtige Arten. V.a. die *Sanicula*-Gruppe ist nur sehr lückenhaft vertreten. Es fehlen z.B. *Sanicula europaea* selbst, *Brachypodium sylvaticum* und *Eurhynchium striatum*: ein Hinweis auf den geringen Lehmgehalt der Böden.

Auch unter den engeren Differentialarten des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes, nämlich den Arten der *Calamagrostis varia*- und besonders der *Carex alba*-Gruppe treten auffällige Lücken zutage: *Melampyrum sylvaticum*, *Euphorbia amygdaloides* und *cyparissias* fehlen z.T. vollständig. Auffällig ist auch die geringe Häufigkeit der Weißsegge selbst, die häufig durch die Fichte gefördert wird und deshalb in den buchenreichen Beständen des Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes offenbar ungünstigere Lebensbedingungen findet (SEIBERT, mdl.). Allerdings ist nie mit völliger Sicherheit zu sagen, ob *Carex alba* in grö-

Gereren Beständen der äußerlich recht ähnlichen *Carex ferruginea* nicht manchmal übersehen wurde. An der Verbreitungslücke der Wolfsmilcharten mag dagegen die Ameisenverbreitung dieser Arten mitschuldig sein, die vielleicht auch das Vorkommen von *Hepatica nobilis* im Gebiet mitbeeinflusst.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 47 +- 2
davon Gefäßpflanzen: 41 +- 2

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	7,8 +- 0,7
pralp:	20 +- 1
kont:	4,7 +- 0,4
smed:	13,7 +- 0,8
euras:	12,0 +- 0,9
subatl:	6,3 +- 0,4
no:	10,3 +- 0,7
arkt:	0,8 +- 0,2

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	5,5 +- 0,1	(Halbschatten)
Temperaturzahl:	3,96 +- 0,06	(kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,66 +- 0,03	(subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,04 +- 0,06	(frisch)
Reaktionszahl:	6,7 +- 0,1	(schwach sauer bis schwach basisch)
Stickstoffzahl:	4,2 +- 0,1	(stickstoffarm bis mäßig stickstoffreich)

Noch höher als beim Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald liegt hier erwartungsgemäß die Lichtzahl. Sie entspricht einem geringeren Bestandesschluß von 41 % +- 6 % gegenüber 50 % +- 2 % bei der genannten Gesellschaft (ohne Berücksichtigung der Schlagfluren). Höher liegt wei-

terhin die Reaktionszahl. Auch sie entspricht den Standortsansprüchen der Differentialarten. Die Feuchtezahl läßt wiederum auf etwas trockenere Bedingungen schließen und die Stickstoffzahl auf schlechtere Nährstoffversorgung. Die größere Standortstrockenheit kann dabei sowohl auf den Föhneinfluß als auch auf die Feinerdearmut vieler Dolomitstandorte zurückgeführt werden. Der häufig geringe Feinerdegehalt der Böden erklärt auch die schlechte Nährstoffversorgung. Lehmmarmut ist allerdings auf Dolomitstandorten keineswegs generell anzunehmen, wie noch gezeigt wird.

Die insgesamt recht extremen Standortsverhältnisse mögen für die deutliche Reduktion der Gesamtartenzahl gegenüber dem Weißseggen- und Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald verantwortlich sein, von der v.a. die Moose stärker betroffen sind. Die Anteile der Geoelemente ähneln weitgehend denjenigen des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes; nur eurasiatische Arten sind deutlich seltener, was ihre Anzahl, nicht aber was den Prozentanteil betrifft.

Auch das Lebensformenspektrum zeigt deutliche Unterschiede zum Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, wobei auch hier eine größere Standortstrockenheit des Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes erkennbar wird. Die Zahl skleromorpher Arten ist entsprechend größer (11,0 $\pm$ 0,9 gegenüber 9,1 $\pm$ 0,3 beim Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald), die Zahl hygromorpher Arten kleiner (11,4 $\pm$ 0,7 gegenüber 19,9 $\pm$ 0,5).

1.1.2.1 Reine Ausbildung

Die Reine Ausbildung entspricht dem Grundtyp der Subassoziaton. Sie weist einen recht geringen Bestandesschuß von 32 % $\pm$ 9 % auf. Stellenweise geht sie in rasenartige Gesellschaften mit dominierender *Carex ferruginea* über, die jedoch floristisch den weiter unten besprochenen Rostseggenrasen nicht voll entsprechen. In der Baumschicht ist recht häufig die Lärche beteiligt, in der Krautschicht dominiert meist das *Calamagrostis varia*. Das Vorkommen der Ausbildung beschränkt sich weitgehend auf O- und SO-Hänge. Eine beweidete Form mit *Dactylis glomerata*, *Trifolium pratense* und anderen Weidezeigern wurde nur einmal erfaßt.

1.1.2.2 Kiefern-Ausbildung

Diese recht seltene Ausbildung leitet zum Schneeheide-Kiefernwald über. Sie besitzt neben der Kiefer *Scleropodium purum*, *Briza media* und *Pteridium aquilinum* als Differentialarten. Diese Arten deuten wohl auf einen gehemmten Nährstoffumsatz, v.a. eine reduzierte Stickstoffmineralisation und die damit verbundene stärkere Humusakkumulation hin. Auch das, wenn auch sporadische, Vorkommen von *Vaccinium vitis-idaea* weist in diese Richtung. Stickstoff- und Reaktionszahl liegen entsprechend auch etwas niedriger als bei der Reinen Ausbildung.

Als Ursache für die gehemmte Streuzersetzung ist eine stärkere Föhnexponierung und die damit verbundene zeitweise Austrocknung des Bodens anzunehmen.

Eine beweidete Form der Ausbildung erscheint in der Tabelle, sie wurde freilich nicht kartiert.

1.1.2.3 Campanula-Ausbildung

Die Differentialarten der Campanula-Ausbildung entstammen v.a. dem Bereich der Kalkschuttfluren. Dazu gehören *Gymnocarpium robertianum*, *Campanula cochleariifolia* und wohl auch *Silene vulgaris*. Auch Felsbesiedler wie *Asplenium viride* und *Geranium robertianum* charakterisieren die Einheit. Ihr Standort ist trotzdem mehr durch feinkörnigen Dolomitgrus geprägt, der an der Bodenoberfläche zutage tritt.

Die Grusbedeckung mag z.T. aus verwitternden Felspartien stammen. Bedeutungsvoller dürfte jedoch die Bodenerosion sein. Die Einheit besiedelt nämlich steile Hänge von durchschnittlich 42 +/- 4 Grad Neigung. Die Erosionsanfälligkeit dieser Standorte ist offenbar groß; v.a. Schneebewegungen dürften hier häufig Verletzungen der Bodenoberfläche bewirken. Der relativ spärliche und manchmal auch ganz fehlende Baumbewuchs kann derartige Bewegungen sicher nur unzureichend aufhalten. Da hier außerdem allenfalls Laubholzbestände vorkommen, die im entlaubten Zustand kaum eine Interzeption zeigen, sind zudem auch recht mächtige Schneedecken zu erwarten (Dr. B. ZENKE mdl.).

Eine Verjüngung konnte auf den Aufnahme­flächen kaum festgestellt werden; auch sie dürfte den Auswirkungen des Schnees zum Opfer fallen. Der beobachtete Säbelwuchs vieler Buchen könnte entsprechend der mechanischen Beanspruchung im Jugendstadium zuzuschreiben sein.

Die Bodenbewegungen verhindern auch jegliche Entbasung des Oberbodens. Dies drückt sich in einer hohen Reaktionszahl von $7,40 \pm 0,06$ aus.

1.1.2.4 Molinia-Ausbildung

Diese Ausbildung tritt an m.o.w sickerfeuchten Hängen auf. Neben dem Hirschbichtal wurde sie auch in St. Bartholomä häufiger gefunden. Als einzige Differentialart findet sich hier *Molinia arundinacea*, die dafür aber meist bestandesbildend auftritt. Der Baumbestand der Ausbildung ist besonders licht ($9\% \pm 2\%$ Deckungsgrad) und der Rasencharakter der Einheit entsprechend ausgeprägt. Eine Verjüngung der Baumarten dürfte in den hochwüchsigen *Molinia*-Rasen z.T. durchaus erschwert sein. Daß trotzdem recht häufig eine Strauchschicht entwickelt ist, könnte an der Steilheit des Geländes (38 ± 2 Grad) liegen, die durch die Begünstigung der Erosion ein allzu dichtes Zusammenwachsen der Grasdecke verhindert. Die Hänge sind aus diesem Grund oft schrofig und von kleinen Anrissen durchsetzt.

Die Gesellschaft steht sicherlich in Beziehung zu den *Molinia litoralis*-Gesellschaften LIPPERTs. Ihr Rasencharakter erscheint jedoch weniger extrem; ihre Böden dürften einen höheren Reifegrad aufweisen. Insgesamt scheint sie mehr zum Pfeifengras-Kiefernwald überzuleiten, auch wenn die Kiefer nur in einer einzigen Aufnahme auftritt.

Die *Molinia*-Ausbildung wurde in eine reine Form, in eine Form mit Schlagpflanzen und eine humussaure Form mit *Vaccinium vitis-idaea* untergliedert. Letztere wurde nicht kartiert; sie besitzt in der Aschau (Reiter Alm) größere Bedeutung.

1.1.2.5 Polystichum-Ausbildung

Die Polystichum-Ausbildung ist v.a. durch die Dominanz der Buche gekennzeichnet, die hier dichte Bestände bildet (Bestandesschluß 83 % $\pm$ 2 %). Wie im Ahorn-Buchenwald und im Bereich der Schluchtwälder (s.u.) ist auch hier Polystichum lobatum mit der Buche vergesellschaftet. Als weitere Differentialarten kommen vor: Mycelis muralis, Phyteuma spicatum) und das Moos Rhizomnium punctatum. Die Bodenvegetation wird dabei durch eine meist dichte Laubdecke weithin unterdrückt, so daß durch die Aufnahmen manchmal fast nur der Bewuchs laubarmer Buckel erfaßt wird.

Die Ausbildung bevorzugt v.a. nördliche und nordöstliche Expositionen, also föhnabgewandte, feuchtere Hänge, wo die Verwitterung des Dolomits rascher vonstatten geht. Hier finden sich stellenweise tiefgründigere, offenbar nährstoffreiche Lehm Böden. Die gute Nährstoffversorgung wird sowohl an den Differentialarten als auch an der hohen mittleren Stickstoffzahl (4,9 $\pm$ 0,2) der Ausbildung ersichtlich.

1.1.2.5.1 Reine Polystichum-Ausbildung

Die Reine Polystichum-Ausbildung ist am weitesten verbreitet. Sie besiedelt flachgründigere Böden an relativ steilen Hängen (34 $\pm$ 3 Grad). Fast immer findet sich oberflächlicher Dolomitgrus.

1.1.2.5.2 Polystichum-Ausbildung mit Blechnum

Diese Gesellschaft ist durch zwei Säurezeiger ausgezeichnet, nämlich Thelypteris limbosperma und Blechnum spicant. Sie besiedelt wohl tiefgründigere, zumindest oberflächlich versauerte Lehm Böden. Zweifellos handelt es sich dabei um Terrae fuscae, obwohl nähere Untersuchungen fehlen. Flächenmäßig ist diese Einheit im übrigen bedeutungslos.

1.1.3 HAINSIMSEN-HAINLATTICH-TANNEN-BUCHENWALD (Tabelle 2)

Der Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald erscheint für kalkalpine Verhältnisse eher untypisch. Es handelt sich physiognomisch um moos- und krautreiche grasarme und relativ dichte Bestände, deren Baumschicht heute v.a. von der Fichte eingenommen wird. Ausgewachsene Buchen wurden fast nie gefunden.

Bei MAYER (1959) findet der Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald wohl seine Entsprechung in der Hochlagenform des Waldgersten-Fichten-Tannen-Buchenwaldes, obwohl *Elymus europaeus* normalerweise fehlt. Bei LIPPERT (1966) ist die *Rhytidiadelphus loreus*-Ausbildung des *Piceetum montanum* unserer Gesellschaft vergleichbar. Am Alpenostrand andererseits ist das Helleboro-(*Abieti*-)Fagetum *cardaminetosum trifoliae* (ZUKRIGL 1973) als Gesellschaft tonreicher, schwach sauerhumoser Böden hier am ehesten einzuordnen.

Zwei Gruppen von Arten differenzieren vom Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald: Die erste meidet auch den Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald; sie besteht aus *Carex sylvatica*, *Cardamine flexuosa*, *Veronica officinalis*, *Thelypteris phegopteris*, *Luzula pilosa*, *Anemone nemorosa*, *Ranunculus repens*, *Cirsium palustre*, *Galium rotundifolium*, *Lathraea squamaria* sowie den Moosen *Rhytidiadelphus loreus* und *Atrichum undulatum*. Die zweite ist auch im Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald häufiger und umfaßt *Luzula luzulina* selbst, *Viola biflora*, *Dryopteris austriaca* s.str., *Gymnocarpium dryopteris* und *Polytrichum formosum*. Die Arten sind insgesamt größtenteils Schattenpflanzen. Sie bevorzugen teilweise etwas kühleres Klima. In ihren Feuchtigkeitsbedürfnissen weisen sie auf frische bis etwas feuchtere Standortbedingungen hin. Die Ansprüche an die Stickstoffversorgung sind relativ hoch. Charakteristisch ist weiterhin ihre zumeist vorhandene Vorliebe für eher saure Bodenverhältnisse. Entsprechend findet sich unter ihnen, trotz Überwiegens der Buchenwaldarten, auch die eine oder andere Fichtenwaldart.

Typische Standorte des Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes sind wenig geneigte Talböden. Ein Großteil der Aufnahmen stammt z.B. vom Schapbach-Boden. Gerade in diesem Gebiet sorgt der Schapbach für gut wasserversorgte Böden. An den östlichen Talhängen treten hier außerdem silikatreichere Gesteine verschiedener Formationen auf, deren tonige Verwitterungsprodukte sich im Talgrund akkumulieren dürften und dort relativ schwere, wenn auch an karbonatischem Skelett noch sehr reiche

Böden bilden, die zumindest teilweise zur Staunässe neigen. Der relativ hohe Feinerdegehalt mag z.T. die gute Stickstoffversorgung erklären, wie sie an der Vegetation abzulesen ist.

Der Silikatreichtum des Bodens im Verein mit intensivem Fichtenanbau erklärt die etwas azidophile Vegetation. Die biologische Aktivität erscheint jedoch trotzdem noch recht hoch. Es dürfte nur zur Bildung von F-Mull oder allenfalls Moder als Humusform kommen. Auch der Artenreichtum ist gegenüber Fichtenforsten des Flachlandes sehr groß. Diese geringe Beeinträchtigung der Lebensformen in und auf dem Waldboden von Fichtenbeständen ist in höheren Lagen wohl auf die stärkere Auswaschung der in der Nadelstreu enthaltenen Hemmstoffe zurückzuführen. (KNAPP 1967)

Klimatisch ist für die Standorte des Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes oft eine gewisse Spätfrostgefährdung durch Kaltluftstau anzunehmen. Die Buche dürfte deshalb hier von Natur aus zugunsten der Edellaubhölzer und der Fichte zurücktreten, zumal auch die Böden hier wohl für sie nicht ganz optimal sind. Ob als natürliche Waldgesellschaft hier jedoch eine Form des Ahorn-Eschenwaldes anzunehmen wäre, kann ohne geeignete Vergleichsbestände nicht entschieden werden. Eine natürliche Fichtenwaldgesellschaft entsprechend etwa dem Fichten-Auwald (Soldanello-Piceetum bazzanietosum) der feuchten Kaltluftstaulagen im Bayerischen Wald (PETERMANN 1979) ist wegen des Reichtums an Buchenwaldarten unwahrscheinlich.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 60 +- 2

davon Gefäßpflanzen: 48 +- 1

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	4,8 +- 0,3
pralp:	14,8 +- 0,6
kont:	3,7 +- 0,2
smed:	16,9 +- 0,7
euras:	21,9 +- 0,8
subatl:	10,1 +- 0,4

no:	18,8 +- 0,6
arkt:	1,1 +- 0,1

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	4,76 +- 0,06 (Halbschatten)
Temperaturzahl:	4,03 +- 0,03 (kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,46 +- 0,01 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,63 +- 0,03 (frisch bis feucht)
Reaktionszahl:	6,04 +- 0,04 (schwach bis mäßig sauer)
Stickstoffzahl:	5,40 +- 0,04 (mäßig stickstoffreich)

Signifikante Unterschiede gegenüber dem Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, die auch in den Differentialarten bereits deutlich werden, zeigen sich hier in den geringeren Lichtbedürfnissen, den höheren Wasser- und Nährstoffansprüchen sowie der Bevorzugung etwas saurerer Böden.

Die Anteile des kontinentalen und subatlantischen Geoelements und entsprechend auch die Kontinentalitätszahl weisen auf atlantischere Klimabedingungen hin, als sie an den Standorten des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes gegeben sind. Die Ursache hierfür dürfte ein weniger ausgeprägtes Strahlungsklima sein. Die geringe Durchlichtung der Bestände dürfte auch für das Zurücktreten der alpinen, weniger allerdings der präalpinen Arten verantwortlich sein. Die Azidität der Standorte bewirkt dagegen sicher den Anstieg der Zahl nordischer Arten. Diesen wird der Boden nicht zuletzt durch die standortsverändernde Kraft der Fichte bereitet, mit der sie deshalb auch weitgehend vergesellschaftet sind. Der Anteil der Moose an der Gesamtartenzahl entspricht dem Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald; sie fallen im Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald allerdings durch den höheren Deckungsgrad von 38% +- 2% gegenüber 18% +- 1% beim Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald auf.

1.1.3.1 Reine Ausbildung

Die Reine Ausbildung entspricht auch hier dem weit verbreiteten Grundtyp der Subassoziaton. Sie tritt im typischen Fall auf den bereits an-

gesprochenen wenig geneigten, kaltluftbeeinflussten Talböden auf. Die Untergliederung erfolgte wieder nach dem Blockschuttreichtum der Standorte und nach dem Beweidungsgrad. Eine gewisse Weidebeeinflussung ist hier für die meisten vorliegenden Aufnahmen anzunehmen. Dies deutet das regelmäßige Vorkommen von *Ranunculus repens*, eines Bodenverdichtungszeigers, an. Das zusätzliche Vorkommen der *Prunella*-Gruppe, einer deutlich abgegrenzten Gruppe von Weidezeigern, weist hier auf intensivere Beweidung hin. Diese Gruppe erscheint typischerweise wieder nur auf blockschuttärmeren Standorten.

Zu Aufnahme 1 gehört folgendes Profil einer pseudovergleyten Parabraunerde:

OL	0,5 cm	Fichtennadeln und Reisig
OF	1 cm	rotbraun, verwesende Nadeln
Ah1	0 - 3 cm	schwarzbrauner uL, kaum steinig, krümelig, locker, sehr stark durchwurzelt
Ah2	3 - 14 cm	dunkelbrauner uL mit wenigen Steinchen aus Karbonat, krümelig, locker bis mäßig dicht, gut durchwurzelt, zapfenartig in die Tiefe reichend
Al	14 - 27 cm	hellbrauner, stark steinig-sandiger uL, Subpolyeder- bis Einzelkorngefüge, dicht, schwach durchwurzelt
BtS	27 - 35 cm	mittelbrauner, steiniger (Karbonatgestein) lT, subpolyedrisch, teils polyedrisch, Mn-Konkretionen, stellenweise deutlich marmoriert, Rostflecken in den Aggregaten, dicht, schwach durchwurzelt
BvS	35 - >45 cm	hellbrauner, stark steinig-sandiger uL mit Anteilen eines silikatreichen Gesteins, subpolyedrisch, Rostflecken in den Aggregaten, dicht, kaum durchwurzelt

1.1.3.2 *Hypericum maculatum*-Ausbildung

In der *Hypericum maculatum*-Ausbildung sind die Arten der *Prunella*-Gruppe, die fast alle Charakterarten des Wirtschaftsgrünlandes darstellen, regelmäßig vertreten. Dazu kommen hier als weitere Weidezeiger die Arten der *Hypericum maculatum*-Gruppe. Diese Arten, die z.T. den Borstgrasrasen entstammen, deuten eher auf weidebedingte Nährstoffverarmung hin.

Die Ausbildung steht im Übergang zum reinen Weiderasen. Sie weist die höchste erfaßte Weideintensität auf und findet sich typischerweise in Form kleiner Rasenflecken im sonst dicht geschlossenen Bestand. Diese Stellen werden vom Vieh bevorzugt aufgesucht, sind aber sicher auch Wildäusungsplätze.

1.1.3.3 *Chrysosplenium*-Ausbildung

Die *Chrysosplenium*-Ausbildung ist durch zahlreiche Feuchte- bis Nässezeiger charakterisiert. Sie kommt einerseits im Bachbereich vor und geht dort stellenweise in Flachmoore über. Daneben erscheint sie in Mulden sowie an lehmigen, sickerfeuchten Hängen, wo sie evt. kleine Quellaustritte kennzeichnet. Auch auf alten Fahrspuren, wo es durch starke Bodenverdichtung zum Wasserstau kommt, ist sie manchmal anzutreffen.

Unterteilt wurde die Ausbildung wieder in Formen mit und ohne Felsen. Weideeinfluß - erkennbar am Vorkommen der *Prunella*-Gruppe - ist fast immer festzustellen.

Der *Chrysosplenium*-Ausbildung wurde übrigens die mit 101 Arten wohl artenreichste Aufnahme zugeordnet. Sie erfaßt einen stärker beweideten Fichtenbestand am Rand der Fischunkel-Alm.

1.1.3.4 *Galium rotundifolium*-Ausbildung

Als Differentialarten dieser Ausbildung dienen *Petasites albus*, *Galium rotundifolium* und *Neottia nidus-avis*. All diese Arten wachsen auf lehmigen, z.T. kalkarmen Böden. Trotzdem dürften letztere im Bereich der *Galium rotundifolium*-Ausbildung nicht wesentlich lehmreicher sein als beim übrigen Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald. Die Ausbildung scheint vielmehr etwas thermophiler zu sein: Die mittlere Temperaturzahl liegt bei allen Untereinheiten der Ausbildung signifikant höher als der Durchschnitt der Subassoziation. Sie beträgt z.B. bei der typischen Form der *Galium rotundifolium*-Ausbildung $4,22 \pm 0,07$ gegenüber $4,03 \pm 0,03$ im Gesamtdurchschnitt der Subassoziation. Ursache hierfür ist sicher das Vorkommen in stärker hängigem Gelände, wo es zu keinem Kaltluftstau kommen kann, mit dem im Bereich der Reinen Ausbildung vielfach zu rechnen ist.

Die *Galium rotundifolium*-Ausbildung wurde weiter unterteilt in Einheiten mit und ohne *Calamagrostis varia*, die ihrerseits wieder wie üblich nach dem Blockschuttreichtum untergliedert sind. Die grasreiche Einheit mit *Calamagrostis varia* stellt einen Übergang zum Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald dar. Sie unterscheidet sich jedoch nicht allzu deutlich von der typischen Einheit, die auch schon relativ zahlreiche Arten dieser Subassoziation besitzt. Die Einheit mit *Calamagrostis varia* weist im Durchschnitt eine etwas höhere Licht- und Kontinentalitätszahl auf, was wieder auf ein stärker ausgeprägtes Strahlungsklima hindeutet. Außerdem scheint die Stickstoffversorgung etwas schlechter zu sein - ein Hinweis auf eine gewisse Aushagerung des Bodens.

1.1.4 NECKERA-HAINLATTICH-TANNEN-BUCHENWALD (Tabelle 2)

Der Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald besiedelt stark felsiges Gelände, seien es Bergsturzstandorte oder anstehender Fels. Eine besondere Subassoziation konnte für diese Standorte nur in den Tieflagen aus-
geschieden werden, da sich hier die entsprechenden Standorte deutlicher
abheben als in den allgemein felsigeren Hochlagen.

Charakteristisch für die Subassoziation ist ihr Reichtum an felsbe-
siedelnden Kryptogamen, v.a. an Moosen und Farnen. Die Moose repräsen-
tieren oft die Hälfte der Gesamtartenzahl. Der Laubholzreichtum der Ein-
heit erklärt sich wohl aus der m.o.w. schweren Zugänglichkeit des Gelän-
des, die hier eine stärkere forstwirtschaftliche Einflußnahme und insbe-
sondere den Verbiß durch Wild und Weidevieh verhindert hat.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 66 +- 2
davon Gefäßpflanzen: 47 +- 1

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	7,0 +- 0,6
pralp:	20,4 +- 0,8
kont:	5,0 +- 0,3
smed:	13,6 +- 0,7
euras:	17,9 +- 0,8
subatl:	7,1 +- 0,3
no:	17,9 +- 0,7
arkt:	1,4 +- 0,1

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	4,72 +- 0,05 (Halbschatten)
Temperaturzahl:	3,88 +- 0,04 (kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,62 +- 0,02 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,37 +- 0,03 (frisch)
Reaktionszahl:	6,19 +- 0,06 (schwach bis mäßig sauer)
Stickstoffzahl:	4,95 +- 0,06 (mäßig stickstoffreich)

Auffallend ist hier die recht hohe Artenzahl, die durch den Reichtum an Kleinstandorten bedingt ist. Die Temperaturzahl und entsprechend auch die Zahl submediterraner Arten liegt relativ niedrig - evt. ein Effekt der durch Blockkaltluft erniedrigten Temperatur.

In der Tabelle, allerdings nicht in der Karte, wurden eine Reine und eine wesentlich artenreichere *Carex alba*-Ausbildung unterschieden. Letztere steht dem Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald nahe und wurde bei der Kartierung oft einer felsigen Ausbildung dieser Subassoziation zugeordnet. Sie entspricht der *Moehringia*-Ausbildung mit *Neckera* des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes bei THIELE (1978).

Die beiden Ausbildungen des *Neckera*-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes dürften sich hauptsächlich im Lichtgenuß der Bodenvegetation unterscheiden: Die mittlere Lichtzahl der *Carex alba*-Ausbildung liegt deutlich höher und entspricht dem geringeren Bestandesschuß von 59% $\pm$ 5% gegenüber 70% $\pm$ 4% bei der Reinen Ausbildung. Hohe Reaktions- und niedrige Stickstoffzahl weisen auf eher feinerde- und humusarme Felsstandorte hin und erklären damit die relativ schwache Entwicklung der Baumschicht der *Carex alba*-Ausbildung.

1.1.5 REINER HAINLATTICH-TANNEN-BUCHENWALD (Tabelle 3)

Auch der Reine Hainlattich-Tannen-Buchenwald besitzt die in den tieferen Lagen verbreiteten Arten der Sanicula-Gruppe meist in reichlichen Mengen. Eine weitere durchgehend vertretene Differentialartengruppe fehlt.

Die Zusammensetzung dieser Subassoziation ist etwas heterogen. Es handelt sich häufig um recht dichte Fichten- oder Buchenbestände (mittlerer Bestandesschuß 76 %), deren Bodenvegetation oft nur sehr spärlich entwickelt ist.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 41 +- 1
davon Gefäßpflanzen: 33 +- 1

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	1,7 +- 0,2
pralp:	11,2 +- 0,4
kont:	3,9 +- 0,2
smed:	14,4 +- 0,5
euras:	13,1 +- 0,5
subatl:	8,7 +- 0,3
no:	10,7 +- 0,3
arkt:	0,6 +- 0,1

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	4,33 +- 0,04 (Schatten bis Halbschatten)
Temperaturzahl:	4,41 +- 0,03 (mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,59 +- 0,02 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,39 +- 0,02 (frisch)
Reaktionszahl:	6,17 +- 0,05 (schwach bis mäßig sauer)
Stickstoffzahl:	5,45 +- 0,05 (mäßig stickstoffreich)

Hier erscheint v.a. die geringe Gesamtartenzahl bedeutungsvoll, die

z.T. durch hohen Bestandesschluß bedingt ist. Die Lichtzahl ist entsprechend die niedrigste unter allen Subassoziationen des Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Die Temperaturzahl liegt dagegen am höchsten. Dies ist auf eine geringe mittlere Meereshöhe zurückzuführen, da ein Großteil der Aufnahmen aus dem tiefgelegenen St. Bartholomä stammt.

Die durch Lichtmangel bedingte Reduktion der Artenzahl betrifft wohl relativ unspezifisch sämtliche Geoelemente, so daß deren Prozentanteile hier sicher charakteristischer sind als die Absolutzahl. Unter den Prozentwerten hebt sich v.a. derjenige der submediterranen Arten ab, der deutlich erhöht ist und sicher weitgehend für die hohe Temperaturzahl verantwortlich ist. Der relativ hohen Zahl wärmeliebender Arten entspricht andererseits eine auffallend niedrige Zahl kältetoleranter alpiner Arten.

1.1.5.1 Eschen-Ausbildung

Die Eschen-Ausbildung ist ausschließlich in St. Bartholomä in geringer Meereshöhe von meist wenig über 600 m verbreitet. Sie ist gekennzeichnet durch eine Gruppe von zumeist relativ wärmeliebenden Arten, nämlich durch *Fraxinus excelsior*, *Helleborus niger*, *Hepatica nobilis*, *Corylus avellana*, *Rubus fruticosus* s.l., *Rubus saxatilis* und *Polygonatum multiflorum*. Diese Arten kommen zumeist auch in der Frangula-Ausbildung des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes vor. Sie besitzen alle einen ihrer Verbreitungsschwerpunkte in St. Bartholomä bzw. in der Umgebung des Königssees, sind jedoch an anderen Stellen des Nationalparks kaum mehr miteinander vergesellschaftet. Charakteristisch für die Eschen-Ausbildung ist weiterhin ihr Reichtum an Bergahorn und Buche. Letztere ist in St. Bartholomä weithin künstlich gefördert; gleichaltrige Buchen-Stangenhölzer finden sich dort auf großen Flächen.

Polygonatum multiflorum dient auch ZUKRIGL (1973) neben *Lathyrus vernus* zur Abgrenzung einer submontanen *Lathyrus vernus*-Ausbildung des Helleboro-Fagetum. Als typisch submontane Gesellschaft ist die Eschen-Ausbildung des Reinen Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes jedoch sicher noch nicht anzusehen. Als charakteristische montane Art ist v.a. *Polygonatum verticillatum* noch reichlich vertreten; *Lathyrus vernus* fehlt. Trotzdem sind jedoch Parallelen zur *Lathyrus vernus*-Ausbildung des Helleboro-Fa-

getum unübersehbar: Neben einem ähnlichen Reichtum an Esche und *Carex alba* besitzen beide Gesellschaften entsprechende feuchte Ausbildungen mit *Impatiens noli-tangere*, die zum Ahorn-Eschenwald überleiten.

1.1.5.1.1 Reine Eschen-Ausbildung

Die Reine Eschen-Ausbildung ist in St. Bartholomä auf gereiften Böden und durchschnittlichen Standorten die bei weitem vorherrschende Pflanzengesellschaft. Sie besiedelt in ihrer Normalform ebenes Gelände auf dem nördlichen, konsolidierten Teil des Schuttfächers. Eine Ausprägung mit *Moehringia muscosa* findet sich im westlichen Bereich der Halbinsel, wo das Gelände anzusteigen beginnt und zunehmend Felsen an die Oberfläche treten.

Wo die Fichte auf Kosten der Buche stärker am Bestandesaufbau beteiligt ist, entwickelt sich im ebenen Gelände eine moosreiche Untereinheit mit *Rhytidiadelphus triquetrus*. Die Moose werden dort weniger durch Buchenlaub unterdrückt. Daß im geneigten, felsigeren Gelände unter Fichte kein entsprechender Moosreichtum anzutreffen ist, mag an der schlechten Wasserversorgung sowie dem höheren pH der Böden liegen.

Unterschieden wurde weiterhin eine unbedeutende Einheit mit *Vinca minor*. Das Immergrün erscheint an einer bestimmten Stelle in so auffallenden Mengen, daß es in die Kartierung miteinbezogen wurde. Es könnte evt. auf eine alte Ansiedlung hinweisen.

Von LIPPERT (1966) wurde in St. Bartholomä eine Helleborus-Ausbildung des *Abieti-Fagetum* erfaßt, die der Reinen Eschen-Ausbildung entspricht. Auch von LIPPERT wurde hier eine durch *Vinca minor* gekennzeichnete Untereinheit abgegrenzt.

1.1.5.1.2 Eschen-Ausbildung mit *Impatiens*

Diese Einheit ist gekennzeichnet durch eine Reihe von Feuchtigkeitszeigern. Sie leitet zum Ahorn-Eschenwald über. Die Ursache für die größere Bodenfeuchtigkeit ist durch den Augenschein allein oft kaum erkennbar. Die Einheit besiedelt in ihrer Normalform m.o.w. ebenes Gelände; manchmal scheint sie sehr flache Geländevertiefungen zu bevorzugen. Häufiger ist sie freilich in der weiteren Umgebung kleiner Bäche zu finden.

Neben der Normalform wurde auch hier wieder eine Ausbildung mit *Moehringia muscosa* unterschieden, die im geeigneten und damit zugleich auch felsigen Gelände vorkommt.

Die Eschen-Ausbildung besitzt als einzige Untereinheit des Reinen Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes eine nennenswerte Anzahl an Weidezeigern. Dies kann einerseits mit einer besseren Futterqualität in ihrem Bereich zusammenhängen, andererseits jedoch auch mit bodenbedingt besseren Wachstumsbedingungen für die Weidezeiger.

Besonders üppig entwickelt sind die Schlagfluren der Eschen-Ausbildung mit *Impatiens*. Da hier durch keine Baumschicht Wasser verbraucht wird, ist die Wasserversorgung der übrigen Vegetationsschichten verbessert. Aus diesem Grund könnten die feuchten Schlagfluren evt. auch aus der trockeneren Reinen Eschen-Ausbildung hervorgegangen sein.

1.1.5.2 Fichten-Ausbildung und artenarme Buchenfazies

Die Artenzahl dieser beiden Gesellschaften ist mit durchschnittlich 38 ± 2 Arten besonders gering; gering ist vor allem auch die Zahl der Differentialarten. Die Gesellschaften finden sich in etwas größerer Meereshöhe. Dementsprechend fehlen die wärmeliebenden Arten der Eschen-Ausbildung. Das Auftreten der Einheiten ist in besonderem Maße bedingt durch hohen Dichtschluß der Baumschicht und entsprechende Unterdrückung der Krautschicht. In der Mehrzahl der Fälle dürften sie sich wohl vom Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald ableiten.

1.1.5.2.1 Fichten-Ausbildung

Die Fichten-Ausbildung, die mit Teilen der typischen Ausbildung des *Piceetum montanum* LIPPERTs (1966) übereinstimmt, ist auf allen Teilflächen außerhalb von St. Bartholomä weit verbreitet. Sie erreicht in besonders dichten Stangenwäldern (allerdings etwas außerhalb der Grenzen des Nationalparks) ein Minimum der Artenzahl von 14. Das Maximum liegt jedoch trotz allem noch bei 67, so daß für den Ausfall der Differentialarten in Einzelfällen auch noch andere Gründe als die allgemeine Unter-

drückung der Krautschicht durch die Fichte gesucht werden müssen. Insgesamt gesehen ist die Einheit jedoch als die am meisten forstlich veränderte Waldgesellschaft des Untersuchungsgebietes zu betrachten.

Untergliedert wurde diese Einheit wieder nach ihrem Blockschuttreichtum. In wenigen Fällen wurden ihr auch m.o.w. zweifelhafte Schlagfluren zugeordnet.

1.1.5.2.2 artenarme Buchen-Fazies

Im Gegensatz zur Fichten-Ausbildung ist die artenarme Buchen-Fazies, die ungefähr der typischen Ausbildung des Abieti-Fagetum bei LIPPERT (1966) entspricht, eine ausgesprochen naturnahe Waldgesellschaft. Allerdings neigt die Buche bei stärkerer Dominanz in besonderem Maße zur Unterdrückung der Krautschicht - sei es durch Beschattung, durch Laubfall oder Wasserentzug. Auf diese Weise entstehen hier auch unter natürlichen Bedingungen recht eintönige Bestände. Wenn auch das meist karbonatreiche Ausgangsgestein und das reichgegliederte Relief im Untersuchungsgebiet eine allzu starke Artenverarmung verhindern, so fehlt doch im Bereich der beschriebenen Einheit sogar die Sanicula-Gruppe. Damit ist hier außer der Buche selbst überhaupt keine durchgehende Differentialart mehr auffindbar.

Unterschieden wurde hier zwischen einer je nach Felsigkeit weiter unterteilbaren Normalform und einer Vaccinium myrtillus-Fazies. Letztere erscheint nur auf einer kleiner Fläche im westlichen Teil von St. Bartholomä. Evt. schafft der hier vorkommende schwerlösliche Hauptdolomit etwas saurere Substratverhältnisse.

1.2 Subassoziation der höheren Lagen - ROSTSEGGEN-HAINLATTICH-TANNEN-BUCHENWALD (Tabelle 5)

Mit zunehmender Meereshöhe nimmt im Hainlattich-Tannen-Buchenwald die Zahl der Laubwaldarten ab. Dafür finden sich Arten der Rostseggenrasen, der subalpinen Hochstaudenfluren und der Fichtenwälder angereichert. Der Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, der für diese höheren Lagen charakteristisch ist, beginnt bei etwa 1200-1300 m und reicht bis an die obere Höhengrenze der Untersuchungsgebiete, die meist zwischen 1400 und 1500 m liegt und hier die aktuelle Waldgrenze repräsentiert. Die mittlere Meereshöhe der Aufnahmen liegt bei 1406 $\pm$ 12 m.

LIPPERTs (1966) *Geranium sylvaticum*-Ausbildung des *Piceetum montanum* kann dem Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald zugeordnet werden. ZUKRIGL (1973) erwähnt als eine am Alpenostrand wenig verbreitete Gesellschaft das Helleboro-(*Abieti*-) *Fagetum caricetosum ferrugineae* von schneereichen Schatthängen, die dem Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald ähnelt, aber anders als dieser nur auf Dolomit vorkommt.

In der Baumschicht des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes dominiert heute meist, wie in den Wäldern der Tieflagen, die Fichte. In unterschiedlichem Maße ist ihr die Lärche beigemischt oder dominiert ihrerseits in einigen Fällen. Laubholz fehlt praktisch. Die Ursache für den Fichtenreichtum der Subassoziation dürfte im Zusammenwirken klimatischer, das Fichtenwachstum begünstigender Faktoren und den Einwirkungen von Mensch und Tier zu suchen sein. In welchem Ausmaß hier die biotischen Einflüsse für das Entstehen von m.o.w. reinen Fichtenbeständen verantwortlich sind, kann nicht sicher gesagt werden, da es an geeigneten naturnahen Vergleichsflächen weitgehend fehlt. Anhand der Artenkombination konnten auf den im Untersuchungsgebiet besonders weit verbreiteten karbonatreichen Hangschuttstandorten keine natürlichen Fichtenwälder ausgeschieden werden. Freilich fehlt es auch weitgehend an Aufnahmемaterial von Wäldern auf Hangschutt aus dem Bereich über 1400 m, wo vielleicht echte Fichtenwälder zu erwarten wären. Bodensaure subalpine Fichtenwälder auf Kalk wurden im Gebiet nur auf anstehendem Gestein im wenig geneigten Gelände nachgewiesen, wo die Basennachlieferung gehemmt ist. Sie scheinen außerdem auf ein stärker föhnbeeinflusstes Lokalklima angewiesen zu sein und sind deshalb auch auf anstehendem Dachsteinkalk der Hochlagen nicht überall ausgebildet.

Wie im Falle der Fichtenbestände ist auch bei besonders lärchenreichen Beständen die Natürlichkeit ihres Vorkommens durchaus fraglich, da

lichte Lärchenwälder mit reichhaltiger, rasenartiger Bodenvegetation den Bergbauern für Weidezwecke durchaus erwünscht sind und daher auf Kosten von stärker schattenden Baumbeständen begünstigt wurden.

Die Arten der *Sanicula*-Gruppe fehlen im hochmontanen Bereich und werden durch die *Luzula sylvatica*- und die *Saxifraga rotundifolia*-Gruppe abgelöst. Erstere kennzeichnet fast alle Einheiten des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Sie setzt sich zusammen aus *Luzula sylvatica* s.l., *Geranium sylvaticum*, *Soldanella alpina*, *Carex ferruginea*, *Hypericum maculatum*, *Agrostis alpina*, *Polystichum lonchitis* und dem Felsmoos *Pseudoleskea incurvata*. Die soziologische Zugehörigkeit dieser Arten ist recht unterschiedlich: Z.B. ist *Luzula sylvatica* Charakterart der Fichtenwälder, *Geranium sylvaticum* ist kennzeichnend für Hochstaudenfluren und *Carex ferruginea* für die nach ihr selbst benannten Rasengesellschaften. Bedeutungsvoll erscheint v.a. die Vorliebe dieser Arten für kühle und relativ feuchte Standorte mit langer Schneebedeckung, wie sie naturgemäß in größerer Meereshöhe anzutreffen sind. Mit Ausnahme von *Luzula sylvatica* brauchen die genannten Arten ziemlich viel Licht - ein Hinweis auf die stärkere Auflichtung der Hochlagenwälder, deren Verjüngung ja durch die Beweidung besonders stark gefährdet wird. Auch in ihren Ansprüchen an die Bodenreaktion unterscheidet sich *Luzula sylvatica* als ausgesprochen azidophile Art stark von den übrigen, kalkliebenden Arten. Daß sie überhaupt mit diesen zusammen vorkommt, kennzeichnet den Mosaikcharakter der Standorte, wie er sich in Kalkgebirgen, und hier v.a. in größerer Höhe, häufig ausprägt. Die Böden sind dort, bedingt durch die Natur des Ausgangsgesteins, i. allg. zwar basenreich; das kühle Klima verlangsamt jedoch die Streuzersetzung in den höheren Lagen und läßt, v.a. auf Felsen, wo das Bodenleben der Kälte und auch der periodischen Austrocknung besonders stark ausgesetzt ist, saure Humusauflagen entstehen.

Die zweite Differentialartengruppe ist nur in einem Teil des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes stärker, in gewissen Mengen jedoch ebenfalls in beinahe allen Einheiten der Subassoziation vertreten. Sie besteht aus *Adenostyles alliariae*, *Dentaria enneaphyllos*, *Saxifraga rotundifolia*, *Crepis paludosa*, *Aconitum vulparia*, *Myosotis sylvatica*, *Geum rivale* und *Doronicum austriacum*. Diese Artengruppe ist in besonderem Maße für die subalpinen Hochstaudenfluren charakteristisch. Es handelt sich um Feuchtezeiger, die außerdem recht hohe Ansprüche an die Stickstoffversorgung stellen. Begünstigt werden die Arten folglich insbesondere durch feinerde- und damit auch nährstoffreiche und feuchte Böden,

wie sie v.a. auf Gesteinen des Lias anzutreffen sind.

Charakteristisch für den Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, daneben jedoch auch für den Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, sind ferner u.a. *Viola biflora* und *Dryopteris austriaca* s.str.. Beide Arten weisen auf feuchte Standortsbedingungen hin. Einige in der Tabelle als Weidezeiger geführte Arten sind ebenfalls als häufige Arten auf den Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald konzentriert oder beschränkt. Hierher gehören *Alchemilla vulgaris* s.l., *Leontodon hispidus*, *Heracleum austriacum*, *Potentilla aurea*, *Trollius europaeus*, *Veratrum album*, *Poa alpina*, *Gentiana pannonica* und *Crepis aurea*.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 65 +- 1
davon Gefäßpflanzen: 52 +- 1

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	13,3 +- 0,5
pralp:	25,1 +- 0,5
kont:	4,0 +- 0,1
smed:	8,2 +- 0,4
euras:	15,7 +- 0,5
subatl:	5,3 +- 0,3
no:	18,4 +- 0,5
arkt:	3,3 +- 0,2

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	5,51 +- 0,05 (Halbschatten bis Halblucht)
Temperaturzahl:	3,32 +- 0,03 (kühl)
Kontinentalitätszahl:	3,60 +- 0,01 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,56 +- 0,02 (frisch bis feucht)
Reaktionszahl:	6,07 +- 0,04 (schwach bis mäßig sauer)
Stickstoffzahl:	4,84 +- 0,05 (mäßig stickstoffreich)

Wie die Gesamtartenzahl zeigt, gehört die Subassoziation zu den artenreichsten Waldgesellschaften des Untersuchungsgebietes. Die Artenzahl entspricht genau derjenigen des Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Die Ursache für den Artenreichtum ist in beiden Fällen in der Felsigkeit des Geländes und dem damit verbundenen Reichtum an Kleinstandorten zu suchen. Höheren Anteil an der Artenzahl haben die meist felsbesiedelnden Moose und sonstigen Thallophyten mit durchschnittlich 13 Arten pro Aufnahme.

Auch die günstigen Lichtverhältnisse dürften im Bereich des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes mit zur Erhöhung der Artenzahl beitragen: In Übereinstimmung mit den Lichtansprüchen der Differentialarten liegt auch die aus allen Arten berechnete mittlere Lichtzahl recht hoch; sie besitzt einen der höchsten Werte aller hier behandelten Subassoziationen des Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Die mittlere Temperaturzahl liegt dagegen erwartungsgemäß am niedrigsten. Die geringe Zahl submediterraner Arten entspricht diesem niedrigen Wert.

Der Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald wurde in 4 Ausbildungen untergliedert: die *Sanicula*-, die *Reine*, die *Saxifraga*- und die *Erica*-Ausbildung. Zwischen unterschiedlich felsigen Ausbildungen wurde wegen des allgemeinen Felsreichtums der höhergelegenen Gebiete weder in der Tabelle noch bei der Kartierung unterschieden. Auf dem Kartendeckblatt wurden hier überall Felsbesiedler angenommen.

1.2.1 *Sanicula*-Ausbildung

Die *Sanicula*-Ausbildung besitzt einerseits Arten der *Saxifraga rotundifolia*-Gruppe (kaum solche der *Luzula sylvatica*-Gruppe), sie leitet andererseits mit m.o.w. zahlreichen Arten der *Sanicula*-Gruppe zu den Subassoziationen der tieferen Lagen, v.a. zum Reinen Hainlattich-Tannen-Buchenwald (dagegen nicht zum Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald) über. Die mittlere Meereshöhe der Aufnahmen ist mit 1270 m $\pm$ 40 m entsprechend relativ gering. Das vorhandene Aufnahmematerial dieser Ausbildung erscheint freilich recht heterogen. Die Standorte werden grundsätzlich von Blockschutthaldden gebildet. Der Baumbestand ist oft nur schütter und die Versorgung der Krautschicht mit Licht, Wärme und Wasser deshalb verbessert. Es finden sich jedoch auch dichtere Bestände (Bestandes-schluß bis 80 %). Die flächenmäßige Bedeutung der Einheit ist nur gering.

1.2.2 Reine Ausbildung

Die Arten der *Saxifraga rotundifolia*-Gruppe sind in der Reinen Ausbildung nur relativ schwach vertreten, sie fehlen jedoch nicht ganz. Der Wasserhaushalt dürfte im Bereich dieser Ausbildung etwas schlechter sein als in der noch zu besprechenden *Saxifraga rotundifolia*-Ausbildung. Die Ursache der größeren Trockenheit mag häufig ein geringerer Feinerdegehalt der Böden sein.

Die Aufnahmen der Ausbildung besitzen folgende mittleren Zeigerwerte:

Lichtzahl:	5,34 +- 0,09 (Halbschatten)
Temperaturzahl:	3,41 +- 0,05 (kühl)
Kontinentalitätszahl:	3,59 +- 0,02 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,53 +- 0,03 (frisch)
Reaktionszahl:	5,90 +- 0,06 (schwach bis mäßig sauer)
Stickstoffzahl:	4,74 +- 0,06 (mäßig stickstoffreich)

1.2.2.1 Reine Ausbildung, verarmt

Recht häufig war man bei der Kartierung gezwungen, diese ziemlich schlecht charakterisierte Einheit anzugeben. Sie besitzt mit *Luzula sylvatica* im Grunde nur eine einzige Differentialart. Ein schwaches Optimum weisen hier allerdings, zumindest was die vorliegenden Aufnahmen betrifft, auch die Arten der *Sanicula*-Gruppe auf. Die Aufnahmen stammen entsprechend auch aus dem unteren Höhenbereich des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Trotzdem erscheint die Einordnung bei einer der Tieflagenformen des Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes nicht gerechtfertigt. Die Hochstaudenarmut der Einheit verbietet außerdem ihre Zuordnung zur gerade besprochenen *Sanicula*-Ausbildung des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Die Aufnahmen entstammen offenbar einem Zwischenbereich, in dem sich, nicht zuletzt wegen eines recht hohen Bestandesschlusses, weder die Arten der Hochlagen noch die der Tieflagen voll durchsetzen können.

Kartiert wurde die Einheit weithin auch in den hohen Lagen deutlich oberhalb des Verbreitungsgebiets der *Sanicula*-Gruppe in dichten Beständen des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes mit relativ gering entwickelter, wenn auch nicht unbedingt artenarmer Bodenvegetation.

1.2.2.2 Reine Ausbildung, rein

Diese Einheit entspricht etwa dem beschriebenen Grundtyp der Reinen Ausbildung, wenn auch bei der Kartierung hier verschiedene zweifelhaftere Vegetationsformen höherer Lagen eingeordnet wurden, z.B. rasenartige Stellen mit höherer Dominanz der Rostsegge an lichtereren Stellen. Derartiges findet sich im Aufnahmемaterial nicht; es handelt sich vielmehr hier um gut geschlossene Bestände, die z.T. auch der verarmten Form ähneln können, jedoch reicher an Arten der *Luzula sylvatica*- und der *Saxifraga rotundifolia*-Gruppe sind. Die mittlere Meereshöhe liegt dabei deutlich über derjenigen der verarmten Form; Arten der *Sanicula*-Gruppe sind entsprechend seltener.

Bei stärkerer Besonnung an Südhängen treten in der Einheit Arten der *Carex sempervirens*-Gruppe auf. Eine Kartierung dieses Typs lohnt jedoch nicht.

Wichtiger ist demgegenüber die beweidete Untereinheit mit *Trollius europaeus*. Der Bestandesschlus dieser Einheit ist recht gering (im Mittel 24 %). Diesem Umstand verdanken sicher viele der hier mit den Weidezeigern zusammengefaßten Arten ihr Vorkommen. Auch Arten der *Carex sempervirens*-Gruppe, der Differentialarten der Horstseggenrasen, treten hier insgesamt häufiger auf. Die Rostsegge erscheint oft bestandesbildend, und zu den Rostseggenrasen dürfte die Einheit auch überleiten.

1.2.2.3 Reine Ausbildung mit *Luzula luzulina*

Von den eben beschriebenen Einheiten unterscheidet sich dieser Typ durch eine Gruppe von Arten, die im wesentlichen den Hainsimsen- vor dem Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald auszeichnen. Die Einheit ist v.a. etwas reicher an azidophilen Moosen. Der Gesamtdeckungsgrad der Moose ist allerdings trotzdem nicht erhöht, weil die Felsmoose hier deutlich zurücktreten. Die Zeigerwerte zeigen keinerlei Abweichung von denjenigen der normalen Reinen Ausbildung - wohl weil die Moose nicht in die Berechnung eingingen. Trotzdem dürfte die Feuchtigkeit und Azidität der Böden aufgrund höherer Silikat- und damit Feinerdegehalte hier etwas größer sein. Daß die Arten der *Saxifraga rotundifolia*-Gruppe trotz erhöhter Bodenfeuchtigkeit nicht stärker in Erscheinung treten, mag an der relativ geringen Meereshöhe von durchschnittlich 1300 m liegen, aus der die Aufnahmen der Einheit stammen.

1.2.2.4 Reine Ausbildung mit *Calamagrostis villosa*

Die Ausbildung mit *Calamagrostis villosa* wird physiognomisch vorwiegend durch m.o.w. geschlossene Bestände der namengebenden Art bestimmt, die auch als alleinige Differentialart dient. Wie die Ausbildung mit *Luzula luzulina* besitzt auch diese Gesellschaft einen azidophileren Charakter als der Durchschnitt der Subassoziatio - hier wohl v.a. bedingt durch saure Humusaufgaben. Die mittlere Reaktionszahl liegt entsprechend etwas niedriger als das Gesamtittel. Unterschiedlich ist dagegen einmal die Meereshöhe: Sie übertrifft diejenige der Ausbildung mit *Luzula luzulina* um durchschnittlich 100 m. Wichtiger ist demgegenüber allerdings der geringere Bestandesschluss (ohne Berücksichtigung von Schlagfluren) und das damit einhergehende ausgeprägtere Strahlungsklima. Dieses äußert sich im Wert der Kontinentalitätszahl, die trotz größerer Meereshöhe und der damit i.allg. verbundenen größeren Ozeanität des Klimas deutlich erhöht ist.

Trotz dieser größeren Meereshöhe erscheint die vorliegende Einheit auch deutlich trockener als die zuletzt beschriebene, was auch der Vergleich der Feuchtezahlen erkennen lässt. Zweifellos ist v.a. die Luftfeuchtigkeit in den m.o.w. moosarmen, lichten und windausgesetzten Beständen der Ausbildung mit *Calamagrostis villosa* niedriger als in den dichten, moosreichen Beständen der Einheit mit *Luzula luzulina*.

Entsprechend ihrem relativ hohen Lichtbedürfnis erscheint *Calamagrostis villosa* häufiger in Schlagfluren, die hier als Untereinheit der vorliegenden Gesellschaft geführt werden. Als weitere Untereinheit ist schließlich eine beweidete Form mit *Gentiana pannonica* zu nennen; sie enthält neben dem Pannonischen Enzian selbst noch *Veratrum album*, *Trollius europaeus*, *Potentilla erecta*, *Anthoxanthum odoratum* und *Coeloglossum viride*. Einige dieser Arten sind wiederum azidophil und entstammen dem Bereich der Borstgrasrasen.

1.2.3 *Saxifraga rotundifolia*-Ausbildung

Die Arten der *Saxifraga rotundifolia*-Gruppe treten hier stärker in Erscheinung als in der Reinen Ausbildung des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes und deuten auf mehr Feuchtigkeit und bessere Nähr-

stoffversorgung hin. Zum Vergleich seien auch hier die mittleren Zeigerwerte der Einheit angegeben:

Lichtzahl:	5,62 +- 0,07 (Halbschatten bis Halblucht)
Temperaturzahl:	3,30 +- 0,04 (kühl)
Kontinentalitätszahl:	3,60 +- 0,01 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,66 +- 0,03 (frisch bis feucht)
Reaktionszahl:	6,14 +- 0,05 (schwach bis mäßig sauer)
Stickstoffzahl:	5,04 +- 0,05 (mäßig stickstoffreich)

Als Ursache für die bessere Wasserversorgung kommt einmal die größere Meereshöhe in Frage: Das Mittel der Aufnahmen liegt mit 1440 m um 100 m über dem der Reinen Ausbildung. Höhere Feinerdegehalte des Bodens aufgrund silikatreicherer Ausgangsgesteine (z.B. Liaskalke) dürften zusätzlich die Wasser- und daneben auch die Nährstoffversorgung verbessern.

1.2.3.1 Reine *Saxifraga rotundifolia*-Ausbildung

Diese Einheit ist am weitesten verbreitet und entspricht dem Grundtyp der *Saxifraga rotundifolia*-Ausbildung. Die Arten der *Luzula luzulina*-Gruppe besitzen hier ein Optimum und weisen auf feuchte, etwas bodensaurere Bedingungen hin. Der *Luzula luzulina*-Gruppe schließt sich hier *Hypnum callichroum* an.

Die unterschiedlich geschlossenen Fichtenbestände weisen eine wechselnde Lärchenbeimischung auf. Der mittlere Bestandesschluß beträgt 43 % +- 4 %.

Recht häufig tritt die Einheit in Form von Schlagfluren auf. Die Arten der *Saxifraga rotundifolia*-Gruppe treten hier zugunsten von Tieflagenarten deutlich zurück. Die Ursache hierfür mag das wärmere und etwas lufttrockenere Lokalklima der Schlagfluren sein.

Von größerer Bedeutung ist weiterhin die stärker beweidete Ausbildung mit *Heracleum austriacum*. Sie besitzt dieselben Weidezeiger wie die beweidete Normalform des Reinen Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Der Germer ist hier allerdings offensichtlich weniger häufig als in

der unbeweideten (bzw. schwach beweideten) Ausbildung, was bei der Kartierung leider nicht berücksichtigt wurde. Auch *Trollius europaeus* wurde hier als Weidezeiger überbewertet. Der Bestandesschluß der beweideten Form ist - bedingt wohl v.a. durch den Verbiß des Jungwuchses durch die weidenden Tiere - mit 22 % $\pm$ 6 % wieder wesentlich geringer als in der Normalform, und einzelne Aufnahmen besitzen wohl auch schon mehr Rasen- als Waldcharakter. Entsprechend verbinden sich hier mit echten, z.B. auf Eutrophierung hinweisenden Weidezeigern auch reine Lichtpflanzen, wie z.B. *Tofieldia calyculata*.

An felsigeren Stellen tritt in der beweideten Form *Rhododendron hirsutum* in größeren Mengen auf und kennzeichnet hier eine eigene, wenn auch schwach belegte Einheit. Auch eine Schlagform der beweideten Ausbildung wurde in einigen Aufnahmen erfaßt.

1.2.3.2 *Saxifraga rotundifolia*-Ausbildung mit *Stellaria nemorum*

Die Einheit ist durch eine Reihe besonders feuchtigkeitsliebender Arten gekennzeichnet. Am wichtigsten sind die *Moose Conocephalum conicum* und *Cirriphyllum piliferum*. Dazu kommen häufig *Petasites albus*, *Stellaria nemorum*, *Chrysosplenium alternifolium* und seltener *Circaea intermedia* sowie *Cardamine amara*. Die Ursache für die größere Standortsfeuchtigkeit ist nicht immer ohne weiteres erkennbar; mitunter ist ein Vorkommen in Muldenlagen oder an quelligen Hängen, z.T. auch im Bachbereich zu beobachten. Das Baumwachstum ist offenbar durch große Feuchtigkeit bereits teilweise reduziert; der mittlere Bestandesschluß der Normalform beträgt deshalb nur 32 % $\pm$ 12 %.

Die Einheit ist als Übergang zur Alpendostflur anzusehen. Sie wurde von letzterer floristisch anhand ihrer Felsbesiedler abgegrenzt. Zu diesen zählen hier teilweise auch die Bäume, da sie auf trockenen Felsköpfen bessere Verjüngungs- und Wachstumsbedingungen vorfinden als auf dem feuchten, von Hochstauden überwucherten Boden.

Neben der Normalform wurde eine fast noch häufigere Form mit Schlagflurpflanzen unterschieden, die freilich, zumindest was die Aufnahmen betrifft, nicht immer richtigen Schlagfluren entsprechen muß; es gibt auch viele natürliche Verlichtungen, wo die Nitrifizierung begünstigt ist.

1.2.3.3 *Saxifraga rotundifolia*-Ausbildung mit *Stachys alopecurus*

An sonnigen Hängen, häufig in Südexposition, treten im ansonsten noch bodenfeuchten Bereich einige Arten in Erscheinung, die im Gebiet die Horstseggenrasen kennzeichnen. Es sind dies *Carduus defloratus*, *Calamintha alpina*, *Stachys alopecurus*, *Carex sempervirens* und *Carlina acaulis*. Trotz allem sind die Bestände recht gut geschlossen (mittlerer Bestandesschluß 43 % $\pm$ 5 %). Die Artenzahl ist mit 77 $\pm$ 3 recht hoch. Besonders ins Gewicht fallen dabei die skleromorphen Arten, die mit 12 $\pm$ 1 doppelt so zahlreich sind, wie in der Reinen *Saxifraga rotundifolia*-Ausbildung.

Da die Aufnahmen der Einheit meist aus der Umgebung von Almen stammen, sind sie großenteils mit Weidezeigern angereichert.

1.2.3.4 *Saxifraga rotundifolia*-Ausbildung mit *Calycocorsus*

Auch diese Einheit erscheint durchwegs recht stark beweidet. Sie ist gekennzeichnet durch *Luzula glabrata*, *Peucedanum ostruthium*, *Phyteuma orbiculare*, *Calycocorsus stipitata* und *Phleum alpinum*. In wechselnder Menge ist auch *Rhododendron hirsutum* beteiligt. Ein Teil dieser Arten entstammt den Hochstaudenfluren, ein anderer Rasengesellschaften, v.a. den Rostseggenrasen. *Calycocorsus stipitata* selbst ist eine Art saurerer Niedermoore. So heterogen wie die Zusammensetzung dieser Artengruppe erscheint physiognomisch auch die - flächenmäßig im übrigen bedeutungslose - Einheit selbst. Sie besitzt teils Hochstauden-, teils Rasencharakter oder tritt als Alpenrosengebüsch in Erscheinung. Einheitlich ist der Reichtum an Lärche, der einzigen Art in der Baumschicht.

Die Einheit ist z.T. wohl als Lärchen-Wiesenwald, d.h. als lärchenüberstandener Rostseggenrasen anzusehen. Sie paßt schon höhenmäßig kaum mehr zu den Buchenwäldern (mittlere Meereshöhe 1610 m $\pm$ 20 m). Die vorhandenen Differentialarten erlauben jedoch noch zwanglos eine Einordnung an dieser Stelle.

Der Deckungsgrad der Krautschicht ist mit 93 % $\pm$ 3 % sehr hoch; hoch ist auch die mittlere Lichtzahl von 6,3 $\pm$ 0,1.

Erfaßt wurde die Einheit nur am Kederbichl. Sie stellt sicher nur eine Artenkonfiguration von sehr lokaler Bedeutung dar.

1.2.4 Erica-Ausbildung

In föhnbeeinflussten Gebieten, v.a. an den Hängen des Hocheiskopfes in südlicher und westlicher Exposition, erscheint eine Form des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes mit leichter Tendenz zum Schneehede-Kiefernwald. Sie zeichnet sich aus durch *Erica herbacea*, *Polygala chamaebuxus* und *Senecio abrotanifolius*. Die Bestände sind arm an Hochstauden; die relative Standortstrockenheit läßt die Arten der *Saxifraga rotundifolia*-Gruppe bis auf *Adenostyles alliariae* und *Dentaria enneaphyllos* weitgehend verschwinden. Daneben weist noch die *Luzula sylvatica*-Gruppe auf die Hochlagenstandorte hin.

Als Ausgangsgestein wurde praktisch immer anstehender, oft karrenzerfurchter Dachsteinkalk gefunden.

Die Erica-Ausbildung, die wohl auch von Natur aus kein Laubwald mehr sein dürfte, aber mangels sicherer floristischer Kriterien doch nicht vom Hainlattich-Tannen-Buchenwald abzutrennen war, ähnelt stark den Subassoziationen *seslerietosum* und *calamagrostietosum variae* von ZUK-RIGLS (1973) *Adenostylo glabrae-Piceetum* (subalpinum). Mit *Erica herbacea*, *Senecio abrotanifolius* und *Polygala chamaebuxus* treten dort alle spezifischen Differentialarten der Erica-Ausbildung auf. Auch die Physiognomie der von Felsfluren, Latschen und Rasen durchsetzten Vorkommen ist in beiden Fällen ähnlich.

1.2.4.1 Erica-Ausbildung mit *Vaccinium vitis-idaea*

Diese Einheit wurde an steileren (Hangneigung 34 +- 4 Grad) und besonders felsigen Hängen gefunden. Sie kommt typisch v.a. an Südhängen der Röth vor. Auf dem anstehenden, stark zerklüfteten Fels bilden sich hier stärker saure Humusauflagen. Für die Hemmung der Streuzersetzung dürfte hier in besonderem Maße die Trockenheit verantwortlich sein, die auch *Adenostyles alliariae* völlig verschwinden läßt. Die starke Gliederung des Felses läßt dabei ein Vegetationsmosaik entstehen, an dem neben der azidophilen Vegetation der exponierten Stellen auch kalkliebende Arten noch in großen Mengen beteiligt sind. Auf weniger stark gegliederten, m.o.w. horizontalen Dachsteinkalkplatten entsteht demgegenüber die viel stärker azidophil geprägte *Luzula sylvatica*-Ausbildung des Karbonat-Fichtenwaldes (s.u.).

1.2.4.2 Erica-Ausbildung mit Selaginella

In flacherem (Hangneigung 19 ± 3 Grad), im Rahmen einer Aufnahme-
fläche weniger reliefiertem Gelände findet sich eine weitere Form der Erica-Ausbildung, die am Hocheiskopf erfaßt wurde. Als Differentialarten treten hier *Selaginella selaginoides*, *Veronica aphylla* und das Lebermoos *Preissia quadrata* als im wesentlichen sehr lichtbedürftige und kältetolerante Arten.

Der Bestandesschluß ist, zumindest im Bereich der Aufnahmen, mit 12 ± 3 % ausgesprochen niedrig. Entsprechend gering ist hier oft der Waldcharakter. Immerhin findet sich jedoch *Aposeris foetida* als namengebende Art der betrachteten Buchenwaldgesellschaft noch in reichlichen Mengen, und auch der Bestandesschluß ist im Mittel der gesamten Fläche wohl größer als im Bereich der Aufnahmen, die die vegetationonsärmeren Bereiche um die Bäume herum eher aussparen.

Die Einheit erscheint meist auf von Karren zerfurchtem Dachsteinkalk, in dessen Vertiefungen sich Feinerde sammelt. Die Bodenfeuchtigkeit ist deshalb noch groß genug für ein regelmäßiges Vorkommen von *Adenostyles alliariae*. Der Krautbewuchs ist in der unbeweideten Ausbildung gering (Deckungsgrad 24 ± 5 %). Die beweidete Ausbildung besitzt eine wesentlich besser entwickelte Krautschicht (Deckungsgrad 52 ± 10 %) von m.o.w. starkem Rasencharakter und leitet zur Rostseggen-Alpenrispengrasweide über. Bäume sind hier besonders spärlich; sie fanden sich oft nur am Rande der Aufnahme-
fläche. Besonders auffällig in der beweideten Ausbildung sind *Nardus stricta*, *Carex flava* und nicht zuletzt *Bellis perennis*, das mit Ausnahme der Alpenrispengrasweide in kaum einer anderen Einheit des Untersuchungsgebiets auftritt. Die Beweidungsintensität erscheint ausgesprochen hoch, obwohl in die fraglichen Gebiete in über 1500 m Höhe heute kein Vieh mehr gelangt. Sie dürfte vorwiegend dem Rotwild zuzuschreiben sein, das aufgelassene Weidegebiete bevorzugt zur Äsung aufsucht.

Erwähnt sei hier noch die im selben Gebiet vorkommende, aber nicht kartierte Ausbildung mit *Gnaphalium hoppeanum*. Sie besitzt Schneetälchencharakter und steht, soweit erfaßt, unter Weideeinfluß.

2. AHORN-BUCHENWALD (*Aceri-Fagetum*) (Tabelle 6)

Als hochstaudenreiche Waldgesellschaft ist der Ahorn-Buchenwald dem eben beschriebenen Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald anzuschließen. Wie dieser ist er durch den Besitz der *Saxifraga rotundifolia*-Gruppe ausgezeichnet. Die Arten der *Luzula sylvatica*-Gruppe erscheinen demgegenüber - in Verbindung mit einigen zusätzlichen Arten - nur in bestimmten Ausbildungen.

Als positives Kennzeichen des Ahorn-Buchenwaldes gegenüber dem Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald treten *Polystichum lobatum*, *Cystopteris fragilis*, *Ranunculus lanuginosus*, *Adoxa moschatellina* und nicht zuletzt Buche und Bergahorn auf. (Der Ahorn ist allerdings nur in der Baumschicht charakterisierend; in der Krautschicht ist er viel weiter verbreitet.) Diese Arten weisen zumeist auf feuchte, v.a. auch luftfeuchte Standortbedingungen hin. *Polystichum lobatum* vermittelt dabei zu den Schluchtwäldern, die in besonderem Maße durch ein luftfeuchtes Lokalklima ausgezeichnet sind.

Das häufige Vorkommen von Buche und Bergahorn gibt dem Ahorn-Buchenwald den Charakter einer relativ naturnah erhaltenen Waldgesellschaft. Die relativ schwere Zugänglichkeit der Vorkommen mag die Ursache der geringen forstlichen Beeinflussung sein. Die Assoziation findet sich v. a. an felsigen, steilen Hängen oder auf Blockschutthalden zwischen Eckau- und Hoch-Alm und in den bringungsungünstigen Lagen der Röth.

Inwieweit die differenzierenden Krautarten nur dem Laubholzreichtum und damit v.a. den gegenüber Fichtenbeständen besseren Humusverhältnissen ihr Vorkommen verdanken, ist unsicher. Möglicherweise handelt es sich bei m.o.w. großen Teilen des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes ursprünglich um dieselbe Gesellschaft, in der nur die Fichte anspruchsvollere Arten zum Verschwinden gebracht hat.

Das weitgehende Fehlen der *Luzula sylvatica*-Gruppe erklärt sich aus der gegenüber dem Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald geringeren Höhenlage. Die aus diesem Grund etwas geringere Niederschlagsmenge wird möglicherweise durch feinerdereichere Böden wettgemacht, die sich aus den im Ahorn-Buchenwald besonders oft anzutreffenden roten Liaskalken bilden. Aus diesem Grund finden die Arten der *Saxifraga rotundifolia*-Gruppe und andere Feuchtezeiger hier noch sehr günstige Lebensbedingungen.

Im Widerspruch zu der an den Baumarten abzulesenden Naturnähe des Ahorn-Buchenwaldes scheint sein Reichtum an Schlagpflanzen zu stehen. In der Tat sind die Bestände oft licht, und schlagflurartige Freiflächen existieren in größerer Ausdehnung. Die Ursache dafür dürfte in einer stärkeren Lawinenbeeinflussung zu suchen sein, mit der nach Auskunft von Dr. B. Zenke gerade in laubholzreichen Beständen gerechnet werden muß. Die fehlende Belaubung führt dort im Winter zu höheren Schneelagen. Während der Vegetationsperiode wird dagegen im Schatten dicht belaubter Buchen die Verjüngung eher gehemmt, so daß kein genügend kräftiger und Schneebewegungen bremsender Unterwuchs aufkommen kann. Die Lawinen ihrerseits dürften wieder dem regenerationsfähigeren Laubholz gegenüber der Fichte Konkurrenzvorteile verschaffen.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 68 +- 2
davon Gefäßpflanzen: 54 +- 2

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	7,2 +- 0,7
pralp:	23 +- 1
kont:	3,9 +- 0,2
smed:	14,0 +- 0,8
euras:	20,5 +- 0,7
subatl:	9,7 +- 0,5
no:	20,2 +- 0,9
arkt:	2,2 +- 0,2

Mittlere Zeigerwerte:

Lichtzahl:	4,82 +- 0,05 (Halbschatten)
Temperaturzahl:	3,83 +- 0,04 (kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,49 +- 0,02 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,79 +- 0,04 (frisch bis feucht)
Reaktionszahl:	6,44 +- 0,06 (schwach sauer)
Stickstoffzahl:	5,71 +- 0,07 (mäßig stickstoffreich)

Diese Werte zeigen charakteristische Abweichungen von denen der *Saxifraga rotundifolia*-Ausbildung des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes, mit der der Ahorn-Buchenwald am ehesten zu vergleichen ist: Die Temperaturzahl ist wegen der geringeren Meereshöhe größer. Sie steht mit der verringerten Zahl alpiner und der erhöhten Zahl submediterraner Arten in Zusammenhang. Die Kontinentalitätszahl weist dagegen trotz dieser geringeren Höhe auf ozeanischer getönte Klimabedingungen hin, wie sie ja für das Hauptverbreitungsgebiet des Ahorn-Buchenwaldes typisch sind. Sie wird hier v.a. von der erhöhten Zahl subatlantischer Arten beeinflusst. Besonders auffällig ist die höhere Stickstoffzahl, die im Zusammenhang mit dem Reichtum der ganzen Assoziation an Schlagflurarten zu sehen ist. Hinzuweisen ist schließlich auch auf die ausgesprochen hohe Artenzahl der Gesellschaft.

Gebietsvergleich

Verglichen mit dem Hauptvorkommen im atlantischer geprägten nördlichen Randgebiet der Westalpen erscheinen die Berchtesgadener Bestände des Bergahorn-Buchenwaldes zumeist weniger hochstaudenreich. Vergleicht man speziell mit der Tabelle KUOCHs (1954), aus den Schweizer Alpen, so fallen allerdings weniger klimatische als vielmehr edaphisch bedingte Unterschiede ins Auge: Arten wie *Cicerbita alpina*, *Blechnum spicant*, *Festuca altissima*, *Aruncus dioicus*, *Galium odoratum*, *Fissidens taxifolius* und *Atrichum undulatum*, die bei KUOCH deutlich zahlreicher vorkommen als in Berchtesgaden, weisen durchweg auf besonders lehmige, teils zur Versauerung neigende Böden aus silikatreichem Ausgangsgestein hin. Ähnliche Standortsverhältnisse mögen in Berchtesgaden im Bereich des Grünerlengebüsches anzutreffen sein, wie es weiter unten beschrieben wird.

Den Berchtesgadener Beständen recht ähnlich erscheint das von ZUKRIGL (1973) beschriebene *Aceri-Fagetum* des Ostalpenrandes. Die Einteilung ZUKRIGLs in eine trockene Subassoziation *calamagrostietosum variae* und ein feuchtes *Aceri-Fagetum stellarietosum* entspricht recht genau der für Berchtesgaden durchgeführten, und der Bestand an Feuchtezeigern der letztgenannten Subassoziation ist auch recht ähnlich dem der entsprechenden Ausbildungen im Nationalpark Berchtesgaden. Trotzdem weist auch bei ZUKRIGL eine Anzahl Arten auf besonders lehm- und tonreiche Böden hin. Hierzu gehören z.B. *Galium odoratum*, *Primula elatior*, *Elymus euro-*

paus, *Milium effusum* und *Astrantia maior*. Als geographische Differentialarten östlicher Alpengebiete sind *Senecio subalpinus*, *Symphytum tuberosum*, *Galium sylvaticum*, *Helleborus niger*, *Dentaria bulbifera*, *Cyclamen purpurascens* und *Digitalis ambigua* anzusehen. Allgemein häufig ist bei ZUKRIGL auch *Cirsium erisithales*.

2.1 Sanicula-Ausbildung

Die *Sanicula*-Ausbildung nimmt den untersten Höhenbereich der Ahorn-Buchenwald-Vorkommen ein. Die mittlere Meereshöhe beträgt 1180 m $\pm$ 30 m. Aus diesem Grund treten hier recht zahlreiche Arten der tieferen Lagen charakterisierenden *Sanicula*-Gruppe auf. Das Substrat für die Gesellschaft wird fast ausschließlich von Blockschutthalden gebildet.

2.1.1 *Sanicula*-Ausbildung mit *Calamagrostis varia*

Diese etwas trockenere Form der *Sanicula*-Ausbildung (Feuchtezahl 5,64 $\pm$ 0,07) ist v.a. durch Arten der *Calamagrostis varia*-Gruppe gekennzeichnet, einer Artengruppe, die auch den Weißseggen- und den Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald gemeinsam charakterisiert. Diesen Arten schließt sich hier noch *Carex ferruginea* an. Die *Sanicula*-Gruppe ist dabei manchmal nur schwach vertreten.

2.1.2 *Sanicula*-Ausbildung mit *Stellaria nemorum*

Feuchtezeiger wie *Stellaria nemorum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere* u.a. charakterisieren diese zweite Einheit der *Sanicula*-Ausbildung. Sie kommt u.a. am Fuß steilerer Felspartien vor, wo sich das vom Fels ablaufende Regenwasser sammelt. Hochstaudenarten sind hier mitunter besonders üppig entwickelt - allerdings nur dann, wenn eine Umzäunung äsendes Wild fernhält.

Stärkere Weideeinflüsse zeigen sich naturgemäß nur im unmittelbaren Einflußbereich von Almen. Nur hier bilden reichlich vorhandene Weidezeiger eine deutlich abzugrenzende, wenn auch nur in einer Aufnahme erfaßte Einheit.

2.2 Reine Ausbildung

Im mittleren Höhenbereich von 1260 m $\pm$ 30 m findet sich die Reine Ausbildung des Ahorn-Buchenwaldes. Sie besitzt weder die Tieflagenarten der *Sanicula*-Gruppe noch die hier erweiterte *Luzula sylvatica*-Gruppe der Hochlagen. Auch hier wird also offenbar - wie schon bei der verarmten Ausbildung des Reinen Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes das Phänomen eines differentialartenlosen Übergangsbereiches erkennbar, der anders als die entsprechende, aber sicher wenig charakteristische Ausbildung des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes durchaus als Kern der Gesellschaft betrachtet werden kann.

Die Reine Ausbildung wurde nur in ihrer feuchten Form mit *Stellaria nemorum* wiedergegeben. Die wenigen Aufnahmen einer trockeneren Einheit mit *Calamagrostis varia* wurden der *Sanicula*-Ausbildung zugerechnet. Vorkommen der Einheit finden sich häufig in Hangmulden.

2.3 *Luzula sylvatica*-Ausbildung

Diese Ausbildung findet sich im obersten Höhenbereich der Assoziation bei 1320 m $\pm$ 30 m. Sie ist charakterisiert durch eine modifizierte *Luzula sylvatica*-Gruppe, der sich hier *Homogyne alpina*, *Knautia dipsacifolia*, *Vaccinium myrtillus* und *Coeloglossum viride* anschließen. *Carex ferruginea* und das weniger bedeutungsvolle Felsmoos *Pseudoleskea incurvata* besitzen dagegen hier eine andere Gesamtverbreitung. Die höhenbedingt schlechte Streuzersetzung drückt sich in relativ niedrigen Reaktions- (6,21 $\pm$ 0,06) und Stickstoffzahlen (5,31 $\pm$ 0,06) aus. Die Temperaturzahl liegt erwartungsgemäß mit 3,69 $\pm$ 0,06 etwas unter dem Durchschnitt der Assoziation.

Neben der Normalform der Ausbildung wurde eine wenig bedeutsame Ausbildung mit *Calamagrostis villosa* erfaßt. Sie scheint weniger felsige Standorte mit lichten Baumbeständen zu besiedeln, wurde aber kaum kartiert und deshalb in der endgültigen Karte der entsprechenden Einheit des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes zugeordnet.

3. EDELLAUBWÄLDER (*Aceri-Fraxinetum*) (Tabelle 7)

Edellaubwälder der weitgefaßten Assoziation des Ahorn-Eschenwaldes (*Aceri-Fraxinetum*) treten im montanen Bereich normalerweise dort auf, wo die Buche - sei es durch allzu schwere, nasse Böden, durch Spätfrostgefährdung oder Steinschlag - zugunsten von Edellaubhölzern wie Bergahorn, Esche oder Bergulme zurückgedrängt wird. Nichtsdestoweniger erscheinen die hier dem *Aceri-Fraxinetum* i.w.S. zugeordneten Waldgesellschaften z.T. ausgesprochen buchenreich - auf jeden Fall buchenreicher als der heute allgemein von der Fichte dominierte Hainlattich-Tannen-Buchenwald.

Die hier behandelten Edellaubwälder gliedern sich in zwei grundverschiedene Gruppen von Gesellschaften: Der Ahorn-Eschenwald i.e.S. besiedelt tiefgründige, feuchte und meist skelettarme Lehm Böden und ist v.a. durch eine Reihe von Auwaldarten charakterisiert. Diesem stehen die Schluchtwälder gegenüber, die meist skelettreiche felsige oder blockschuttüberrollte Hänge in luftfeuchter Klimelage einnehmen und auch durch echte *Tilio-Acerion*-Charakter- bzw. Differentialarten ausgezeichnet sind.

3.1 AHORN-ESCHENWALD I.E.S.

Die bodenfeuchten, tiefgründig lehmigen Standorte des eigentlichen Ahorn-Eschenwaldes finden sich im Untersuchungsgebiet z.B. auf den Werfener Schichten der unteren Tallagen. (Die meisten Grünlandgesellschaften im Hauptsiedlungsbereich des Alpenparkes sind als Ersatzgesellschaften des Ahorn-Eschenwaldes zu betrachten.) Die hohe Bodenfeuchtigkeit stammt dabei z.T. wohl aus Hangzugswasser; manchmal finden sich die Vorkommen auch im Einflußbereich kleiner Bäche.

Die systematische Einordnung fällt zunächst etwas schwer: Rein floristisch wäre eine Zuweisung zu den Auenwäldern gerechtfertigt; wesentliche Differentialarten sind Feuchtezeiger, die zu einem beträchtlichen Teil dem Bereich der Auenwälder entstammen. Hierzu gehören *Impatiens noli-tangere*, *Chrysosplenium alternifolium* und *Stachys sylvatica*. Der Auwaldcharakter tritt auch in der Baumschicht hervor; hier dominiert

oft die Grauerle, während Esche und Bergahorn nur in einer einzigen Ausbildung vorkommen. Trotzdem erscheint die Klassifizierung als Grauerlen-Auwald nicht gerechtfertigt. Die Gesellschaft tritt kaum jemals an Gewässern von nennenswerter Wasserführung auf; sie kann dementsprechend ökologisch nicht als Auwald angesehen werden, der ja auf das Auftreten zeitweiser Überschwemmungen angewiesen ist. Weiterhin sind grauerlenreiche Vorwaldstadien des Ahorn-Eschenwaldes bekannt, die sowohl durch Niederwaldwirtschaft als auch durch Waldweide begünstigt werden. Ursache dafür sind die größere Stockausschlagsfähigkeit und der geringere Verbiß der Grauerle im Vergleich mit Bergahorn und Esche (PFADENHAUER 1969). Bestätigt wird die Annahme des Vorwaldcharakters der Grauerlenbestände durch die eigene Beobachtung, daß bei entsprechender Zusammensetzung der Bodenvegetation in der Baumschicht statt der Grauerle auch Esche und Bergahorn dominieren können. Nichtsdestoweniger wurden Bestände ähnlicher Artenkombination von SIEDE (1960) zum Grauerlen-Auwald gerechnet. Der Sanikel-Grauerlenwald SIEDEs, der zwar ebenfalls ein Vorwaldstadium darstellt, hat dagegen wenig unmittelbare Beziehungen zum Ahorn-Eschenwald; er besiedelt offenbar trockenere Standorte. Trotzdem weist er darauf hin, daß viele Grauerlenbestände der Alpen als Vorstadium anderer Waldgesellschaften, wie Galio-Abietetum, Aposerido-Fagetum oder eben auch Aceri-Fraxinetum aufgefaßt werden müssen. (SEIBERT, mdl.)

Hinzuweisen wäre hier noch auf eine gewisse standörtliche Ähnlichkeit mit den feuchten Ausbildungen des Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchengewaldes. Auch letztere besiedeln ja feuchte Lehmböden. Im Unterschied zum Ahorn-Eschenwald erscheinen diese Gesellschaften deutlich azidophiler, was jedoch wiederum zumindest teilweise auf die dort anzutreffende Dominanz der Fichte zurückgeführt werden kann. Somit wäre, wie bereits angedeutet, auch eine Parallelisierung dieser anthropogen veränderten Waldgesellschaften mit dem Ahorn-Eschenwald möglich.

Neben den bereits genannten Auwaldarten sind in der Tabelle noch weitere Differentialarten für den Ahorn-Eschenwald aufgeführt. Ein Teil davon differenziert nur von den Schluchtwäldern. Speziell auf den Ahorn-Eschenwald, und z.T. auch auf die Auwälder des Untersuchungsgebiets konzentriert, sind neben *Stachys sylvatica* noch *Cirsium oleraceum*, *Mentha longifolia*, *Geum urbanum*, *Urtica dioica*, *Festuca gigantea*, *Cirsium arvense* und *Stellaria media*.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 46 +- 3
davon Gefäßpflanzen: 39 +- 2

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	1,6 +- 0,5
pralp:	10 +- 1
kont:	4,4 +- 0,4
smed:	15,1 +- 0,9
euras:	22 +- 1
subatl:	7,9 +- 0,6
no:	14 +- 1
arkt:	0,7 +- 0,2

Mittlere Zeigerwerte:

Lichtzahl:	5,0 +- 0,1	(Halbschatten)
Temperaturzahl:	4,44 +- 0,07	(mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,48 +- 0,03	(subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,97 +- 0,04	(frisch bis feucht)
Reaktionszahl:	6,55 +- 0,06	(schwach sauer bis schwach basisch)
Stickstoffzahl:	6,18 +- 0,08	(mäßig stickstoffreich bis stickstoffreich)

Auffallend niedrig ist hier zunächst die Gesamtartenzahl. Sie entspricht derjenigen der artenärmsten Subassoziationen des Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Offensichtlich ist also die Zahl der ökologischen Nischen auf Lehmböden geringer als auf skelettreichen, felsigen Standorten. Hinzu kommt außerdem, daß die Krautschicht im Ahorn-Eschenwald oft von einigen wenigen Hochstaudenarten, v.a. Chaerophyllum hirsutum, dominiert wird, die die niedriger wachsenden Kräuter unterdrücken.

Die mittleren Zeigerwerte liegen fast alle außerhalb des Bereiches der bisher behandelten Waldgesellschaften: Die Temperaturzahl ist, bedingt durch die relativ talnahe Lage in durchschnittlich 900 m +- 50 m Meereshöhe, ungewöhnlich hoch. Allerdings ist die Temperaturzahl in ih-

rer Höhe offenbar unabhängig vom Anteil der submediterranean Arten, die, verglichen etwa mit Weißseggen- oder Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, kaum Besonderheiten erkennen läßt. Niedrig ist dagegen die Zahl kältetoleranter alpiner und auch die Zahl präalpiner Arten. Die Kontinentalitätszahl entspricht derjenigen des Ahorn-Buchenwaldes, obwohl die Zahl kontinentaler Arten höher und die der subatlantischen niedriger ist. Die Feuchtezahl liegt wiederum weit über allen bisher genannten Werten und auch die Reaktionszahl gehört mit zu den höchsten der hier behandelten Waldgesellschaften. Am meisten fällt jedoch die Stickstoffzahl aus dem Rahmen. Sie übertrifft diejenige aller anderen bearbeiteten Pflanzengesellschaften des Gebiets und weist damit auf hohe biologische Aktivität und große Bodenvorräte an Stickstoff hin, die zweifellos mit hohen Vorräten anderer Nährelemente einhergehen.

3.1.1 Reine Ausbildung

Die Reine Ausbildung des Ahorn-Eschenwaldes kommt sporadisch überall im Untersuchungsgebiet vor. Ahorn und Esche selbst fehlen hier weitgehend in der Baumschicht. Dafür bildet die Grauerle hier oft dichte Bestände. Auch sie kann jedoch fehlen; ausnahmsweise wird die Baumschicht auch von der Buche aufgebaut. Pflanzenbestände mit ähnlicher Artenkombination, aber mit gänzlich fehlender Baumschicht, wurden der Einfachheit halber ebenfalls hier eingeordnet, obwohl sie evt. besser als Roßminzenflur zu klassifizieren wären. Sie sind im Gebiet praktisch ohne Bedeutung und in der Tabelle gar nicht eigens hervorgehoben; in der Karte ist ein kleiner Bestand als Schlagflur dargestellt.

Die Reine Ausbildung existiert in beweideter und in unbeweideter Form. Letztere besitzt häufiger die Grauerle in der Baumschicht, während erstere etwas reicher an Fichte ist.

3.1.2 Eschen-Ausbildung

Die Eschen-Ausbildung ist durch eine höhere Dominanz von Esche und

Bergahorn in der Baumschicht gekennzeichnet und entspricht damit eher dem Typus der Assoziation. Ihr Vorkommen ist auf St. Bartholomä konzentriert. Sie ist dort bisweilen etwas ruderal beeinflusst und dürfte sicher durch Düngerezufuhr gefördert sein. Ihre Stickstoffzahl liegt entsprechend noch deutlich über dem Durchschnitt der gesamten Assoziation.

3.2 SCHLUCHT WALD

Als Schluchtwälder sollen hier dem Ahorn-Eschenwald i.e.S. ursprünglich und z.T. auch heute noch edellaubbaumreiche Waldgesellschaften auf steileren, skelettreichen und oft felsigen Hängen mit luftfeuchtem Lokalklima gegenübergestellt werden. Sehr häufig siedeln sie tatsächlich am Abhang m.o.w. tiefer, oft von Bächen durchflossener Schluchten.

Als lokale Charakter- bzw. Differentialarten erwiesen sich u.a. Bergulme (*Ulmus glabra*), *Aruncus dioicus*, *Lonicera alpigena* (eigentlich eine Charakterart des Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes), *Actaea spicata*, *Festuca altissima*, *Asarum europaeum*, *Galium odoratum*, *Bromus benekenii*, *Symphytum tuberosum* ssp. *nodosum*, *Lunaria rediviva* und *Phyllitis scolopendrium*. *Petasites albus* verbindet mit dem Ahorn-Eschenwald i.e.S. und *Polystichum lobatum* mit dem Ahorn-Buchenwald. In der Baumschicht sind fast immer Bergahorn und Esche reichlich vertreten; auch die Sommerlinde tritt manchmal auf. Dazu kommt meistens auch noch die Buche, die sogar oft bestandesbildend wirkt. Sie weist darauf hin, daß es sich bei den erfaßten Beständen größtenteils noch nicht um ganz typische Schluchtwälder handeln kann; oft sind es nur durch etwas höhere Luftfeuchtigkeit bedingte Übergangsformen etwa zum Reinen oder auch zum Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald.

Schwierig ist deshalb oft die Zuordnung zu bekannten Schluchtwaldgesellschaften. Einigermaßen eindeutig ist nur die Identifikation des Waldgeißbart- und des Hirschzungen-Bergahornwaldes. Die übrigen Einheiten tendieren wohl z.T. ebenfalls zum Hirschzungen-Bergahornwald, jedoch fehlen ihnen die Charakterarten desselben. Sie sollen deshalb hier nur allgemein als Schluchtwald bezeichnet werden.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 55 +- 2
davon Gefäßpflanzen: 42 +- 2

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	3,0 +- 0,4
pralp:	16,9 +- 0,9
kont:	3,7 +- 0,3
smed:	17,4 +- 0,7
euras:	14,9 +- 0,8
subatl:	10,4 +- 0,4
no:	10,6 +- 0,8
arkt:	0,7 +- 0,1

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	4,38 +- 0,06 (Halbschatten)
Temperaturzahl:	4,34 +- 0,04 (kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,52 +- 0,03 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,64 +- 0,04 (frisch bis feucht)
Reaktionszahl:	6,66 +- 0,04 (schwach sauer)
Stickstoffzahl:	5,90 +- 0,09 (mäßig stickstoffreich bis stickstoffreich)

Recht niedrig liegt hier die Lichtzahl. Sie entspricht einem relativ hohen Bestandesschluß von 70 % +- 3 %. Auch die Temperaturzahl ist, offenbar wegen der geringen Zahl nordischer Arten, recht hoch. Sie ist zweifellos durch die geringe Meereshöhe von 906 m +- 30 m bedingt. Erwartungsgemäß hoch ist die Feuchtezahl; sie liegt freilich deutlich unter derjenigen des Ahorn-Eschenwaldes i.e.S.. Ungewöhnlich hohe Werte weisen weiterhin die Stickstoff- und die Reaktionszahl auf - ein Hinweis auf gute Streuzersetzungsbbedingungen. Die Reaktionszahl liegt hierbei noch etwas über derjenigen des eigentlichen Ahorn-Eschenwaldes, die Stickstoffzahl ist dagegen deutlich niedriger. Beides steht sicher mit der größeren Felsigkeit und dem geringeren Feinerdegehalt der Schluchtwaldböden im Zusammenhang.

3.2.1 Waldgeißbart-Bergahornwald (Arunco-Aceretum)

Diese Assoziation wurde in einigen Aufnahmen im Bereich der Wimbachbrücke erfaßt. Im Kartierungsgebiet selbst wurde sie nicht gefunden.

Der Waldgeißbart-Bergahornwald tritt üblicherweise auf Silikatgestein auf. Am Standort der hier aufgenommen Bestände wurde dagegen z.T. Nagelfluh beobachtet; laut geologischer Karte stehen im Bereich der Wimbachbrücke allerdings auch Werfener Schichten und Haselgebirge an. Die Kalkarmut des Gesteins drückt sich dabei offenbar in dem auffälligen Fehlen von Kalkfelsbesiedlern, v.a. der entsprechenden Moose aus.

Typisch für die Assoziation ist das beobachtete Vorkommen an steileren Nordhängen, weniger typisch dagegen der gefundene oberflächliche Skelettreichtum.

Als Differentialarten wurden festgestellt: *Primula elatior*, *Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Polygonatum multiflorum*, *Acer platanoide*s und *Symphytum tuberosum* ssp. *nodosum*. *Aruncus dioicus* als namengebende Art der Assoziation erreicht hier eine besonders hohe Artmächtigkeit. Bekannt ist hier außerdem das Vorkommen von *Leucojum vernum*, das allerdings am ersten Aufnahmezeitpunkt nicht mehr auffindbar war und ebenso wie *Corydalis cava* nur in einigen Aufnahmen nachgetragen wurde.

3.2.2 Hirschzungen-Bergahornwald (Phyllitido-Aceretum)

Diese Assoziation wurde nur an wenigen Stellen des Kartierungsgebiets gefunden. In größerer Ausdehnung kommt sie im Gebiet des Obersees vor. Daneben finden sich noch nennenswerte Bestände im Wimbachtal. Von dort stammt auch die Mehrzahl der Aufnahmen. Ökologisch ist der Hirschzungen-Bergahornwald an jüngere, noch nicht völlig gefestigte Kalkschutthalden gebunden, wie sie oft am Fuß höherer Felswände angehäuft sind. Vom Fels ablaufendes Wasser sorgt hier auch für ausreichende Bodenfeuchtigkeit.

Charakterarten der Assoziation sind *Lunaria rediviva* sowie *Phyllitis scolopendrium*. Als Differentialart gegenüber den übrigen Schluchtwäldern wurde für das Gebiet außerdem *Aconitum napellus* gefunden. In der Baum-

schicht überwiegt der Bergahorn; weniger häufig sind Esche und Bergulme; vereinzelt ist auch die Sommerlinde beteiligt. Die Buche fehlt dagegen hier im Gegensatz zu allen anderen hier behandelten Schluchtwaldgesellschaften fast völlig. Sie meidet den lockeren Steinschutt; dieser ist ein Zeichen für häufigen Steinschlag, dem die Buche nicht gewachsen ist.

Unterschieden wurden eine Reine und eine moosreichere *Saxifraga*-Ausbildung. Letztere scheint v.a. luftfeuchtere, kühlere Standorte zu bevorzugen. Die Reine Ausbildung, die nur in zwei recht unterschiedlichen Aufnahmen erfaßt wurde, ist dagegen, nach den mittleren Temperaturzahlen zu urteilen, eher thermisch begünstigt. Die Luftfeuchtigkeit mag an ihren Standorten etwas geringer sein, während die Bodenfeuchtigkeit, bedingt offenbar durch den höheren Lehmgehalt des Bodens, auch hier noch sehr groß sein kann.

3.2.3 Schluchtwald i.allg.

Wie der Hirschzungen-Bergahornwald so besiedeln auch die folgenden Gesellschaften meist felsige, luftfeuchte Standorte. Das Substrat ist hier freilich normalerweise wesentlich mehr gefestigt; nicht selten wird es von anstehendem Fels bestimmt. Der Schluchtwaldcharakter ist dabei häufig nur angedeutet; die Buche überwiegt in der Baumschicht.

3.2.3.1 Tannen-Ausbildung

Die Tannen-Ausbildung, die v.a. im Hirschbichlklausgraben auftritt, besitzt noch einen recht ausgeprägten Schluchtwaldcharakter. Ihre Differentialarten sind *Abies alba*, *Centaurea montana* und *Pyrola secunda*. Als Ausgangsgestein findet sich hier häufiger silikatreiches Material, aus dem etwas lehmigere Böden gebildet werden. Eine etwas unterdurchschnittliche Reaktionszahl deutet schwache Versauerungstendenzen dieser Böden an. Nicht nur was das Ausgangsgestein betrifft, sondern auch nach der Artenzusammensetzung bestehen deutliche Beziehungen zum Waldgeißbart-Bergahornwald; mit diesem verbinden *Primula elatior*, *Aegopodium podagraria* und *Asarum europaeum*.

3.2.3.2 *Galium odoratum*-Ausbildung

Die Differentialarten der *Galium odoratum*-Ausbildung sind *Galium odoratum*, *Elymus europaeus* und *Bromus benekenii*. Diese Arten deuten wiederum auf einen etwas erhöhten Lehmgehalt des Bodens hin. Allerdings ist hier keine Versauerungstendenz festzustellen. Vorkommen der Einheit finden sich ausschließlich in den östlichen Teilgebieten unterhalb der Gotzenthalm-Alm und am Jenner.

Der Schluchtwaldcharakter der Einheit ist insgesamt gering. Im Grunde ähnelt die Gesellschaft sehr dem typischen Hainlattich-Tannen-Buchenwald, wie er von OBERDORFER (1957) aus dem Allgäu beschrieben wird und ebenso dem Abieto-Fagetum KUOCHs (1954) aus den Schweizer Alpen sowie der *Elymus*-Ausbildung des Abieti-Fagetum LIPPERTs (1966) aus Berchtesgaden. Die Einheit wäre damit evt. besser als eine an Schluchtwaldarten reichere Ausbildung des Reinen Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes einzuordnen.

Ganz allgemein sind die Differentialarten der *Galium odoratum*-Ausbildung des Schluchtwaldes in anderen Alpentteilen wesentlich häufiger vertreten als in den Berchtesgadener Wäldern. Sowohl in den Wäldern der Westalpen (KUOCH) als auch am Alpenostrand (ZUKRIGL 1973) werden insgesamt deutlich höhere Stetigkeitswerte erreicht als in Berchtesgaden.

3.2.3.3 Reine Ausbildung

Die Reine Ausbildung besitzt die weiteste Verbreitung aller Schluchtwälder des Gebiets. Auch hier ist der Schluchtwaldcharakter freilich oft nur andeutungsweise erkennbar. Typische Standorte sind felsige Steilhänge; die mittlere Hangneigung beträgt 39 ± 2 Grad.

3.3 HASEL-FEISENBIRNEN-GESELLSCHAFT (Tabelle 8)

Diese Gesellschaft findet sich v.a. im Umkreis des Königssees. Sie besiedelt dort den unteren Bereich der zum See hin abfallenden, m.o.w. steilen und felsigen Hänge.

Die Bestände erscheinen meistens sehr strauchreich. Häufig sind Gebüsche, in denen entweder Hasel oder strauchförmige Esche dominiert. Mitunter ist auch eine gut entwickelte Baumschicht anzutreffen, die v.a. aus Buche, weniger aus Bergahorn, Fichte oder Lärche besteht. Daneben finden sich jedoch auch lichte, rasenartige Partien.

Der Anschluß an die gleichnamige Gesellschaft LIPPERTs (1966) erfolgt, obwohl die namengebende Felsenbirne hier praktisch nicht vorkommt. Die hier behandelte Einheit besitzt auch insgesamt bereits einen deutlich stärkeren Waldcharakter als die Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft LIPPERTs und kann deshalb nicht mehr bei den Hecken und Gebüschern eingeordnet werden. Die Artenkombination deutet vielmehr auf eine Verwandtschaft mit den Schluchtwäldern hin. Daneben bestehen freilich auch Beziehungen zum Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald. Entsprechend findet sich auch bei THIELE (1978) eine Moehringia-Ausbildung mit Aconitum des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes, die der Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft untergeordnet werden könnte.

Die für die gesamte Gesellschaft typischen Differentialarten wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Eine davon besteht aus *Fraxinus excelsior*, *Campanula trachelium*, *Angelica sylvestris*, *Centaurea montana*, *Polystichum lobatum*, *Aconitum napellus* und *Aruncus dioicus*. Diese Arten verbinden mit den übrigen Schluchtwäldern, wobei *Campanula trachelium* und *Centaurea montana* jedoch enger an die Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft angeschlossen sind. Eine weitere Gruppe setzt sich aus *Corylus avellana*, *Eupatorium cannabinum*, *Hepatica nobilis*, *Rubus saxatilis*, *Epipactis helleborine* (nicht sicher bestimmt), *Hypericum montanum*, *Clematis vitalba*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Laserpitium latifolium*, *Silene nutans* und dem Moos *Entodon concinnus* zusammen. Diese Arten meiden die übrigen Schluchtwälder weitgehend, kommen allerdings z.T. in einzelnen anderen der schon beschriebenen Waldgesellschaften vor. Stark zurück treten sie auf jeden Fall im Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, einer besonders nahestehenden, sehr weit verbreiteten Waldgesellschaft. Den größten Treuegrad zur Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft weist *Hypericum montanum* auf.

Gemeinsam sind den meisten der Differentialarten relativ hohe Licht- und Wärmebedürfnisse. Die Schluchtwaldarten verlangen außerdem ein luftfeuchtes Lokalklima. Der thermophile Charakter der Vegetation ist sicher zum einen auf die geringe Höhenlage zurückzuführen; zum anderen mag auch die Abmilderung von Temperaturextremen durch die Wassermassen des Königssees eine wärmeliebende Vegetation begünstigen. Trotzdem läßt die Artenzusammensetzung jedoch keinerlei Hinweis auf eine besondere Ozeanität des Klimas erkennen.

Eindeutig ist dagegen die Reaktion der Pflanzenwelt auf die durch den See erhöhte Luftfeuchtigkeit. In dem tief schluchtartig eingeschnittenen, senkrecht zur Hauptwindrichtung verlaufenden Talkessel des Königssees dürfte dabei die Ausbildung eines luftfeuchten Lokalklimas besonders begünstigt sein.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 57 +- 2
davon Gefäßpflanzen: 46 +- 1

mittlere Artenzahl der Goelemente

alp:	3,4 +- 0,4
pralp:	17,0 +- 0,9
kont:	4,9 +- 0,3
smed:	21,1 +- 0,6
euras:	19,0 +- 0,7
subatl:	9,0 +- 0,4
no:	11,4 +- 0,6
arkt:	0,2 +- 0,1

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	5,33 +- 0,08 (Halbschatten)
Temperaturzahl:	4,51 +- 0,04 (mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,59 +- 0,02 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,15 +- 0,05 (frisch)
Reaktionszahl:	6,90 +- 0,06 (schwach sauer bis schwach basisch)
Stickstoffzahl:	4,98 +- 0,09 (mäßig stickstoffreich)

Auch an diesen Zahlen wird noch einmal das hohe Licht- und insbesondere Wärmebedürfnis der Gesellschaft sichtbar. Parallel dazu geht der hohe Anteil submediterraner und die geringe Zahl präalpiner und nordischer Arten. Die Kontinentalitätszahl entspricht - etwas unerwartet - voll dem Gebietsdurchschnitt; die durch den Einfluß des Königssees erhöhte Ozeanität des Lokalklimas wird offenbar durch eine gesteigerte Wärmeein- und -ausstrahlung wieder ausgeglichen. Die Feuchtezahl ist, was der Erwartung ebenfalls nicht ganz entspricht, etwas unterdurchschnittlich. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit vermag also offenbar die Flachgründigkeit der Hangstandorte nicht zu kompensieren. Ein erhöhter Föhneinfluß muß in dem N-S verlaufenden Talkessel des Königssees zusätzlich in Betracht gezogen werden.

Was vor allem auffällt, ist die ungewöhnlich hohe Reaktionszahl, die noch über derjenigen des Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes liegt. Sie weist auf flachgründige Kalkstandorte hin, deren Böden, bedingt durch die steile, erosionsbegünstigte Hanglage, nur geringe Reifungsgrade aufweisen. Auch dürfte die Streuzersetzung durch das milde Seeklima in jeder Weise gefördert werden, so daß auch keinerlei saure Humusauflagen entstehen können.

3.3.1 Reine Ausbildung

Die Reine Ausbildung besiedelt insgesamt etwas gereifere Standorte und weist deshalb im Mittel stärkeren Waldcharakter auf als der Rest der Gesellschaft. Trotz des recht hohen Lichtbedürfnisses der Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft als ganzer treten hier auch sehr lichtarme Haselbestände auf. Ein späteres Entwicklungsstadium dürften Buchenbestände darstellen; anthropogen bedingt ist eine Baumschicht aus Fichte.

Je nach dem Vorkommen von Blockschutt-, Weidezeigern oder Schlagpflanzen wurde die Reine Ausbildung in 6 Untereinheiten gegliedert. Der felsarme Grundtyp der Gesellschaft ist durch eine nicht immer in nennenswertem Umfang auftretende Gruppe von Arten zusätzlich schwach positiv gekennzeichnet. Er erscheint geringfügig azidophiler als der Rest der Reinen Ausbildung. Die Formen mit Schlagpflanzen kennzeichnen Stellen mit - oft aufgrund größerer Bodenfeuchtigkeit - verbesserten Nitrifikationsbedingungen, ohne daß hier meistens echte Schlagfluren entwickelt sind. Nur wenn auch Weidezeiger auftreten, scheint es sich um typischere Schlagfluren zu handeln.

3.3.2 Bupthalmum-Ausbildung

Die Bupthalmum-Ausbildung ist mit einem mittleren Bestandesschluß von 43 % $\pm$ 7 % (einschließlich Strauchschicht) lichter als die Reine Ausbildung. Auch m.o.w. gehölzfreie Flächen treten hier stärker hervor. Aus diesem Grund finden hier viele Pflanzen aus Rasengesellschaften günstige Lebensbedingungen. Die mittlere Lichtzahl liegt mit 5,61 $\pm$ 0,06 auch deutlich über dem Durchschnitt der gesamten Gesellschaft.

3.3.2.1 Bupthalmum-Ausbildung mit *Aquilegia*

V.a. auf der O-Seite des Königssees im Kesselgebiet dominiert die Form der Bupthalmum-Ausbildung mit *Veronica urticifolia*, *Aquilegia atrata*, *Rhinanthus glacialis*, *Calamintha alpina* und *Petasites paradoxus*. Diese Arten differenzieren z.T. die Horstseggenrasen in der Waldstufe des Gebiets. *Petasites paradoxus* weist auf einen geringen Reifungsgrad der Böden - evt. auf Bodenverletzungen durch Schneebewegungen - hin.

Die Ausbildung mit *Aquilegia* ist in der Tabelle v.a. durch ihre blockschuttreiche Form repräsentiert; weniger häufig ist die felsarme Ausbildung, die auch beweidet sein kann.

3.3.2.2 Bupthalmum-Ausbildung mit *Molinia*

Diese Einheit ist v.a. auf der W-Seite des Königssees in St. Bartholomä verbreitet. *Molinia arundinacea* ist hier die einzige spezifische Differentialart; sie tritt oft in größeren Herden auf und deckt die Aufnahmeflächen nicht gleichmäßig.

Gegenüber der Ausbildung mit *Aquilegia* scheint diejenige mit *Molinia* etwas wärmeres und ozeanischeres Klima zu bevorzugen. Dies deuten zumindest die mittleren Zeigerwerte an. Hinweise auf eine durch das Pfeifengras normalerweise angezeigte größere Bodenfeuchtigkeit ergeben sich aus diesen Zahlenwerten jedoch nicht.

Auch die Ausbildung mit *Molinia* findet sich meist an felsigen Standorten; die felsarme Form tritt demgegenüber in den Aufnahmen zurück.

4. AUWÄLDER (Tabelle 9)

Typische, regelmäßig überschwemmte Auwälder kommen im Gebiet kaum vor; die Bachufer sind meistens zu steil, um dafür Raum zu lassen. Deshalb sind auch die hier erfaßten Auwaldgesellschaften nicht immer ganz typisch ausgebildet. Eine Beeinflussung durch fließende Gewässer - und sei es auch nur durch Rinnsale - ist jedoch meistens festzustellen.

Eine für sämtliche Auwälder des Gebiets spezifische Artengruppe kann nicht angegeben werden. Viele der charakteristischen Arten differenzieren im Gebiet auch den Ahorn-Eschenwald i.e.S., und unter diesen ist auch nur die Grauerle in allen weiter verbreiteten Auwaldtypen vertreten; andere Arten wie *Carex remota*, *Agropyron caninum* u.a. treten nur in bestimmten Auwaldgesellschaften auf.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 49 +- 6
davon Gefäßpflanzen: 41 +- 5

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	1,8 +- 0,7
pralp:	10 +- 2
kont:	4,6 +- 0,8
smed:	19 +- 2
euras:	23 +- 3
subatl:	8 +- 1
no:	15 +- 2
arkt:	0,5 +- 0,2

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	5,3 +- 0,2	(Halbschatten)
Temperaturzahl:	4,55 +- 0,05	(mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,56 +- 0,04	(subozeanisch)
Feuchtezahl:	6,0 +- 0,2	(frisch bis feucht)
Reaktionszahl:	6,6 +- 0,1	(schwach sauer bis schwach basisch)
Stickstoffzahl:	5,7 +- 0,1	(mäßig stickstoffreich bis stickstoffreich)

Ungewöhnlich hoch ist hier die Temperaturzahl. Sie erklärt sich aus dem Vorkommen in relativ geringer Meereshöhe (850 m $\pm$ 20 m) und geht mit einer geringen Zahl alpiner und präalpiner Arten einher. Erwartungsgemäß ist auch die Feuchtezahl hoch; sie entspricht derjenigen des Ahorn-Eschenwaldes i.e.S..

4.1 BACH-GRAUERLENWALD (*Carici remotae-Fraxinetum*)

Diese Gesellschaft ist dem Ahorn-Eschenwald des Gebiets zunächst verwandt. In beiden Gesellschaften besitzen Arten wie *Festuca gigantea*, *Gemum urbanum* und *Mentha longifolia* ihr Verbreitungsoptimum. Demgegenüber fehlen im Bach-Grauerlenwald *Stachys sylvatica* und *Cirsium oleraceum*. Als einzige der untersuchten Waldgesellschaften besitzt er die Feuchte- bzw. Nässezeiger *Carex remota* und *Juncus effusus*. Weitere Feuchtezeiger differenzieren gegenüber dem Grauerlen-Auwald. Hierher gehören *Myosotis palustris*, *Impatiens noli-tangere*, *Circaea intermedia* und *Caltha palustris*. Wie es für den Bach-Grauerlenwald, der in den Alpen den Bach-Eschenwald vertritt, typisch ist, wird die Baumschicht v.a. von der Grauerle aufgebaut; die Esche fehlt meistens.

Typische Vorkommen des Bach-Grauerlenwaldes finden sich an lehmigen, von Rinnsalen durchnässten Hängen. Ausgangsgestein sind oft Werfener Schichten. Häufig ist Weideeinfluß feststellbar, der die wenig stabilen Böden besonders stark in Mitleidenschaft zieht. Im Artenbestand drückt sich die Beweidung allerdings nur undeutlich aus.

4.1.1 *Mentha*-Ausbildung

Die typische und zugleich feuchteste Form (mittlere Feuchtezahl 6,6 $\pm$ 0.1) ist gekennzeichnet durch *Mentha longifolia*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Cardamine amara*, *Urtica dioica* und die Moose *Conocephalum conicum* und *Brachythecium rivulare*.

Weideeinfluß ist leicht an den starken Trampelspuren in dem nachgiebigen Lehmboden erkennbar; im Artenbestand tritt in solchen Fällen v.a. *Tussilago farfara* auf.

4.1.2 Eschen-Ausbildung

Die Eschen-Ausbildung (mit Esche, Bergahorn und Bergulme) ist sehr selten, nicht besonders typisch und wurde auch nicht kartiert.

4.2 GRAUERLEN-AUWALD (*Alnetum incanae*)

Die hier zum Grauerlen-Auwald gerechneten Bestände unterscheiden sich von dem ebenfalls grauerlenreichen Ahorn-Eschenwald i.e.S. durch ihre weniger lehmigen, skelettreicheren Böden. Entsprechend fehlen hier die für feuchte Lehmböden charakteristischen Arten, die im Gebiet den Ahorn-Eschenwald differenzieren, wie *Festuca gigantea*, *Geum urbanum*, *Stachys sylvatica* und *Mentha longifolia*, aber auch weiter verbreitete Feuchteziger wie *Impatiens noli-tangere*, *Circaea intermedia* oder *Chrysosplenium alternifolium*. Positiv gekennzeichnet ist der Grauerlen-Auwald dagegen lokal gegenüber allen anderen Waldgesellschaften des Gebiets durch *Potentilla reptans*, *Rosa canina*, *Vicia sepium*, *Thalictrum aquilegifolium* und *Agropyron caninum*. Diese Arten sind freilich nicht immer vorhanden; es wurden hier der Einfachheit halber auch alle Grauerlenbestände mit uncharakteristischer Bodenvegetation eingeordnet, die z.T. auch angepflanzt sein können.

Der Grauerlen-Auwald ist wie der Bach-Grauerlenwald im Gebiet ausgesprochen selten. Typischere Bestände finden sich an Uferverebnungen der Bäche, wo auch noch regelmäßige Überschwemmungen vorkommen dürften, daneben auch auf offenbar sickerfeuchten Schuttfächern. Weniger typische Grauerlenbestände finden sich in felsigen Hangeinschnitten, die höchstens zeitweise Wasser führen.

Die weitere Untergliederung der Gesellschaft erfolgte je nach dem Vorhandensein von Weidezeigern.

5. LABKRAUT-BUCHEN-TANNENWALD (Galio-Abietetum) (Tabelle 2)

Der Labkraut-Buchen-Tannenwald ist u.a. in der voralpinen Flyschzone weit verbreitet (PFADENHAUER 1975). In den Kalkalpen findet er nur wenige geeignete Standorte. Die in Berchtesgaden aufgenommenen Bestände schließen eng an den Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald an und erscheinen deshalb auch in derselben Tabelle. Wie dieser besiedelt der Labkraut-Buchen-Tannenwald lehmreiche Böden. Die Differentialartenkombination entspricht der *Galium rotundifolium*-Ausbildung der genannten Gesellschaft, mit dem Unterschied, daß hier zusätzlich *Blechnum spicant* und - weniger treu - *Thelypteris limbosperma* auftreten und auf besonders saure Bodenverhältnisse hinweisen. Die Ursache hierfür ist in vielen Fällen ein silikatreiches Ausgangsgestein. Die Baumschicht wird weitgehend von der Fichte eingenommen; daß hier jedoch auch die Tanne günstige Wachstumsbedingungen vorfinden würde, darauf deutet das gehäufte Vorkommen von Tannenkeimlingen in dieser Gesellschaft hin.

Vorkommen der Assoziation finden sich in den unteren und mittleren montanen Lagen (mittlere Meereshöhe 970 m $\pm$ 30 m). In größerer Meereshöhe wird sie auf entsprechendem Substrat vom Alpenlattich-Fichtenwald abgelöst.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 59 $\pm$ 2
davon Gefäßpflanzen: 48 $\pm$ 2

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	2,0 $\pm$ 0,4
pralp:	13,5 $\pm$ 0,7
kont:	2,9 $\pm$ 0,2
smed:	19 $\pm$ 1
euras:	23 $\pm$ 2
subatl:	11,1 $\pm$ 0,6
no:	18,0 $\pm$ 0,8
arkt:	0,6 $\pm$ 0,1

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	4,9 +- 0,1	(Halbschatten)
Temperaturzahl:	4,23 +- 0,05	(kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,38 +- 0,02	(ozeanisch bis subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,59 +- 0,03	(frisch)
Reaktionszahl:	5,6 +- 0,1	(mäßig sauer)
Stickstoffzahl:	5,33 +- 0,06	(mäßig stickstoffreich)

Die bodensauren Bedingungen drücken sich hier in einer ungewöhnlich niedrigen Reaktionszahl aus. Auffallend niedrig ist auch die Kontinentalitätszahl. Sie liegt noch etwas unter derjenigen des vergleichbaren Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Geringer als dort ist entsprechend die Zahl kontinentaler und geringfügig höher die Zahl subatlantischer Arten. Ob die Kontinentalitätszahl hier tatsächlich auf ozeanischere Klimabedingungen hinweist, erscheint jedoch fraglich.

5.1 Waldschachtelhalm-Labkraut-Buchen-Tannenwald (*Galio-Abietetum equisetetosum sylvaticae*)

Vorkommen dieser seltenen Waldgesellschaft wurden nur im Bereich des Hirschbichlklausegrabens und hier auf Schrambachschichten gefunden, die im vorliegenden Fall ein saures Substrat bilden und gleichzeitig als Quellhorizont wirken.

Die Gesellschaft ähnelt standörtlich und in ihrer Artenkombination sehr dem Bach-Grauerlenwald des Gebiets. Verbindende Arten sind Feuchte- bis Nässezeiger wie *Myosotis palustris*, *Carex remota*, *Impatiens noli-tangere*, *Juncus effusus*, *Caltha palustris* u.a.. *Galium rotundifolium* als namengebende Art fehlt. Auf einen gewissen Nadelwaldcharakter deuten i.w. nur die Säurezeiger der Krautschicht wie *Blechnum spicant*, *Carex pallescens* und nicht zuletzt der bestandesbildend auftretende Waldschachtelhalm (*Equisetum sylvaticum*) selbst hin. Eine Baumschicht fehlt in beiden vorliegenden Aufnahmen weitgehend; die Tanne selbst wurde nur an einer Stelle vereinzelt angetroffen.

Offenbar handelt es sich bei den Beständen um alte, sich nur noch schwer wiederbewaldende Schlagfluren. Verjüngungshemmnisse stellen sicher die Nässe des Bodens und der dichte Schachtelhalmaufwuchs dar.

Obwohl das weitgehende Fehlen einer Baumschicht eine zuverlässige Ansprache der aufgenommenen Bestände erschwert, sind diese doch recht gut dem Waldschachtelhalm-Tannenwald, wie er zuerst von MOOR (1952) aus dem Schweizer Jura beschrieben wurde, vergleichbar. Allerdings fehlen bei MOOR gerade die Säurezeiger mit Ausnahme des Schachtelhalms und es finden sich dafür anspruchsvollere Arten wie *Galium odoratum* und *Bromus benekenii*. Trotz identischer Meereshöhe lassen außerdem Sträucher wie *Lonicera xylostium* und *Viburnum lantana* die Gesellschaft MOORs deutlich thermophiler erscheinen als die Bestände Berchtesgadens.

Als *Equiseto-Abietetum* wurde eine entsprechende Gesellschaft auch von KUOCH (1954) aus den Schweizer Alpen beschrieben. Wie bei MOOR enthält sie *Filipendula ulmaria* als charakteristischen Nässezeiger, der im Falle Berchtesgadens fehlt. Er fehlt auch am Alpenostrand, wo von ZUKRIGL (1973) eine ähnliche Waldgesellschaft beschrieben wurde.

5.2 Labkraut-Buchen-Tannenwald, Reine Ausbildung

Die Reine Ausbildung entspricht dem verbreiteten Grundtyp der Assoziation. Typische Aufnahmen entstammen hier einem Bereich mit anstehendem Haselgebirge. Meist fand sich auf den Aufnahmeflächen jedoch noch reichlich Kalkgestein, dessen lehmige Verwitterungsprodukte u.U. ebenfalls ein saures Substrat bilden können. Häufig mögen die sichtbaren Kalkblöcke auch nur oberflächlich dem silikatreicheren Material des Untergrundes überlagert sein.

Der Reinen Ausbildung des Labkraut-Buchen-Tannenwaldes wurden in größerem Ausmaß Schlagfluren zugeordnet. Diese entsprechen in der Artenzusammensetzung häufig nicht voll der Bezugsgesellschaft. Hier wurden vielmehr all die Schlagfluren der tieferen Lagen eingeordnet, in denen *Thelypteris limbosperma* - und oft nur dieser allein - auf eine gewisse, meist durch größeren Silikatreichtum bedingte Bodenversauerung hinweist.

Die Gesellschaft läßt sich am besten mit PFADENHAUERS (1975) Reiner

Ausbildung des Galio-Abietetum brachypodietosum vergleichen. Beide Gesellschaften zeichnen sich größtenteils durch die auf die tieferen Lagen beschränkte Sanicula-Gruppe aus, die auch bei PFADENHAUER eine ungefähre Entsprechung findet. ZUKRIGL (1973) beschreibt als ähnliche Gesellschaft ein Oxali-Abietetum petasitetosum, das häufig Werfener Schichten besiedelt. Die Gesellschaft ZUKRIGLs erscheint allerdings etwas feuchter und evt. weniger azidophil: Sie ist reicher an *Impatiens noli-tangere* und *Urtica dioica*, aber ärmer an *Blechnum spicant* und *Rhytidiadelphus loreus*. Den Alpenostrand kennzeichnen Arten wie *Luzula luzuloides*, *Deschampsia flexuosa*, *Pulmonaria stiriaca* und *Symphytum tuberosum*.

5.3 Labkraut-Buchen-Tannenwald, *Cardamine trifolia*-Ausbildung

Im Hirschbichtal findet sich typisch ausgebildet eine Gesellschaft mit *Rubus fruticosus* s.l., *Holcus lanatus*, *Cardamine trifolia* und *Lathyrus pratensis*. Sie besiedelt dort - manchmal im Kontakt zum Bach-Grauerlenwald - Werfener Schichten oder Lias-Mergel. Es handelt sich meist um eine reine Schlaggesellschaft, die mitunter auch in Grünland übergehen kann. Die Zuordnung zum Labkraut-Buchen-Tannenwald ist auf floristischer Basis nicht mehr ohne weiteres möglich. *Galium rotundifolium* fehlt hier und als wesentliche verbindende Art findet sich nur noch *Thelypteris limbosperma*.

Die Gesellschaft erscheint deutlich thermophiler und noch etwas ozeanischer geprägt als der Rest der Assoziation. Deutlich voneinander abzugrenzen sind hier eine strauchärmere beweidete von einer an Fichtenzugwuchs reicheren unbeweideten Ausbildung.

6. WEISSEGGEN-FICHTENWALD (Tabelle 4)

Auf dem ebenen Grund des Hirschbichttales stockt eine Waldgesellschaft, die eine Mittelstellung zwischen Buchenwäldern, Schneeheide-Kiefernwäldern und Fichtenwäldern einnimmt. In ihrer Baumschicht dominiert die Fichte; recht häufig ist daneben auch die Tanne, und vereinzelt kommt die Waldkiefer vor. Mit gewisser Regelmäßigkeit tritt *Erica herbacea* auf; sie verbindet mit dem Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, der mit dem Weißseggen-Fichtenwald in Kontakt steht, aber im Unterschied zu diesem hängiges Gelände besiedelt. Gemeinsam ist beiden Gesellschaften die betonte Föhnbeeinflussung und das dolomitische Ausgangsgestein, das beim Weißseggen-Fichtenwald allerdings in stärker verwitterter Form vorliegen dürfte. Aus diesem Grund gibt es hier keine oberflächlich anstehenden Felsblöcke. Beide Gesellschaften sind durch zahlreiche Differentialarten mit dem Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald verbunden. Diese Beziehung ist im Falle des Weißseggen-Fichtenwaldes allerdings bereits weniger eng; unter den Differentialarten der Gesellschaft finden sich vielmehr zahlreiche Arten, die zum Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald vermitteln, nämlich *Luzula pilosa*, *Viola biflora* (auch im Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald) sowie die Moose *Rhytidiadelphus loreus* und evt. auch *Ptilium crista-castrensis*, welch letzteres jedoch im Weißseggen-Fichtenwald wesentlich häufiger ist. Standörtlich verbindet beide Gesellschaften ihr Vorkommen im Bereich ebener Talböden, wo der allgemeine Stofftransport verlangsamt ist und damit weder die Basennachlieferung aus dem Boden noch der Abfluß von Wasser und Kaltluft richtig funktionieren. Aus diesem Grund besitzt der Weißseggen-Fichtenwald trotz Dolomituntergrund und Föhnbeeinflussung noch einige Feuchtezeiger.

Arten, die den Weißseggen-Fichtenwald im Gebiet allein kennzeichnen würden, gibt es nur wenige. Enger auf ihn beschränkt sind *Frangula alnus* und *Berberis vulgaris*, die jedoch in St. Bartholomä auch in anderen Gesellschaften vorkommen. Zumindest *Frangula alnus* weist allgemein auf Bodenverarmung hin. Da die Art außerdem immer nur im Bereich von leicht zugänglichen Talböden vorkommt, könnte sie, wie schon erwähnt, auf Streunutzung hinweisen. *Berberis vulgaris* ist dagegen mehr als Weidezeiger anzusprechen. Besonders charakteristisch für den Weißseggen-Fichtenwald sind die azidophilen Moose *Ptilium crista-castrensis* und *Pleurozium schreberi*. Mit relativ hoher Stetigkeit tritt auch die Tanne auf, so daß evt. auch von einem Weißseggen-Fichten-Tannenwald gesprochen werden könnte. Allerdings findet sich die Tanne nicht in allen Unterheiten.

Trotz azidophiler und wohl von der Fichte selbst mitgeprägter Bodenvegetation ist der Fichtenreichtum der Gesellschaft sicher nicht natürlich. Dies beweist der reiche Laubholzunterwuchs innerhalb der Zäune. Hierdurch würde ein Anschluß beim Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald nahegelegt. Die Begünstigung der Fichte ist wohl weitgehend einer intensiven Waldweide zuzuschreiben. Dementsprechend sind die Bestände licht (Bestandesschluß 43 % $\pm$ 6 %) und straucharm. Trotzdem treten, evt. aufgrund schlechter Nährstoffversorgung, in der Krautschicht nicht allzu viele Weidezeiger auf.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 52 $\pm$ 3
davon Gefäßpflanzen: 43 $\pm$ 2

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	5,1 $\pm$ 0,8
pralp:	16 $\pm$ 1
kont:	6,1 $\pm$ 0,3
smed:	13 $\pm$ 1
euras:	22 $\pm$ 1
subatl:	4,1 $\pm$ 0,4
no:	17 $\pm$ 1
arkt:	1,9 $\pm$ 0,2

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	5,43 $\pm$ 0,08 (Halbschatten)
Temperaturzahl:	4,13 $\pm$ 0,06 (kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,74 $\pm$ 0,03 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,19 $\pm$ 0,07 (frisch)
Reaktionszahl:	5,79 $\pm$ 0,09 (schwach bis mäßig sauer)
Stickstoffzahl:	4,20 $\pm$ 0,09 (stickstoffarm bis mäßig stickstoffreich)

Ungewöhnlich niedrig ist hier die Stickstoffzahl. Sie entspricht etwa derjenigen des Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Verglichen

mit den bisher behandelten Waldgesellschaften liegt auch die Reaktionszahl sehr tief; die Böden erscheinen danach nur wenig basischer als die des Labkraut-Buchen-Tannenwaldes. Sehr auffällig ist weiterhin die hohe Kontinentalitätszahl, die wohl auf einer geringen Zahl subatlantischer Arten beruht. Sie wird von keiner anderen bisher genannten Waldgesellschaft erreicht und kann vielleicht mit föhnbedingten starken Temperaturschwankungen, aber auch mit dem geringen Bestandesschluß in Zusammenhang gebracht werden. Letzterer drückt sich auch in einer hohen Lichtzahl aus. Die Feuchtezahl ist trotz des Vorkommens einiger Feuchtezeiger - zweifellos aufgrund des föhnbeeinflussten Klimas und der Durchlässigkeit des dolomitischen Untergrundes - recht niedrig. Auch diese relative Standortstrockenheit ist sicher mitverantwortlich für die hohe Kontinentalitätszahl und erklärt mit den Unterschied zur Cardamine trifolia-Ausbildung des Labkraut-Buchen-Tannenwaldes, die in direktem Kontakt mit dem Weißseggen-Fichtenwald steht, und trotzdem eine sehr niedrige Kontinentalitätszahl besitzt.

Eine recht entfernte Ähnlichkeit mit dem Weißseggen-Fichtenwald Berchtesgadens weist der Weißseggen-Fichten-Tannenwald auf, den ZUKRIGL (1973) am Alpenostrand vorfand. Beide Gesellschaften tendieren etwas zum Schneeheide-Kiefernwald. Die standörtliche Ähnlichkeit beruht vorwiegend auf den klimatischen Faktoren der Meereshöhe, Föhnbeeinflussung und der vor NW-Winden geschützten Lage. Ansonsten besiedelt der Weißseggen-Fichten-Tannenwald, anders als der Weißseggen-Fichtenwald Berchtesgadens, steinige oder felsige Hanglagen im Bereich von Triaskalken.

6.1 Reine Ausbildung

Die Reine Ausbildung entspricht dem Grundtyp der Gesellschaft. Sie steht allgemein unter Weideeinfluß. Die beiden in der Tabelle dargestellten Untereinheiten unterscheiden sich nur in der Intensität der Beweidung.

Als Bodentyp wurden Rendzinen beobachtet, die in ihrer Ausprägung auf engem Raum sehr deutlich variieren. Auf der Aufnahme- und Auswertfläche 404 wurden folgende 2 Profile ergraben:

1. An einer leicht erhöhten, moosreicheren Stelle fand sich eine typische Moderrendzina:

OL	0,5 cm	Streu aus Fichtennadeln und Kräutern
OF	1,5 cm	in Zersetzung begriffene Nadeln, Kräuter und Moose, locker, gut durchwurzelt
(OF)OH	7 cm	stark zersetzter Humus, Strukturen z.T. noch erkennbar, schwarzbraun, locker, krümelig, stark durchwurzelt, ohne deutliche Grenze übergehend in
Ah	0 - 5 cm	schwarzbraun, krümelig, locker bis mäßig dicht, stark durchwurzelt, steinfrei, mit scharfer Grenze zum
Cv	5 - >13 cm	gelblich weißer Dolomitsand mit gerundeten größeren Steinen, m.o.w. wurzelfrei

2. In 2,5 m Abstand davon bei leichter Muldenlage erschien folgende biologisch deutlich aktivere Moderrendzina:

OL	0,5 cm	Streu aus Fichtennadeln und Kräutern
OF	1,5 cm	in Zersetzung begriffene Nadeln, Kräuter und Moose, Regenwurmkot, gut durchwurzelt
(OF)OH	8 cm	stark zersetzter Humus, Pflanzenreste z.T. noch erkennbar, schwarzbraun, locker, krümelig, mit Regenwürmern, stark durchwurzelt
Ah	0 - 8 cm	von Dolomitsand durchsetzter Humus, dunkel graubraun, locker bis mäßig dicht, krümelig, stark durchwurzelt, ohne scharfe Grenze übergehend in

AhCv	8 - 18 cm	hellgelber Dolomitgrus mit fleckenweise eingearbeitetem Humus, mäßig dicht, mäßig durchwurzelt
Cv	> 18 cm	gelblich weißer Dolomitsand und -grus mit vielen größeren gerundeten Steinen, schwach durchwurzelt

6.2 Deschampsia-Ausbildung

An lehmreicheren Stellen - im Gelände allerdings nur schwer abgrenzbar - tritt eine etwas feuchtere Ausbildung mit Tanne, *Salvia glutinosa*, *Deschampsia caespitosa*, *Aegopodium podagraria* und den Moosen *Plagiomnium undulatum* und *Lophocolea bidentata* auf. Alle Aufnahmen der Ausbildung sind außerdem durch Weidezeiger gekennzeichnet.

Im Bereich der Aufnahme 775 wurde folgende Lehmrendzina festgestellt:

OL	0,5 cm	abgestorbene Gräser
OF	1,5 cm	verrottende Gräser und Holzstückchen, stark durchwurzelt
OFOH	9 cm	stark zersetzter Humus, Strukturen z.T. noch erkennbar, schwarzbraun, locker, krümelig, stark durchwurzelt
OH	3 cm	schwarzbrauner Humus, locker bis mäßig dicht, krümelig, steinfrei, stark durchwurzelt
AhBv	0 - 6 cm	graubrauner schluffiger Lehm mit 10 % Dolomitsteinchen, humushaltig, locker bis mäßig dicht, krümelig, mäßig durchwurzelt, mit scharfer Grenze zum
Cv	6 - >16 cm	gelblich weißer Dolomitsand und -grus, wenige größere, kaum gerundete Steine, nicht durchwurzelt

6.3 Angelica-Ausbildung

Die Angelica-Ausbildung entwickelt sich dort, wo durch Zäunungen der Weideeinfluß zurückgedrängt wird. Die Ausbildung zeichnet sich v.a. durch ihren Reichtum an Laubholz- und Tannenjungwuchs aus und hat deshalb physiognomisch nicht mehr viel mit den Beständen außerhalb der Umzäunungen gemein. Die Gesamtartenzahl ist - zweifellos bedingt durch die stärkere Konkurrenz der Gehölze um Licht, Wasser und Nährstoffe - innerhalb der Umzäunungen mit 41 ± 2 wesentlich geringer als außerhalb, wo im Durchschnitt 56 ± 2 Arten gezählt wurden. Völlig unterbunden ist die Beweidung im übrigen auch innerhalb der Zäune nicht, wie die Aufnahme 507 zeigt.

7. ALPENLATTICH-FICHTENWALD (Homogyno-Piceetum) (Tabelle 10)

Nordöstlich der Kühroint-Alm stehen m.o.w. stark saure Juragesteine an, deren Vegetation sich grundlegend von der des umgebenden Kalkgesteins unterscheidet. Im hochmontanen Bereich bei durchschnittlich 1410 m Meereshöhe finden sich dort auf ehemaligem Almgelände typische bodensaure Fichtenwälder, die auch von LIPPERT aufgenommen und als *Plagiothecium undulatum*-*Sphagnum acutifolium*-Fichtenwald bezeichnet wurden. Ihre Artenzusammensetzung unterscheidet sich v.a. negativ durch das Fehlen sehr vieler Arten von der des umgebenden Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Allgemein charakteristisch sind für den Alpenlattich-Fichtenwald des Gebiets *Dryopteris austriaca* s.str., *Thelypteris limbosperma* und die Moose *Polytrichum formosum* und *Rhythidiadelphus loreus*. In unterschiedlichen Mengen ist fast immer auch *Blechnum spicant* als Zeiger für silikatreiche saure Substrate vorhanden. Diese Arten besitzen hier ein Verbreitungsoptimum, sind jedoch u.a. auch für den Labkraut-Buchen-Tannenwald typisch. Stärker auf den Alpenlattich-Fichtenwald konzentriert bzw. (mit Ausnahme des in engem Kontakt stehenden Braunseggensumpfes) nur hier vorhanden sind v.a. *Athyrium distentifolium* sowie die Moose *Sphagnum nemoreum*, *Polytrichum commune* und *Plagiothecium undulatum*.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 29 +- 2
davon Gefäßpflanzen: 20 +- 2

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	3,3 +- 0,4
pralp:	10,5 +- 0,8
kont:	2,4 +- 0,2
smed:	2,0 +- 0,5
euras:	7,3 +- 0,9
subatl:	2,7 +- 0,4
no:	9,3 +- 0,9
arkt:	2,4 +- 0,2

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	4,77 +- 0,08 (Halbschatten)
Temperaturzahl:	3,31 +- 0,04 (kühl)
Kontinentalitätszahl:	3,43 +- 0,04 (ozeanisch bis subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,88 +- 0,06 (frisch bis feucht)
Reaktionszahl:	3,9 +- 0,1 (mäßig sauer bis sauer)
Stickstoffzahl:	4,7 +- 0,1 (mäßig stickstoffreich)

Interessant ist hier v.a. die Reaktionszahl, die den niedrigsten Wert aller aufgenommenen Pflanzengesellschaften des Gebiets aufweist. Niedrig ist auch die Temperaturzahl; sie entspricht derjenigen des im Kontakt stehenden, ebenfalls hochmontan verbreiteten Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Die standörtliche Ungunst, die sich in den Werten von Reaktions- und Temperaturzahl ausdrückt, ist zweifellos auch Ursache für die ungewöhnlich niedrige Gesamtartenzahl, die auch fast alle Geoelemente betrifft. Nur das arktische Element ist relativ zahlreich vertreten. Prozentual sind allerdings typischerweise auch präalpine und nordische Arten reichlich vorhanden. Extrem gering ist naturgemäß der Anteil submediterraneaner Arten.

Bei der Ermittlung der Zeigerwerte und der Geoelementbeteiligung fällt hier übrigens in besonderem Maße die Tatsache ins Gewicht, daß die Moose, für die hier keine Angaben vorliegen, nicht in die Berechnung mit eingingen. Gerade die Moose besitzen jedoch im Alpenlattich-Fichtenwald einen besonders hohen Anteil an der Artenkombination.

Gebietsvergleich

Das hier beschriebene Homogyno-Piceetum ähnelt dem Schweizer Piceetum subalpinum KUOCHS (1954) recht stark; beide Gesellschaften gehören sicher ein und derselben Assoziation an. Allerdings weisen dort Rhododendron ferrugineum, Equisetum sylvaticum, Calluna vulgaris und größere Mengen Vaccinium vitis-idaea auf stärkere Lichtstellung hin. Noch deutlicher unterscheidet sich ZUKRIGLS (1973) Homogyno-Piceetum vom Alpenostrand. Der besonderen geographischen Lage dürften hier v.a. Luzula luzuloides und Soldanella hungarica ihr Vorkommen verdanken. Auf stärkere

Auflichtungen dürfte auch hier wieder *Vaccinium vitis-idaea* hindeuten, daneben aber auch *Deschampsia flexuosa*, *Cetraria islandica* und v.a. Arten der Borstgrasrasen wie *Campanula barbata*, *Carex pilulifera* u.a.. Besonders häufig sind am Alpenostrand noch weitere Arten allgemein saurer, nährstoffarmer Böden wie *Pleurozium schreberi*, *Ptilidium ciliare* und *Melampyrum pratense*. Die Standorte dieses Homogyno-Piceetum erscheinen somit noch deutlich ärmer und wohl auch trockener als in Berchtesgaden. Die hier angetroffenen Bestände lassen sich damit am ehesten mit der etwas feuchteren Subassoziation *luzuletosum sylvaticae* ZUKRIGLs vergleichen, die auch von *Athyrium distentifolium* dominierte Bestände einschließt, wie sie in Berchtesgaden vorkommen.

7.1 Rippenfarn-Alpenlattich-Fichtenwald

Diese Subassoziation ist charakteristisch für ärmere, etwas trockenere Standorte. Differentialarten sind der Rippenfarn selbst und die Moose *Sphagnum nemoreum*, *Dicranum scoparium*, *Polytrichum commune* und *Hylocomium splendens*.

7.1.1 Bazzania-Ausbildung

Die Bazzania-Ausbildung besiedelt die ärmsten Standorte im Bereich des Alpenlattich-Fichtenwaldes. Ausgangsgestein ist Radiolarit. Die Physiognomie der Bodenvegetation wird durch *Vaccinium myrtillus* und *Polytrichum formosum* bestimmt. Diese bilden hier ausgesprochen eintönige Bestände, die im schärfsten Gegensatz zur umgebenden Kalkgesteinsvegetation stehen. Der Übergang erfolgt an der geologischen Grenze schlagartig.

Differentialarten der Bazzania-Ausbildung sind *Calamagrostis villosa*, die an Verlichtungen bestandesbildend auftritt, *Vaccinium vitis-idaea* und die Moose *Bazzania trilobata* und *Pleurozium schreberi*.

Die Armut der Standorte findet ihren Niederschlag in der geringen Artenzahl von 22 ± 1 sowie der niedrigen Stickstoff- ($4,1 \pm 0,2$) und Reaktionszahl ($3,2 \pm 0,1$).

Die Böden im Bereich der Bazzania-Ausbildung dürften angesichts der hohen Niederschläge durchweg m.o.w. starke Podsolierungserscheinungen aufweisen. Im Bereich der Aufnahme 259 wurde entsprechend folgendes Profil gefunden:

OL		undeutlich entwickelt
OF	3 cm	mäßig zersetzte Moosbestandteile, rotbraun bis weißlich, locker, stark durchwurzelt
OH	2 cm	rot- bis schwarzbrauner, stark zersetzter Humus, torfig, locker bis mäßig dicht, stark durchwurzelt
Ae	0 - 2 cm	hellgrauer schluffiger Sand, 50 % kleine Steinchen, dicht, Einzelkorngefüge, kaum durchwurzelt
Bs	2 - 6 cm	dunkel rotbrauner, stark steiniger Sand, dicht, Einzelkorngefüge, kaum durchwurzelt
Bv	6 - >25 cm	hellbrauner, stark steiniger Sand, dicht, Einzelkorngefüge, kaum durchwurzelt

Trotz der Armut der Vegetation fehlen Weideeinflüsse nicht völlig. Als einziger Weidezeiger tritt hier *Nardus stricta* auf.

7.1.2 Plagiothecium undulatum-Ausbildung

Diese wenig verbreitete Einheit ähnelt noch weitgehend der vorausgehenden, scheint jedoch etwas nährstoffreichere und feuchtere Standorte zu besiedeln. Sie leitet damit zum Frauenfarn-Alpenlattich-Fichtenwald über.

7.1.3 Anemone-Ausbildung

Wo einzelne oberflächliche Kalkblöcke auf höheren Basengehalt des Bodens hinweisen, nimmt die Artenzahl des Alpenlattich-Fichtenwaldes sofort stark zu; die mittlere Artenzahl der hier entwickelten Anemone-Ausbildung beträgt 40 ± 4 . Besonders reichlich vertreten ist *Thelypteris limbosperma*. Der Alpenlattich-Fichtenwald leitet hier mit zahlreichen Arten zum Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald über. Dies drückt sich auch in einer relativ hohen Reaktionszahl von $4,5 \pm 0,2$ aus.

Auch die Anemone-Ausbildung steht stellenweise unter einem gewissen Weideeinfluß. Als Weidezeiger wurden hier allerdings nur *Nardus stricta* und *Hypericum maculatum* gefunden.

7.2 Frauenfarn-Alpenlattich-Fichtenwald

An feuchten und basenreichen, wenn auch nicht allzu kalkreichen Standorten tritt eine sehr hochstauden- und insbesondere farnreiche Subassoziation des Alpenlattich-Fichtenwaldes auf. Sie ist gekennzeichnet durch *Athyrium distentifolium*, der hier teilweise fast mannshohe, dichte Bestände bildet, *Veratrum album*, *Streptopus amplexifolius*, *Cicerbita alpina* sowie die Moose *Plagiothecium undulatum* und *Rhizomnium punctatum*. M.o.w. reichlich vertreten ist auch *Thelypteris limbosperma*.

Als Ausgangsgestein kommen Mergel und Kiesel- bzw. Hornsteinkalke des Lias in Frage.

Die Subassoziation wurde in eine Reine und in eine Anemone-Ausbildung untergliedert. Erstere besiedelt offenbar die kalkärmeren Standorte. Der Alpen-Frauenfarn dominiert hier grundsätzlich; in der Anemone-Ausbildung kann dagegen auch *Thelypteris limbosperma* überwiegen. Diese Ausbildung ist durch *Adenostyles alliariae*, *Anemone nemorosa*, *Solidago virgaurea*, *Luzula luzulina* und *Lysimachia nemorum* gekennzeichnet. Diese Arten treten auch in der Anemone-Ausbildung des Rippenfarn-Alpenlattich-Fichtenwaldes auf und weisen dort auf stärkere Kalkbeeinflussung der Standorte hin.

Im Bereich des Frauenfarn-Alpenlattich-Fichtenwaldes wurde nur die Anemone-Ausbildung auch in beweideter Form erfaßt.

8. KARBONAT-FICHTENWÄLDER (*Asplenio-Piceetum*) (Tabelle 11)

Bodensaure Fichtenwälder entwickelten sich im Gebiet nicht nur auf saurem Ausgangsgestein. Unter bestimmten Umständen bilden sich vielmehr auch auf Karbonatgestein ausgesprochen saure Böden mit azidophiler, an Fichtenwaldarten reicher Vegetation. Sauer ist hier freilich nur die Humusauflage; der Basenreichtum des Ausgangsgesteins macht sich nämlich ebenfalls noch sehr deutlich bemerkbar. Er trägt zur Entwicklung eines Vegetationstyps bei, der mit demjenigen des silikatbesiedelnden Alpenlattich-Fichtenwaldes kaum etwas gemein hat. Unterschiede äußern sich dabei nicht nur darin, daß in die insgesamt azidophile Vegetationsdecke der Karbonat-Fichtenwälder m.o.w. mosaikartig auch zahlreiche basenliebende Pflanzen eingestreut sind; es gehören vielmehr auch die vorkommenden Säurezeiger meist anderen Arten an. Typisch für Karbonat-Fichtenwälder ist z.B. v.a. *Vaccinium vitis-idaea*, während die Silikat-Fichtenwälder v.a. durch *Blechnum spicant* charakterisiert sind. Ein wesentliches Kennzeichen der Standorte der Karbonat-Fichtenwälder dürfte ihre größere Trockenheit sein, die auf den geringeren Feinerdegehalt der Böden und die größere Durchlässigkeit des Untergrundes zurückzuführen ist. Dazu kommt ferner, daß sich stärkere Humusauflagen auf Kalk bevorzugt erst unter einem trockeneren Lokalklima auszubilden scheinen.

Diese Trockenheit ist sicher dafür verantwortlich, daß hier auch verschiedene Arten der Schneeheide-Kiefernwälder regelmäßig vertreten sind. Wichtig sind dabei v.a. *Erica herbacea* selbst und *Polygala chamaebuxus*. Auf eine nähere Verwandtschaft zum Schneeheide-Alpenrosenbusch weisen *Sorbus chamaemespilus* und der sporadisch vorkommende *Rhododendron hirsutum* hin.

Unter den Differentialarten der Karbonat-Fichtenwälder spielen v.a. Moose modriger Substrate eine große Rolle. Hierzu gehören *Bazzania tricenata*, *Bazzania trilobata*, *Pleurozium schreberi*, *Tritomaria quinque-dentata*, *Mylia taylori*, *Dicranodontium denudatum*, *Calypogeia neesiana* und *Tetraphis pellucida*. Charakteristische Gefäßpflanzen sind neben der schon genannten Preiselbeere *Lycopodium annotinum*, *Calamagrostis villosa*, *Listera cordata*, *Lonicera caerulea* und *Betula pubescens*.

Einige wenige dieser Arten kommen im übrigen auch im Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald häufiger vor, der ähnlich grobblockige Standorte besiedelt wie ein Teil der Karbonat-Fichtenwälder, jedoch wesentlich weniger azidophil geprägt ist.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 55 +- 2

davon Gefäßpflanzen: 37 +- 2

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	8,2 +- 0,8
pralp:	21 +- 1
kont:	4,8 +- 0,2
smed:	4,3 +- 0,4
euras:	10,9 +- 0,7
subatl:	1,7 +- 0,3
no:	15,5 +- 0,8
arkt:	2,7 +- 0,3

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	5,35 +- 0,08 (Halbschatten)
Temperaturzahl:	3,37 +- 0,05 (kühl)
Kontinentalitätszahl:	3,74 +- 0,02 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,25 +- 0,05 (frisch)
Reaktionszahl:	5,16 +- 0,07 (mäßig sauer)
Stickstoffzahl:	3,93 +- 0,08 (stickstoffarm bis mäßig stickstoffreich)

Man sieht, daß die Gesamtartenzahl diejenige des Alpenlattich-Fichtenwaldes fast um das Doppelte übertrifft. Die Gültigkeit von Zeigerwerten und Geoelementanteilen leidet auch hier wieder darunter, daß die Moose und sonstigen Thallophyten nicht berücksichtigt sind, die mit durchschnittlich 17 +- 1 Arten (maximal 34) hier wieder einen besonders hohen Anteil an der Artenkombination einnehmen. Interessant ist trotzdem die ungewöhnlich hohe Kontinentalitätszahl. Sie steht mit einer relativ hohen Zahl kontinentaler und einer extrem niedrigen Zahl subatlantischer Arten in Zusammenhang und beruht wohl einerseits auf der vergleichsweise Standortstrockenheit. Diese drückt sich in einer Feuchtezahl aus, die deutlich unter derjenigen des auf tonig verwitterndem Gestein vorkommenden Alpenlattich-Fichtenwaldes liegt. Zum anderen deutet die recht hohe Lichtzahl ein ausgeprägtes Strahlungsklima an. Die Reaktionszahl

liegt erwartungsgemäß zwischen derjenigen des Alpenlattich-Fichtenwaldes und der des Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Charakteristisch ist v.a. die große Standardabweichung innerhalb einer Aufnahme. Sie beträgt hier $2,41 \pm 0,03$ (gegenüber $1,68 \pm 0,07$ beim Alpenlattich-Fichtenwald) und weist auf den Mosaikcharakter der Vegetation hin. Die schlechte Streuzersetzung wird neben der Reaktionszahl auch aus der vergleichsweise extrem niedrigen Stickstoffzahl ersichtlich.

8.1 Block-Fichtenwald

Der typische Block-Fichtenwald besiedelt grobblockiges Bergsturzmaterial in der relativ geringen Meereshöhe von im Mittel $1050 \text{ m} \pm 40 \text{ m}$. Er ähnelt darin dem Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald. Verschiedene Faktoren mögen im Falle des Block-Fichtenwaldes zur vermehrten Akkumulation von Tangelhumus führen. Es könnte z.B. ein größerer Durchmesser der Blöcke eine Rolle spielen, der auch extremere Lebensbedingungen für die felsbesiedelnden Organismen mit sich bringt. Ein ausgeprägteres Hohlraumssystem, in dem sich Kaltluft und Eis ansammeln, kann des weiteren die Temperatur des Standorts absenken. Auch lokale Kaltluftströme und Frostlocheffekte können hierbei eine Rolle spielen. Ganz allgemein ist auf extremen Blockschuttstandorten auch mit stärkeren Schneeansammlungen zwischen den Blöcken zu rechnen, wodurch ebenfalls das Wärmeklima negativ beeinflusst wird.

In der Karte wurde der Block-Fichtenwald dem Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald zugeordnet. Er kommt nur selten und nirgends in größerer Ausdehnung vor und seine floristische Abgrenzung von den übrigen Karbonat-Fichtenwäldern bereitete zunächst Schwierigkeiten.

8.2 Karbonat-Fichtenwald, *Luzula sylvatica*-Ausbildung

Diese Gesellschaft kommt in typischer Form an den westlichen Hängen des Hocheiskopfes im Kontakt mit dem Schneeheide-Alpenrosenbusch vor. Die Neigung der Hänge ist dort mit etwa 20 Grad recht gering. Schwach geneigte Schichten anstehenden Dachsteinkalks bedingen dabei teilweise eine terrassenartige Gliederung des Geländes. Mitunter bilden sich auf den Schichtflächen relativ großflächig einheitliche Zwergstrauchgesellschaften als Bodenvegetation. Meist ist das Gestein jedoch m.o.w. zerklüftet und von Karren zerfurcht, so daß es auch hier zur Bildung eines ausgeprägten Mosaiks aus sauren und basenreichen Kleinstandorten kommt. Recht häufig ist die Gesellschaft neben dem Hocheiskopf auch in der Röth, wo sie relativ kleinflächige Felsrippen besiedelt, die die hochstaudenreichen Mulden überragen. Typische Blockschuttstandorte mit oberflächlicher, von Hohlraumssystemen durchzogener Felsüberrollung fehlen dagegen.

Die mittlere Meereshöhe beträgt 1450 m $\pm$ 30 m und liegt damit wesentlich über derjenigen des Block-Fichtenwaldes. Von diesem differenzieren aus diesem Grund einerseits Arten der höheren Lagen wie *Luzula sylvatica*, *Geranium sylvaticum*, *Gentiana pannonica* und *Adenostyles alliariae*. Dazu kommen andererseits auch lichtliebende Arten wie *Campanula scheuchzeri*, *Aster bellidiastrum* und *Ranunculus nemorosus*. Auf eine besondere Beziehung zum Schneeheide-Alpenrosenbusch weist *Sorbus chamaemespilus* hin. Auf zoologischem Gebiet ist evt. der Ameisenreichtum der Gesellschaft von Interesse.

Für die Hemmung der Streuzersetzung könnten im Bereich der *Luzula sylvatica*-Ausbildung des Karbonat-Fichtenwaldes folgende Ursachen von Bedeutung sein:

- das kühle und schneereiche Hochlagenklima
- eine stärkere Föhnbeeinflussung, die v.a. das Vorkommen am Hocheiskopf betrifft. Durch die Austrocknung der Humusaufgabe in Föhnperioden könnte hierbei das Bodenleben geschädigt werden.
- die geringe Hangneigung und der mechanisch sehr stabile anstehende Dachsteinkalk, die eine Basennachlieferung durch bewegten Hangschutt weitgehend ausschließen

Die *Luzula sylvatica*-Ausbildung des Karbonat-Fichtenwaldes entspricht ungefähr dem für Plateaulagen typischen Subalpinen Karbonat-Fichtenwald mit Heidelbeere (*Adenostylo glabrae* Piceetum subalpinum myrtilletosum) nach H. MAYER 1974 bzw. der *Luzula sylvatica*-Ausbildung des Krautreichen Subalpinen Hangfichtenwaldes nach H. MAYER (1959). Sie wurde an gleicher Stelle von LIPPERT (1966) aufgenommen und als *Vaccinium vitis-idaea*-Ausbildung des Piceetum montanum bezeichnet. Eine genaue Entsprechung findet sich weder bei KUOCH (1954) noch bei ZUKRIGL (1973). Die subalpinen Kalkfichtenwälder ZUKRIGLs sind, da auf Hangschutt verbreitet, insgesamt deutlich weniger azidophil; nur die stärker saure Subassoziation *luzuletosum sylvaticae* des *Adenostylo glabrae*-Piceetum (subalpinum) ähnelt etwas der *Luzula sylvatica*-Ausbildung des Karbonat-Fichtenwaldes in Berchtesgaden, noch mehr allerdings der Reinen *Lycopodium*-Ausbildung des Schneeheide-Alpenrosenbusches.

Die Gesellschaft kann in eine beweidete und in eine Normalform weiter untergliedert werden. Diese beiden Einheiten unterscheiden sich auch in ihrer Höhenlage, wobei die beweidete Form die höhergelegenen Bereiche einnimmt. Als Weidezeiger saurer Substrate ist hier *Nardus stricta* von Bedeutung. Die Bestände der beweideten Ausbildung sind wie üblich lichter. Deshalb tritt auch *Rhododendron hirsutum* hier häufiger auf. Nicht selten dringen hier auch bereits einzelne Latschenbüsche ein. In der Baumschicht der beweideten Ausbildung spielt die Lärche eine größere Rolle; sie kommt im Deckungsgrad der Fichte fast gleich. Vereinzelte Exemplare der Zirbe deuten außerdem eine Verwandtschaft mit Lärchen-Zirbenwäldern an.

9. SCHNEEHEIDE-ALPENROSENBUSCH (Erico-Rhododendretum) (Tabelle 11)

Alpenrosenreiche Zwergstrauchgesellschaften und Latschen-Buschwälder treten an flachgründigen, felsigen Extremstandorten v.a. höherer Lagen auf. Auf instabilen Blockschutthalde und Lawinenbahnen dringen Latschenbestände auch bis in Tallagen vor. Bestände der Hochlagen sind dabei wesentlich azidophiler geprägt als die der Tieflagen.

9.1 Lycopodium-Ausbildung

Die azidophile Hochlagen-Ausbildung des Schneeheide-Alpenrosenbusches teilt ihre Differentialarten weitgehend mit den Karbonat-Fichtenwäldern. Das Substrat der Ausbildung wird von Kalkgestein gebildet.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 56 +- 6
davon Gefäßpflanzen: 39 +- 5

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	11 +- 2
pralp:	20 +- 3
kont:	4,1 +- 0,5
smed:	4 +- 1
euras:	11 +- 2
subatl:	2,5 +- 0,7
no:	14 +- 2
arkt:	3,7 +- 0,5

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	5,60 +- 0,09 (Halbschatten bis Halblucht)
Temperaturzahl:	3,23 +- 0,06 (kühl)
Kontinentalitätszahl:	3,84 +- 0,06 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,28 +- 0,08 (frisch)
Reaktionszahl:	5,2 +- 0,3 (mäßig sauer)
Stickstoffzahl:	4,0 +- 0,2 (stickstoffarm bis mäßig stickstoffreich)

Diese Werte entsprechen ungefähr denen der Karbonat-Fichtenwälder. Die Lichtzahl ist jedoch, bedingt durch die lichtere bzw. fehlende Baumschicht, höher. Sehr niedrig ist die Temperaturzahl und entsprechend hoch die Zahl arktischer Arten. Dies ist ein Ausdruck der subalpinen Höhenlage in durchschnittlich 1550 m $\pm$ 40 m. Die Kontinentalitätszahl ist - im Widerspruch zur entsprechenden Zahl der Geoelemente - noch etwas höher als im Bereich der Karbonat-Fichtenwälder. Reaktions- und Stickstoffzahl variieren von Einheit zu Einheit ziemlich stark.

9.1.1 Reine Lycopodium-Ausbildung

Diese Gesellschaft wurde v.a. im Bereich der Hoch-Alm erfaßt. Sie ähnelt etwas dem Karbonat-Fichtenwald mit *Luzula sylvatica*. Die Fichte fehlt jedoch weitgehend und nur die Lärche bildet noch einen lockeren Baumbestand. Damit ist der Lichtgenuß der Bodenvegetation erhöht, an der deshalb auch *Rhododendron hirsutum* stärkeren Anteil hat. Als wesentliches Unterscheidungskriterium gegenüber dem Karbonat-Fichtenwald mit *Luzula sylvatica* dient v.a. eine Gruppe von meist feuchtigkeits- bzw. nährstoffliebenden Arten. Ein Teil dieser Arten entstammt dem Bereich subalpiner Hochstaudenfluren und differenziert auch den Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald. Die Artengruppe besteht aus *Paris quadrifolia*, *Dryopteris filix-mas*, *Epilobium montanum*, *Poa nemoralis*, *Saxifraga rotundifolia*, *Alchemilla vulgaris*, *Viola biflora*, *Myosotis sylvatica*, *Ptilium crista-castrensis* und *Dentaria enneaphyllos*, welch letztere auch die Tieflagenausbildung des Schneeheide-Alpenrosenbusches kennzeichnet. Aufgrund der hohen Standortsfeuchtigkeit fehlt der Gesellschaft die namentgebende Schneeheide weitgehend.

Ursache der guten Wasserversorgung ist sicher einerseits das Vorkommen an schattigen, föhngeschützten und zweifellos schneereichen Nordhängen und zum anderen ein hoher Feinerdegehalt der Böden, an deren Bildung vielfach silikatreiche Liaskalke Anteil haben.

Pflanzensoziologisch-systematisch und ökologisch tendiert die Gesellschaft sicher etwas in Richtung des zentralalpinen bodensaurer Alpenrosengebüschs mit *Rhododendron ferrugineum*, der hier jedoch fehlt. Zwei Aufnahmen, die unterhalb der Mooswand im Priesberg-Gebiet erhalten wurden, könnten auch als subalpiner Blockfichtenwald betrachtet werden.

Eine Ausbildung mit Grünerle, die neben die normale Ausbildung ge-

stellt wurde, könnte evt. z.T. auch zum Grünerlenbusch (s.u.) gerechnet werden. Größere floristische Ähnlichkeit besteht jedoch mit der *Lycopodium*-Ausbildung des Alpenrosen-Latschenbusches. Die Grünerle erscheint im Mittel an etwas flacheren Hängen bei nördlicher Exposition und mag auf einen besonderen Schneereichtum der Standorte hindeuten.

Eine der Reinen *Lycopodium*-Ausbildung recht ähnliche Artenkombination weist, wie schon erwähnt, die Subassoziation *luzuletosum sylvaticae* von ZUKRIGLs (1973) *Adenostylo glabrae-Piceetum* (subalpinum) auf; diese besitzt einen Großteil der eben genannten Differentialarten.

9.1.2 *Lycopodium*-Ausbildung mit *Pinus mugo*

Latschenbestände wurden im Untersuchungsgebiet nur in geringer Ausdehnung angetroffen. Deshalb ist auch die Aufnahmezahl vergleichsweise gering und die Untergliederung in verschiedene Ausbildungen unterblieb weitgehend. Die erhaltenen Aufnahmen unterscheiden sich freilich recht stark in ihrer Artenzahl und dem Grad der Prägung durch das basenreiche Ausgangsgestein. Die üblichen Felsbesiedler finden sich dabei in keinem Fall mehr in nennenswertem Umfang. In einem besonders humussaueren Bestand am Kederbichl trat als interessantes Moos *Anastrepta orcadensis* in größeren Mengen auf.

Die *Lycopodium*-Ausbildung mit *Pinus mugo* stellt die Hochlagenform der Latschengebüsche dar und findet sich im Bereich der Waldgrenze, wo Bäume aus klimatischen Gründen kaum mehr konkurrenzfähig sind und Wälder deshalb auch nach anthropogenen Schädigungen häufig durch Latschengebüsche ersetzt werden.

9.2 Amelanchier-Ausbildung

Die Amelanchier-Ausbildung unterscheidet sich grundlegend von den gerade beschriebenen Hochlagen-Ausbildungen. Sie besiedelt tiefere Lagen in durchschnittlich 1140 m $\pm$ 40 m und kommt hier auf erosionsanfälligen, oft felsigen Dolomitstandorten vor. Sie steht in Kontakt mit dem Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald und bildet vielfach auch wohl nur alpenrosenreiche Ausbildungen dieser Gesellschaft.

Vertreter der im Gebiet saure Humusaufgaben anzeigenden Lycopodium-Gruppe kommen in der Amelanchier-Ausbildung kaum vor. An ihrer Stelle findet sich eine Gruppe von teils basiphilen und m.o.w. wärmeliebenden Arten. Es sind dies *Fagus sylvatica*, *Potentilla erecta*, *Melampyrum sylvaticum*, *Adenostyles glabra*, *Mercurialis perennis*, *Amelanchier ovalis* und *Hepatica nobilis*. Mit der Reinen Lycopodium-Ausbildung gemeinsam ist *Dentaria enneaphyllos*.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 47 +- 5
davon Gefäßpflanzen: 40 +- 4

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	8 +- 1
pralp:	20 +- 2
kont:	4,3 +- 0,4
smed:	9,5 +- 0,7
euras:	12 +- 2
subatl:	4,8 +- 0,6
no:	13 +- 2
arkt:	1,9 +- 0,4

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	5,37 +- 0,08 (Halbschatten)
Temperaturzahl:	3,92 +- 0,08 (kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,76 +- 0,05 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,0 +- 0,1 (frisch)
Reaktionszahl:	6,3 +- 0,2 (schwach bis mäßig sauer)
Stickstoffzahl:	4,0 +- 0,1 (stickstoffarm bis mäßig stickstoffreich)

Erwartungsgemäß sind hier v.a. Temperatur- und Reaktionszahl sowie die Zahl submediterranean Arten höher als diejenigen der Lycopodium-Ausbildung des Schneeheide-Alpenrosenbusches. Hingegen unterscheiden sich sämtliche Zahlenwerte nur wenig von denjenigen des Schneeheide-Hainlat-

tich-Tannen-Buchenwaldes. Reaktions- und Stickstoffzahl liegen allerdings charakteristischerweise etwas tiefer. Die hohe Kontinentalitätszahl dürfte wieder in Beziehung zur Standortstrockenheit stehen.

9.2.1 Reine Amelanchier-Ausbildung

Diese Ausbildung könnte evt. noch als Untereinheit des Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes aufgefaßt werden. Sie entspricht weitgehend der Rhododendron-Ausbildung des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes bei THIELE (1978). Im Bereich dieser Gesellschaft breiten sich an lichter Stellen (Deckungsgrad der Baumschicht 24 % $\pm$ 8 %) Herden von Rhododendron hirsutum aus, dem sich häufig noch Sorbus chaemespilus als Charakterart des Schneeheide-Alpenrosenbusches anschließt. Die Gesellschaft ist meistens von Buchenjungwuchs überstanden und dürfte sich wohl zum normalen Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald weiterentwickeln.

Neben der Normalform der Reinen Ausbildung kann auch eine Form mit Blechnum spicant und Thelypteris limbosperma unterschieden werden. Sie besitzt eine lockere Baumschicht aus Buche und entspricht der Polystichum-Ausbildung des Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes mit Blechnum. Wie diese dürfte sie z.T. auf Terrae fuscae hinweisen. Eine kartenmäßige Darstellung war jedoch nicht sinnvoll.

9.2.2 Amelanchier-Ausbildung mit Pinus mugo

Latschenbestände besiedeln in den Tieflagen stark felsige Geländepartien im Dolomitbereich, aber auch gering gefestigte Schuttreißen aus Dachsteinkalk. In beiden Fällen läßt zum einen die geringe Stabilität des geologischen Ausgangsmaterials keine Weiterentwicklung des Latschenbusches zu. Zum anderen bilden steile Schuttfächer meist auch Lawenstriche, die höchstens der größerem Schneedruck widerstehenden Latsche einen Lebensraum bieten können.

9.2.3 Amelanchier-Ausbildung mit Calluna

Diese Gesellschaft wurde nur einmal erfaßt. Sie besiedelte den Standort eines abgestorbenen Latschenbestandes. Im Charakter ähnelt sie einer bodensauren Zwergstrauchheide. Wenig baumbestandene, relativ trockene, bodensaure und zwergstrauchreiche Vegetationsbestände wurden bei der Kartierung mitunter dieser Gesellschaft zugeordnet, auch wenn die Artenkombination nicht ganz dem Grundtyp entsprach.

10. HOCHMONTAN-SUBALPINE HOCHSTAUDENFLUREN UND -GEBÜSCHE (Tabelle 12)

10.1 ALPENDOSTFLUR (*Adenostylo-Cicerbitetum*)

Die Physiognomie der Alpendostflur wird durch hochwüchsige, großblättrige Stauden bestimmt. Dominierend ist meist *Adenostyles alliariae*. Charakter- und Differentialarten der Gesellschaft sind ähnlich wie beim Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald die Arten der *Saxifraga rotundifolia*-Gruppe.

Die Alpendostflur besitzt ihre Hauptverbreitung im subalpinen Bereich. Erfaßt wurden jedoch im Rahmen der vorliegenden Arbeit v.a. Bestände etwas tieferer Lagen im hochmontanen Bereich (mittlere Meereshöhe 1370 m $\pm$ 20 m). Die Gesellschaft steht hier noch in ziemlich intensivem Kontakt mit dem Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald. Sie besiedelt meist feuchtere Mulden oder auch trockenfallende Bachbetten. Ein m.o.w. hoher Lehmgehalt des Bodens sorgt außerdem für gute Nährstoffversorgung. Von den feuchten Ausbildungen des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes ist sie nicht immer ohne Schwierigkeiten abzugrenzen.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 55 +- 4

davon Gefäßpflanzen: 43 +- 3

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	11	+- 2
pralp:	22	+- 1
kont:	2,8	+- 0,2
smed:	6	+- 1
euras:	15	+- 1
subatl:	4,6	+- 0,8
no:	17	+- 1
arkt:	3,4	+- 0,5

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	5,6	+- 0,1	(Halbschatten bis Halblicht)
Temperaturzahl:	3,37	+- 0,08	(kühl)
Kontinentalitätszahl:	3,64	+- 0,03	(subozeanisch)
Feuchtezahl:	6,05	+- 0,07	(frisch bis feucht)
Reaktionszahl:	6,51	+- 0,06	(schwach sauer bis schwach basisch)
Stickstoffzahl:	5,6	+- 0,2	(mäßig stickstoffreich bis stickstoffreich)

Die relativ hohe Lichtzahl weist hier auf den waldfreien Charakter der Gesellschaft hin. Die Temperaturzahl und die Zahl submediterraner Arten ist dem Hochlagenstandort entsprechend niedrig. Erwartungsgemäß hoch sind Feuchte- und Stickstoffzahl.

10.1.1 Petasites-Ausbildung

Diese Ausbildung ist der Saxifraga-Ausbildung mit *Stellaria nemorum* des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes nahe verwandt. Als floristisches Unterscheidungsmerkmal wurde hier v.a. das Fehlen von Felsbesiedlern herangezogen; baumfreie Gesellschaften entwickeln sich offenbar bevorzugt an felsarmen Standorten. Allzu große Bodenfeuchtigkeit schädigt hier viele Baumarten; insbesondere die Fichte dürfte in Muldenlagen auch unter der langanhaltenden, hohen Schneebedeckung zu leiden haben, die den Schneeschimmelbefall fördert. Die ungünstigen Standortbedingungen treffen außerdem mit einer besonders starken Konkurrenzwirkung der üppig aufwachsenden Hochstauden zusammen; diese dürften das Aufkommen von Jungwuchs zusätzlich noch bedeutend erschweren. Wesentlich erleichtert ist die Verjüngung dagegen offenbar an felsigeren Standorten; auf Felsen treten all die genannten negativen Einwirkungen höchstens abgeschwächt in Erscheinung.

Das Fehlen der üblichen Felsbesiedler läßt dabei freilich nicht immer auf ein Fehlen von Felsblöcken schließen. Einzelne Aufnahmen stammen durchaus von felsigen Standorten. Eine allzu starke Überwucherung der Felsen durch die Hochstauden - bedingt durch eine besonders große Standortsfeuchtigkeit - ließen dort jedoch offenbar den normalen Felsbewuchs nicht zur Entwicklung kommen.

Typisch ausgeprägt ist die Gesellschaft v.a. in der Röth. Sie bildet dort in Muldenlagen und im erweiterten Bett des Röthbaches ausgedehnte Bestände.

Neben der Normalform der Petasites-Ausbildung wurde auch eine Form mit Schlagflurcharakter erfaßt.

10.1.2 Heliosperma-Ausbildung

Auf weitgehend baumfreien, feuchten Blockschutthalden v.a. im Gebiet der Hoch-Alm findet sich eine Form der Alpendostflur, die sich im Artenbestand etwas dem Charakter von Rostseggenrasen annähert. Trotzdem dominiert auch hier *Adenostyles alliariae*. Als Differentialarten erschei-

nen *Poa hybrida*, *Heliosperma quadridentatum*, *Carex ferruginea*, *Arabis alpina* und *Luzula glabrata*.

Obwohl die Gesellschaft insgesamt fast nur auf Blockschuttstandorten vorkommt, läßt sie sich doch in zwei sehr deutlich voneinander geschiedene Untereinheiten aufteilen, die sich offensichtlich im Vorhandensein von Blockschuttbesiedlern unterscheiden. Das weitgehende Fehlen dieser Arten in allerdings nur zwei Aufnahmen von Blockschuttstandorten mag ähnliche Gründe haben, wie sie für die *Petasites*-Ausbildung bereits dargestellt wurden. Es fällt zumindest auf, daß die Hochstaudenbestände bei Fehlen der normalen Blockschuttbesiedler besonders hochwüchsig und dicht geschlossen sind. Auch die mittlere Feuchtezahl ist hier etwas höher.

10.2 GRÜNERLENBUSCH (*Alnetum viridis*)

Die nur in wenigen Aufnahmen aus dem Priesberg-Gebiet erfaßten Grünerlengebüsche entsprechen in ihrer Artenzusammensetzung weitgehend der *Petasites*-Ausbildung der Alpendostflur. Zusätzliche Arten sind neben der Grünerle selbst *Cicerbita alpina* und *Primula elatior*. Typische Vorkommen wurden nur auf silikatischem Gestein - vermutlich Kieselkalk - des Lias gefunden, das die Bildung sehr lehmreicher Böden ermöglicht. Die Aufnahmen stammen außerdem durchwegs von steilen, 40 bis 45 Grad geneigten Nordhängen.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 51 +- 6
davon Gefäßpflanzen: 39 +- 6

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	4	+- 2
pralp:	21	+- 3
kont:	4	+- 1

smed:	8	+ 1
euras:	13	+ 3
subatl:	6,3	+ 0,7
no:	15	+ 2
arkt:	1,0	+ 0,6

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	4,96	+ 0,05	(Halbschatten)
Temperaturzahl:	3,6	+ 0,1	(kühl)
Kontinentalitätszahl:	3,6	+ 0,1	(subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,9	+ 0,1	(frisch bis feucht)
Reaktionszahl:	5,7	+ 0,1	(schwach bis mäßig sauer)
Stickstoffzahl:	6,0	+ 0,1	(mäßig stickstoffreich bis stickstoffreich)

Diese Werte entsprechen weithin denjenigen der Alpendostflur. Auffallend wenig sind allerdings arktische und alpine Arten vertreten. Sie mögen im Grünerlengebüsch unter Lichtmangel leiden, der sich auch in einer relativ niedrigen Lichtzahl ausdrückt. Recht typisch ist der im Vergleich mit der Alpendostflur niedrige Wert der Reaktionszahl.

11. DOST-BUNTREITGRASFLUR (*Origano-Calamagrostietum*) (Tabelle 13)

Die Dost-Buntreitgrasflur steht in engem Kontakt mit dem Ahorn-Buchenwald des Eckau-Gebiets und ist floristisch mit ihm v.a. durch *Polystichum lobatum* verbunden. In der spärlich entwickelten Baumschicht spielen darüber hinaus auch hier Buche und Bergahorn die größte Rolle. Im typischen Fall besiedelt die Gesellschaft jedoch baumfreie, blockschuttreiche Lawenstriche.

Floristisch ist die Gesellschaft nicht sehr klar definiert. Einige der ermittelten Differentialarten kennzeichnen auch die Horstseggenrasen der Waldstufe des Gebiets, ein größerer Teil auch die Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft. Die Dost-Buntreitgrasflur könnte also in gewisser Hinsicht als Vorstadium der letzteren angesehen werden. Sie erscheint jedoch aufgrund größerer Meereshöhe weniger wärmeliebend. Für die Dost-Buntreitgrasflur allein typisch sind nur *Sedum album* sowie *Ara-bis hirsuta* und *A. ciliata*.

Die Gesellschaft kann in eine weiter verbreitete typische und eine seltenere feuchte *Viola biflora*-Ausbildung untergliedert werden. Letztere leitet zum Ahorn-Buchenwald über; sie wurde nicht gesondert kartiert.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 57 +- 4
davon Gefäßpflanzen: 49 +- 3

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	6 +- 1
pralp:	16 +- 2
kont:	3,8 +- 0,6
smed:	22 +- 1
euras:	22 +- 2
subatl:	9,0 +- 0,8
no:	11 +- 1
arkt:	0,8 +- 0,2

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	5,6	+ - 0,1	(Halbschatten bis Halblight)
Temperaturzahl:	4,2	+ - 0,1	(kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,46	+ - 0,04	(subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,20	+ - 0,09	(frisch)
Reaktionszahl:	6,95	+ - 0,06	(schwach sauer bis schwach basisch)
Stickstoffzahl:	5,2	+ - 0,1	(mäßig stickstoffreich)

Verglichen mit dem in Kontakt stehenden Ahorn-Buchenwald weisen die angegebenen Zahlenwerte charakteristische Unterschiede auf. Zum einen bedingt der weitgehend waldfreie Charakter naturgemäß eine erhöhte Lichtzahl. Damit in Zusammenhang steht ein erhöhter Wärmegenuß, der sich in einer vermehrten Zahl submediterraner, einer stark erniedrigten Zahl nordischer Arten und entsprechend auch einer höheren Wärmezahl niederschlägt. Die geringe Feuchtezahl mag durch gesteigerte Verdunstung auf den stärker besonnten Standorten zu erklären sein. Da baumarme Gesellschaften jedoch gleichzeitig weniger Wasser durch Transpiration verlieren, ist die größere Standortstrockenheit hier wohl eher einer Feinerdearmut der Böden zuzuschreiben.

Auffallend ähnlich sind die entsprechenden Zahlenwerte der Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft. Diese unterscheidet sich praktisch nur durch eine geringere Zahl alpiner Arten und eine demgemäß erhöhte Wärmezahl.

12. ROSTSEGGENRASEN (*Caricetum ferrugineae*) (Tabelle 14)

Rostseggenrasen wurden im wesentlichen nur auf Almflächen (Falz- und Wasser-Alm) erfaßt und nicht kartiert. Sie sind vor den beweideten Ausbildungen des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes kaum positiv ausgezeichnet, zumindest nicht durch regelmäßig vorkommende Differentialarten. Eine m.o.w. durchgehend auftretende Trennart gegenüber der genannten Waldgesellschaft ist *Carlina acaulis*, die jedoch auch in anderen Weiderasen häufiger auftritt. Spezifisch für den Rostseggenrasen und auch regelmäßig vertreten ist offenbar nur *Phleum alpinum*. Trotz geringer positiver Kennzeichnung ist der Rostseggenrasen durch das Fehlen zahlreicher Arten auch von den nächstverwandten Ausbildungen des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes recht gut geschieden. Neben den Baumarten fehlen hier teils vollständig: *Athyrium filix-femina*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Oxalis acetosella*, *Lysimachia nemorum*, *Ajuga reptans*, *Lamium galeobdolon*, *Veronica urticifolia*, *Knautia dipsacifolia*, *Valeriana tripteris*, *Aposeris foetida*, *Hieracium sylvaticum*, *Solidago virgaurea*, *Carex digitata*, *Calamagrostis varia* und die Moose *Hylocomium splendens* und *Rhizomnium punctatum*.

Die erhaltenen Aufnahmen lassen sich drei recht unterschiedlichen Ausbildungen zuordnen. Die hochstaudenreiche feuchte *Adenostyles*-Ausbildung besiedelt das m.o.w. ebene Gelände der Wasser-Alm in relativ geringer Meereshöhe. In größerer Höhe und in hängigem Gelände treten die beiden Ausbildungen der Falz-Alm auf. Hier ist eine stark beweidete *Dactylis*-Ausbildung von der besonders hochgelegenen, azidophilen, moosreichen, u.a. durch einzelne Fichtenwaldarten gekennzeichneten *Ligusticum*-Ausbildung zu unterscheiden. Letztere wurde bis 1770 m Meereshöhe angetroffen. Sie ist sicher als Ersatzgesellschaft des Alpenrosen-Latschenbusches aufzufassen; möglicherweise besiedelt sie auch Standorte ehemaliger Hochlagenwälder. Das Vorkommen einzelner strauchförmiger Lärchen bildet hierfür einen schwachen Hinweis.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl:	50 +- 4
davon Gefäßpflanzen:	42 +- 2

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	15 +- 2
pralp:	16 +- 1
kont:	2,0 +- 0,3
smed:	6,5 +- 0,3
euras:	14,1 +- 0,5
subatl:	2,3 +- 0,4
no:	12,5 +- 0,3
arkt:	2,5 +- 0,7

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	6,7 +- 0,1	(Halblicht)
Temperaturzahl:	3,06 +- 0,04	(kühl)
Kontinentalitätszahl:	3,55 +- 0,04	(subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,4 +- 0,1	(frisch)
Reaktionszahl:	5,7 +- 0,2	(schwach bis mäßig sauer)
Stickstoffzahl:	4,5 +- 0,3	(mäßig stickstoffreich)

Die hohe Lichtzahl entspricht dem waldfreien Charakter der Gesellschaft. Besonders aus dem Rahmen fällt die niedrige Temperaturzahl. Sie ist durch die relativ große mittlere Meereshöhe von 1590 m +- 50 m bedingt. Mit dieser steht sicher auch die recht niedrige Reaktionszahl in Zusammenhang, die auf eine gehemmte Streuzersetzung hinweist. Verglichen mit dem Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald sind alpine Arten etwas häufiger, präalpine und nordische, also Arten des Waldbereichs, typischerweise wesentlich seltener.

13. BLAUGRAS-HORSTSEGGENRASEN (*Seslerio-Caricetum sempervirentis*)
(Tabelle 15)

Natürliche Horstseggenrasen treten normalerweise nur über der Waldgrenze in der subalpinen Höhenstufe auf. Die mittlere Meereshöhe der aufgenommenen Bestände liegt jedoch bei nur 1080 m; die meisten Aufnahmen stammen aus dem Bereich der Waldstufe. Die Gesellschaft entwickelte sich hier z.B. auf alten Schlagfluren, deren Wiederbewaldung offenbar erschwert ist. Bevorzugt werden allgemein m.o.w. steile Hänge (34 +- 2 Grad) mit entsprechend flachgründigen Böden. Die untypische Höhenlage läßt naturgemäß auch keine besonders typische Form des Horstseggenrasens entstehen. Assoziations- und selbst Verbandscharakterarten kommen kaum vor; dagegen dringen Laubwaldarten aus den in Kontakt stehenden Wäldern teilweise noch in reichlichen Mengen ein. An Baumarten tritt v.a. die Fichte - meist in Strauchform - recht häufig auf. Floristisch wäre es durchaus möglich gewesen, zumindest einzelne Einheiten dem Weißseggen- oder dem Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald unterzuordnen. Auch eine Einordnung bei den Rostseggenrasen wäre nach der Charakterartenzusammensetzung ohne weiteres vertretbar. *Carex ferruginea* ist nämlich nicht viel seltener als *C. sempervirens*, die der Gesellschaft zwar den Namen gibt, sie aber überregional nicht charakterisiert. Die oben beschriebenen Rostseggenrasen des Gebiets besitzen jedoch eine abweichende Artenzusammensetzung.

Folgende Differentialarten kennzeichnen den Horstseggenrasen des Gebiets: *Buphthalmum salicifolium*, *Carduus defloratus*, *Carex sempervirens*, *Calamintha alpina*, *Rhinanthus glacialis*, *Scabiosa columbaria*, *Thymus polytrichus*, *Stachys alopecurus*, *Carlina acaulis*, *Laserpitium latifolium*, *Viola hirta*, *Cephalanthera longifolia* und *Anthericum ramosum*. *Buphthalmum salicifolium*, *Carduus defloratus*, *Scabiosa columbaria* und *Laserpitium latifolium* sind mit dem Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald gemeinsam.

Die Differentialarten des Horstseggenrasens entstammen erwartungsgemäß v.a. dem Bereich der alpinen Kalksteinrasen. Daneben spielen jedoch auch Arten wärmeliebender Saumgesellschaften sowie Trocken- bzw. Halbtrockenrasenarten eine Rolle.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 58 +- 2
davon Gefäßpflanzen: 50 +- 2

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	11,9 +- 0,8
pralp:	22,0 +- 0,9
kont:	4,4 +- 0,2
smed:	17,4 +- 0,7
euras:	15,5 +- 0,7
subatl:	5,1 +- 0,3
no:	11,3 +- 0,7
arkt:	1,2 +- 0,2

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	6,41 +- 0,07 (Halblicht)
Temperaturzahl:	3,98 +- 0,08 (kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,63 +- 0,02 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	4,72 +- 0,06 (frisch)
Reaktionszahl:	7,01 +- 0,07 (schwach sauer bis schwach basisch)
Stickstoffzahl:	3,68 +- 0,08 (stickstoffarm bis mäßig stickstoffreich)

Erwartungsgemäß liegt hier die Lichtzahl wieder recht hoch. Auffällig sind daneben die relativ sehr niedrige Stickstoff- und die sehr hohe Reaktionszahl. Beides kennzeichnet ausgesprochen kalkoligotrophe Standorte. Die Flachgründigkeit der Böden drückt sich weiterhin in der ungewöhnlich niedrigen Feuchtezahl aus. Auf ein wesentlich wärmeres Lokalklima, als es an den den Standorten des Rostseggenrasens herrscht, weisen die erhöhte Zahl submediterraner und der geringere Anteil arktischer und alpiner Arten hin. Entsprechend höher ist auch die Temperaturzahl.

13.1 Reine Ausbildung

Die Reine Ausbildung des Horstseggenrasens entspricht wieder der verbreiteten Normalform. Ihr Hauptvorkommen findet sich am steilen Westabhang des Schapbachriedels, vermutlich im Bereich alter Schlagfluren. Ein lockerer Fichtenschirm ist hier fast immer anzutreffen; geschlossene Baumbestände können sich jedoch - offenbar aufgrund der standörtlichen Ungunst im Verein mit der Schädigung des Jungwuchses durch Wild und Weidevieh - nur schwer entwickeln. Im Kontakt finden sich am Schapbachriedel jedoch auch zweifellos künstlich angelegte dichte Fichtenbestände; möglicherweise stocken diese zumindest teilweise auf silikatreicherem Ausgangsgestein (Reichenhaller Schichten).

Kriterium für die weitere Untergliederung der Reinen Ausbildung ist zum einen wiederum das Auftreten von Felsbesiedlern. Weideeinfluß scheint im Bereich der Aufnahmeflächen fast immer vorhanden gewesen zu sein. Besonders reichliches Auftreten von Weidezeigern ist in der Tabelle gekennzeichnet.

13.2 Hippocrepis-Ausbildung

Die Hippocrepis-Ausbildung besitzt als Differentialarten *Tofieldia calyculata*, *Hippocrepis comosa*, *Plantago media*, *Anthyllis vulneraria*, *Biscutella laevigata*, *Carex firma*, *Gentiana verna*, *Centaurea scabiosa* und *Ophrys insectifera*. Skleromorphe Arten sind relativ zahlreich vorhanden. Die Ausbildung leitet zum Polsterseggenrasen der Tieflagen über und besiedelt besonders flachgründige Standorte. Der Rasencharakter ist ausgeprägter als der der Reinen Ausbildung; trotzdem unterscheiden sich beide Gesellschaften nicht in ihrem relativen Fichtenreichtum.

Weidezeiger treten in der Hippocrepis-Ausbildung wesentlich zahlreicher in Erscheinung als in der Reinen Ausbildung. Keine der Aufnahmen ist frei davon, und in der Tabelle wurden wiederum nur zwei unterschiedlich stark beweidete Formen dargestellt.

13.3 Molinia-Ausbildung

Diese Ausbildung dürfte sich wohl in erster Linie durch besondere Wärmeliebe auszeichnen. Vorkommen finden sich v.a. in geringen Meereshöhen (im Mittel 860 m +- 40 m); die Temperaturzahl liegt mit 4,4 +- 0,1 über dem Durchschnitt der Assoziation. Differentialarten sind *Molinia arundinacea* selbst und *Anthericum ramosum*, denen sich teilweise auch *Erica herbacea* und *Amelanchier ovalis* anschließen.

13.3.1 Reine Molinia-Ausbildung

Die Reine Molinia-Ausbildung findet sich v.a. im Bereich des Hirschbichttales in einem felsigen und wohl als Lawenstrich aufzufassenden Hangeinschnitt. Sie dürfte hier einerseits durch Föhn begünstigt sein. Zur Zeit der Schneeschmelze und bei stärkeren Regenfällen ist in ihrem Bereich außerdem mit oberflächlichem Wasserabfluß zu rechnen, so daß auch dem Feuchtigkeitsbedarf des Pfeifengrases entsprochen ist. Reichliches Auftreten von *Erica herbacea* weist jedoch darauf hin, daß der durchlässige Kalkuntergrund im Verein mit der austrocknenden Wirkung des Föhns keine dauerhaft gute Wasserversorgung zulassen.

Weidezeiger traten nur in einer Aufnahme der Reinen Molinia-Ausbildung in Erscheinung.

Die beiden folgenden Untereinheiten der Molinia-Ausbildung stehen in näherer Beziehung zur Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft. Wie diese treten sie im Umkreis des Königssees auf. Sie besitzen folgende ihrer Differentialarten: *Vincetoxicum hirundinaria*, *Fraxinus excelsior*, *Campanula trachelium*, *Corylus avellana* und die Moose *Entodon concinnus* und *Campylium stellatum*.

13.3.2 Molinia-Ausbildung mit Allium

Im der Gegend des Rinnkendlsteiges wurde an meist felsigen Standorten eine Gesellschaft mit gewissem Trockenrasencharakter vorgefunden. Möglicherweise ist diese durch den Waldbrand des Jahres 1947 mitbeeinflusst.

Differentialarten sind *Teucrium montanum*, *Medicago lupulina*, *Silene nutans*, *Allium montanum* und die Moose *Rhytidium rugosum* und *Bryum argenteum*. Es dürfte sich wohl um die thermophilste aller hier beschriebenen Pflanzengesellschaften handeln; ihre mittlere Temperaturzahl beträgt $4,8 \pm 0,1$.

13.3.3 *Molinia*-Ausbildung mit *Convallaria*

Diese Einheit findet sich in typischer Form nur im Bereich der Röthwand. Sie erscheint ebenfalls wärmeliebend, ist daneben jedoch deutlich durch Hangwasser geprägt, das in dem weiten Bogen der Röthwand wie in einem Trichter gesammelt wird. Das Substrat ist anstehender Dachsteinkalk.

Differentialarten der Gesellschaft sind *Parnassia palustris*, *Aconitum napellus*, *Convallaria majalis*, *Polygonatum odoratum*, *Laserpitium siler*, *Hepatica nobilis* und *Gentiana aspera*.

Besonders eng ist die Beziehung zur typischen Ausbildung der *Corylus avellana*-Amelanchier ovalis-Gesellschaft LIPPERTs. Zweifellos handelt es sich um ein Vorstadium zu dieser strauchreicheren Gesellschaft.

13.4 *Primula auricula*-Ausbildung

Auf Felsbändern erscheint eine Ausbildung des Horstseggenrasens mit den Felsspaltenbesiedlern *Primula auricula* und *Potentilla caulescens*. In dieser Gesellschaft wurde außerdem einmal *Stipa calamagrostis* gefunden.

Die typischen Aufnahmen stammen aus dem Areal der Hasel-Felsenbirnengesellschaft und besitzen deshalb auch einige von deren Differentialarten. Diese Aufnahmen entsprechen also der Ausbildung der *Corylus avellana*-Amelanchier ovalis-Gesellschaft mit *Primula auricula* und *Potentilla caulescens* nach LIPPERT.

13.5 *Hookeria*-Ausbildung

Diese Ausbildung wurde nur im Bereich der Alpelwand im Wimbachtal angetroffen. Sie ist durch eine größere Zahl von feuchtigkeits- und säureliebenden Moosen gekennzeichnet; das Gesamtvorkommen ist jedoch zu klein, um eine gesonderte Darstellung in der Karte zu rechtfertigen.

13.6 *Luzula sylvatica*-Ausbildung

Mit steigender Meereshöhe bilden sich zunehmend typischere Formen des Horstseggenrasens aus. Die *Luzula sylvatica*-Ausbildung erscheint m.o.w. kleinflächig in der höheren Waldstufe. In größerer Ausdehnung wurde sie über der heutigen Waldgrenze im Bereich der Falz-Alm erfaßt. Differentialarten sind Arten der *Luzula sylvatica*-Gruppe, die auch den Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald kennzeichnet, nämlich *Geranium sylvaticum*, *Luzula sylvatica*, *Soldanella alpina* und das Felsmoos *Pseudoleskea incurvata*. Zu diesen gesellen sich außerdem *Polystichum lonchitis* als Steinschuttbesiedler und *Helianthemum nummularium* ssp. *grandiflorum*.

Die meisten Aufnahmen sind reich an Weidezeigern; viele von diesen sind auf die Hochlagen beschränkt. Aufnahmen gering beweideter Bestände sind gleichzeitig reicher an Felsbesiedlern.

14. POLSTERSEGGENRASEN (*Caricetum firmae*), Schneeheide-Variante
(Tabelle 16)

Wie der Horstseggenrasen so wurde auch der Polsterseggenrasen nicht in seinem alpinen Hauptverbreitungsgebiet sondern tief im montanen Bereich erfaßt. Vorkommen finden sich im Hirschbichtal bei etwa 800 m und in St. Bartholomä bei wenig mehr als 600 m Meereshöhe, also im tiefstgelegenen Teil des Untersuchungsgebiets überhaupt. Die Vorkommen in St. Bartholomä siedeln somit noch tiefer als alle von THIELE (1978) aus dem Wimbachgries beschriebenen Formen der Gesellschaft und sind den typischen alpinen Polsterseggenrasen noch unähnlicher. Die Tieflagenformen der Gesellschaft zeichnen sich unter anderem durch das reichliche Vorkommen von *Erica herbacea* aus und sind nach dieser benannt.

Floristisch und standörtlich entsprechen zumindest die reiferen der hier erfaßten Ausbildungen am ehesten THIELEs Anthericum-Ausbildung mit *Carex sempervirens*. Sowohl die geringe Meereshöhe als auch die geringe Hangneigung stimmen in beiden Fällen überein. Floristische Übereinstimmung besteht nicht in allen Arten; z.B. sind gerade *Anthericum ramosum* und *Carex sempervirens* in den hier besprochenen Ausbildungen nur sehr spärlich vertreten. Genauso spärlich wie bei THIELE kommt dagegen die Latsche vor. Dafür dringt wie dort die Fichte stärker ein. Die Weiterentwicklung dürfte zum Weißseggen-Fichtenwald oder zum Schneeheide-Kiefernwald verlaufen; nähere Beziehungen bestehen z.B. zum Erdseggen-Schneeheide-Kiefernwald der Pupplinger Au (SEIBERT 1958), wenn auch die Kiefer selbst in keiner Aufnahme auftritt. Sie scheint im Gebiet völlig durch die Fichte vertreten zu sein.

Gekennzeichnet ist der Polsterseggenrasen des Gebiets neben der weiter verbreiteten Schneeheide speziell durch *Carex firma* selbst, *Dryas octopetala* und meist auch durch *Globularia cordifolia*, *Carex mucronata*, *Leontodon incanus* u.a.. Die *Carex sempervirens*-Gruppe des Blaugras-Horstseggenrasens tritt hier deutlich zurück.

Der Polsterseggenrasen besiedelt wenig entwickelte Feinschuttböden, die zumindest größtenteils aus Dolomitschutt gebildet werden.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 47 +- 2
davon Gefäßpflanzen: 43 +- 2

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	13 +- 1
pralp:	21,1 +- 0,8
kont:	3,0 +- 0,6
smed:	14 +- 1
euras:	11 +- 1
subatl:	3,3 +- 0,3
no:	9 +- 1
arkt:	2,2 +- 0,4

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	7,00 +- 0,08 (Halblicht)
Temperaturzahl:	4,2 +- 0,1 (kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,81 +- 0,04 (subozeanisch)
Feuchtezahl:	4,49 +- 0,09 (frisch bis trocken)
Reaktionszahl:	7,6 +- 0,1 (schwach basisch bis basisch)
Stickstoffzahl:	2,90 +- 0,05 (stickstoffarm)

Hier ist die Gesamtartenzahl - wie es für Polsterseggenrasen allgemein typisch ist - ausgesprochen gering. Alpine und arktische Arten sind trotzdem und auch trotz geringerer Meereshöhe zahlreicher als im Horstseggenrasen. Die Lichtzahl ist ebenfalls noch höher als bei diesem. Mit ihr im Zusammenhang mag wieder die hohe Kontinentalitätszahl stehen, die auf ein ausgeprägtes Strahlungsklima hinweist. Erwartungsgemäß ist die Feuchtezahl sehr niedrig; die Wasserspeicherkapazität der initialen Böden aus stark durchlässigem Ausgangsgestein ist naturgemäß sehr gering. Am augenfälligsten sind jedoch die extrem hohe Reaktions- und die extrem niedrige Stickstoffzahl. Sie liegen noch um einiges jenseits der Werte für den Horstseggenrasen und kennzeichnen eine entsprechend ausgeprägte Kalkoligotrophie der Standorte.

14.1 Biscutella-Ausbildung

Als Kontaktgesellschaft des Weißseggen-Fichtenwaldes findet sich im Hirschbichtal eine relativ azidophile Form des Polsterseggenrasens. Sie besiedelt jüngere Aufschüttungen des Klausbaches. Besonders typische Differentialarten sind *Biscutella laevigata*, *Gymnadenia conopea* und *Gentiana verna*. Zu diesen gesellen sich relativ säureliebende Arten wie *Melampyrum sylvaticum* und v.a. die Moose *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi* und *Rhytidiadelphus triquetrus*. Mit einem Teil der *Salix elaeagnos*-Ausbildung verbinden Arten wie *Hippocrepis comosa*, *Tofieldia calyculata*, *Primula farinosa*, *Plantago media*, *Gentiana clusii* und einige in anderen Gesellschaften weiter verbreitete Differentialarten. Meist findet sich eine m.o.w. spärliche Baumschicht aus Fichte.

Zur Biscutella-Ausbildung gehört der einzige stärker beweidete Bestand eines Polsterseggenrasens, der aufgenommen wurde. Er fand sich neben der Wildfütterung des Hirschbichtales.

14.2 Latschen-Ausbildung

Nur in einer Aufnahme vom Standgraben im Hirschbichtal wurde diese offenbar stärker föhn-, aber auch lawinenbeeinflusste Form des Polsterseggenrasens erfaßt. Im Kartierungsgebiet selbst wurde sie nicht gefunden. Sie ist neben der Latsche noch durch zahlreiche andere Arten wie *Amelanchier ovalis*, *Anthericum ramosum*, *Gentiana utriculosa*, *Athamanta cretensis* u.a. gekennzeichnet.

14.3 Salix elaeagnos-Ausbildung

Die *Salix elaeagnos*-Ausbildung besiedelt mit zwei unterschiedlich weit entwickelten Formen die Schotterfelder von St. Bartholomä. Sie besitzt meist eine Strauchschicht aus *Salix elaeagnos* und geringwüchsiger Fichte. Differentialarten sind neben der Lavendelweide *Euphrasia picta*, *Molinia arundinacea*, *Prunella grandiflora* und *Stachys alopecurus*. Sie

mag ein Folgestadium des mit ihr vergesellschafteten Lavendelweidenbusches bilden. In ähnlicher Weise folgen auch in der Pupplinger Au dem Zusammenbruch von Weidengebüschen rasenartige Gesellschaften nach (SEIBERT 1958).

14.3.1 *Salix elaeagnos*-Ausbildung mit *Petasites paradoxus*

Diese Form der *Salix elaeagnos*-Ausbildung erscheint als lückige Vegetationsdecke (mittlerer Deckungsgrad der Krautschicht 34 % $\pm$ 7 %) auf initialen Rendzinen kiesiger oder grusiger Substrate. Der Schutt liegt hier weithin noch offen zutage. Als Differentialarten finden sich folglich zahlreiche fels- und v.a. schuttbesiedelnde Arten wie *Carduus defloratus*, *Petasites paradoxus*, *Campanula cochleariifolia* sowie *Tortella inclinata* und *Fissidens cristatus*. In einer Aufnahme trat *Saxifraga bursariana* auf, die auch von ADE (1911) und MAGNUS (1914) auf den Schotterfeldern des Eisbaches gefunden wurde.

14.3.2 *Salix elaeagnos*-Ausbildung mit *Parnassia*

Diese Gesellschaft bildet geschlossene Rasen (mittlerer Deckungsgrad der Krautschicht 77 % $\pm$ 3 %) auf weiter entwickelten, allerdings zumindest teilweise auch feinerdereicheren, schluffigen Böden. Ihr Vorkommen liegt im Uferbereich des Königssees, so daß hier auch das Grundwasser den Charakter der Vegetation mitprägen dürfte. Unter den Differentialarten finden sich deshalb u.a. starke Feuchtezeiger aus dem Bereich der Niedermoore wie *Parnassia palustris* selbst und *Epipactis palustris*. Dazu kommen *Briza media* und *Gymnadenia odoratissima* sowie die *Hippocrepis comosa*-Gruppe, die mit der *Biscutella*-Ausbildung des Polsterseggenrasens gemeinsam ist und mit *Primula farinosa* und *Tofieldia calyculata* ebenfalls Flachmoorarten enthält.

15. GEHÖLZREICHE GESELLSCHAFTEN AUF FEINSCHUTTSTANDORTEN

(Tabelle 17)

Die folgenden Gesellschaften sind durchweg relativ schlecht charakterisiert. Sie besiedeln m.o.w. initiale Standorte auf Kies oder Dolomitgrus. Gemeinsam kennzeichnende Arten sind *Frangula alnus*, *Molinia arundinacea* und *Berberis vulgaris*. Diese Arten treten freilich auch in einer Anzahl anderer Gesellschaften des Gebiets auf. Größere Treuegrade weisen *Petasites paradoxus* und v.a. *Salix elaeagnos* auf, die mit dem Polsterseggenrasen verbinden. Auffällig ist weiterhin das regelmäßige Vorkommen des Bergahorns in der Baum- und Strauchschicht. Auf die Gesellschaftsgruppe weitgehend beschränkt sind im Untersuchungsgebiet u.a. *Taraxacum officinale* und *Arabis pumila*.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 47 +- 3

davon Gefäßpflanzen: 41 +- 3

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	7 +- 2
pralp:	17 +- 2
kont:	3,7 +- 0,6
smed:	17 +- 1
euras:	13 +- 1
subatl:	6,3 +- 0,5
no:	10,0 +- 0,8
arkt:	0,3 +- 0,1

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	6,0 +- 0,2	(Halbschatten bis Halblight)
Temperaturzahl:	4,48 +- 0,08	(mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,63 +- 0,04	(subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,19 +- 0,09	(frisch)
Reaktionszahl:	7,15 +- 0,09	(schwach sauer bis schwach basisch)
Stickstoffzahl:	4,3 +- 0,2	(stickstoffarm bis mäßig stickstoffreich)

Die Gesamtartenzahl entspricht hier weitgehend derjenigen des häufig in Kontakt stehenden Polsterseggenrasens, mit dem auch viele floristische Übereinstimmungen bestehen. Niedriger als dort, aber typischerweise immer noch höher als bei allen Waldgesellschaften des Gebiets, ist die Reaktionszahl. Die Stickstoffzahl entspricht derjenigen der stickstoffärmsten unter den erfaßten Waldgesellschaften. Die Feuchtezahl ist etwa der des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes zu vergleichen, also nicht so niedrig, wie es für initiale Kiesböden anzunehmen wäre.

15.1 VERARMTE KALKSCHUTTFILUR

Auf den Schotterfeldern von St. Bartholomä finden sich in recht weiter Verbreitung von Kies verschüttete Bergahornbestände. Typische Schuttgesellschaften können sich hier nicht entwickeln, weil zum einen der relativ dichte Baumbestand die Bodenvegetation zu stark beschattet. Andererseits mag durch die reichlich anfallende Laubstreu der Nährstoffgehalt des Bodens so sehr erhöht werden, daß hier oligotrophe Schuttbesiedler kaum mehr vorkommen können. Dafür erscheinen hier stickstoffliebende Arten von unterschiedlichem Pioniercharakter wie *Tussilago farfara* und *Mycelis muralis*. Die Sukzession dürfte hier zur *Frangula*-Ausbildung des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes bzw. zur Eschen-Ausbildung des Reinen Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes führen.

15.2 SCHNEEPESTWURZFILUR (*Petasitetum paradoxi*)

Die beiden aufgenommenen Bestände der Schneepestwurzflur ähneln weitgehend noch der verarmten Kalkschuttfilur. Auch hier handelt es sich um verschüttete Ahornbestände mit ähnlicher Artenkombination. Der Deckungsgrad der Baumschicht ist hier jedoch geringer und erlaubt u.a. verschiedenen Rasenarten das Vorkommen. Typisch für die Gesellschaft sind neben der Dominanz von *Petasites paradoxus* selbst v.a. das Vorkommen von *Primula auricula*, *Polygala amara*, *Gypsophila repens* und *Encalypta streptocarpa*.

Die Vorkommen der Gesellschaft sind flächenmäßig unbedeutend; eine Kartierung erfolgte nicht.

15.3 LAVENDELWEIDENBUSCH (*Salicetum elaeagni*)

Auch der Lavendelweidenbusch - bei LIPPERT (1966) noch als *Salix-elaeagnos-Molinia litoralis*-Gesellschaft bezeichnet - tritt v.a. auf den Schotterflächen von St. Bartholomä auf. Der Einheit wurden alle an Lavendelweide reicheren Gesellschaften zugeordnet, obwohl die Lavendelweide selbst hier als einzige Charakterart der ganzen Klasse der Weidenauen vorkommt. Die Standorte des Lavendelweidenbusches sind normalerweise reifer als die der beiden vorangegangenen Gesellschaften. Offenen Kies besiedelt nur der einzige erfaßte Bestand einer Reinen Ausbildung. Hierbei handelt es sich um ein uncharakteristisches, niedrigwüchsiges Pionierstadium. Wenig charakteristisch ist auch die Aufnahme 599 - ein lavendelweidenreiches Fichtenjungholz mit zahlreichen Moosarten. Am typischsten entwickelt erscheinen die beiden Aufnahmen der beweideten *Succisa*-Ausbildung.

16. SCHILDAMPFERFLUR (*Rumicetum scutati*)

Die Schildampferflur ist eine im typischen Fall sehr artenarme Gesellschaft initialer Grushalden. Sie wird mitunter fast nur aus *Rumex scutatus* selbst und *Silene vulgaris* aufgebaut. Die Gesellschaft wurde nur zweimal aufgenommen und an wenigen Stellen im Wimbachgries kartiert. In die Tabelle wurde sie nicht übernommen.

17. ROSTSEGGEN-ALPENRISPENGGRASWEIDE (*Prunello-Poetum alpinae caricetosum ferrugineae*) (Tabelle 18)

Wie manche anderen Rasengesellschaften so wurde auch die Alpenrispengrasweide großenteils in wesentlich geringerer Meereshöhe aufgenommen, als es ihrem über der Waldgrenze angesiedelten Hauptvorkommen entspricht. Die aufgenommenen und kartierten Bestände sind deshalb sicher nicht typisch. Aufgrund ihres ungewöhnlichen Reichtums an Arten der alpinen Kalkmagerrasen, unter denen v.a. *Carex ferruginea* stark hervortritt, wurde sie einer nach letzterer benannten Subassoziation zugeordnet. Die meisten der insgesamt nur wenigen Aufnahmen stammen aus der Umgebung der Stuben-Alm. Die Gesellschaft ersetzt dort die Soldanella-Ausbildung des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes bei besonders intensivem Weideeinfluß und ist selbst noch reich an Buchenwaldarten. Die mittlere Meereshöhe der Aufnahmen beträgt nur 1320 m +- 70 m. Eine etwas typischere Höhenlage besitzt eine Aufnahme vom Hocheiskopf mit 1570 m. Der Bestand löst dort die Erica-Ausbildung des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes mit *Selaginella* ab, die sich ihrerseits in ihrer beweideten Form bereits stark an die Rostseggen-Alpenrispengrasweide annähert.

Folgende Arten besitzen in der Gesellschaft einen Verbreitungsschwerpunkt bzw. sind auf diese beschränkt: *Parnassia palustris*, *Carex flava*, *Linum catharticum*, *Bellis perennis*, *Tussilago farfara*, *Gentiana aspera*, *Sagina saginoides*, *Ranunculus alpestris*, *Briza media*, *Chrysanthemum leucanthemum*, *Veronica aphylla* und *Hypnum lindbergii*. Die Flachmoorarten *Parnassia palustris* und *Carex flava* sowie die Schneetälchenarten *Sagina saginoides* und *Ranunculus alpestris* weisen auf höhere Bodenfeuchtigkeit hin. Ihre Ursache könnte z.T. in der trittbedingten Bodenverdichtung zu suchen sein, die die Versickerung des Wassers in dem ansonsten sicher leicht durchlässigen Gesteinsuntergrund erschwert. Die ziemlich geringe Hangneigung von 23 +- 1 Grad verhindert auch einen allzu raschen Oberflächenabfluß.

Die erfaßten Bestände der Gesellschaft besitzen häufig eine gut ausgebildete Strauchschicht aus Lärche und v.a. Fichte, die neben dem Vorkommen zahlreicher anderer Waldarten auf die geringe Höhenlage im Bereich der Waldstufe hinweisen.

Die Rostseggen-Alpenrispengrasweide wurde in zwei sich im Wasserhaushalt unterscheidende Ausbildungen untergliedert. Die feuchtere Sagi-

na-Ausbildung tritt in etwas größerer Meereshöhe auf. Schneetälchenarten finden sich nur hier und weisen zusammen mit den manchmal vom Schneeschimmel befallenen Jungfichten auf entsprechend hohe Schneelagen hin. Der größere Schneereichtum gegenüber der trockener erscheinenden Sesleria-Ausbildung ist sicher v.a. durch die Gestalt des Geländes und weniger durch die geringfügig größere Meereshöhe bedingt. Nicht zuletzt dürften die mitunter festgestellten südlichen Expositionen der Sesleria-Ausbildung für die auftretenden Unterschiede wesentlich sein.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 66 +- 3
davon Gefäßpflanzen: 54 +- 1

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	16	+- 1
pralp:	22	+- 1
kont:	2,8	+- 0,4
smed:	14	+- 1
euras:	18	+- 2
subatl:	5,0	+- 0,6
no:	15	+- 1
arkt:	4,0	+- 0,8

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	6,6	+- 0,1	(Halblicht)
Temperaturzahl:	3,4	+- 0,1	(kühl)
Kontinentalitätszahl:	3,54	+- 0,03	(subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,40	+- 0,07	(frisch)
Reaktionszahl:	6,7	+- 0,2	(schwach sauer bis schwach basisch)
Stickstoffzahl:	3,9	+- 0,1	(stickstoffarm bis mäßig stickstoffreich)

Unter diesen Werten ist v.a. die hohe Gesamtartenzahl von Interesse. Sie entspricht den artenreichsten Waldgesellschaften des Gebiets und

scheint für beweidete Gesellschaften typisch zu sein. Hoch ist dabei der Anteil alpiner und nicht zuletzt auch arktischer Arten. Letztere weisen mit die größte Artenzahl unter allen erfaßten Pflanzengesellschaften des Gebiets auf. Recht niedrig ist die Stickstoffzahl; sie mag auf örtlich begrenzte Nährstoffentzüge durch das Weidevieh hinweisen, ist jedoch ausgesprochen untypisch für die sonst durchaus nitrophile Alpenrispengrasweide und legt die Zuordnung der Gesellschaft zu einer besonderen Subassoziation ebenfalls nahe.

18. ROTSCHWINGELWEIDE (*Alchemillo-Cynosuretum*) (Tabelle 19)

Die Gesellschaft wurde nur in zwei Aufnahmen vom Rand der Stuben-Alm erfaßt. Sie ähnelt der Rostseggen-Alpenrispengrasweide, besiedelt jedoch offenbar trockenere und weniger schneereiche Standorte.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 60 +- 2
davon Gefäßpflanzen: 56 +- 3

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	9	+- 2
pralp:	22	+- 2
kont:	2,5	+- 0,5
smed:	16,0	+- 0,0
euras:	21	+- 1
subatl:	7	+- 2
no:	17,5	+- 0,5
arkt:	2	+- 1

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	6,1 +- 0,1	(Halbschatten bis Halblicht)
Temperaturzahl:	3,73 +- 0,06	(kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,62 +- 0,06	(subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,2 +- 0,2	(frisch)
Reaktionszahl:	6,6 +- 0,1	(schwach sauer)
Stickstoffzahl:	4,17 +- 0,04	(stickstoffarm bis mäßig stickstoffreich)

Die gegebenen Zahlenwerte entsprechen weitgehend der Alpenrispengrasweide. Niedriger als dort ist die Zahl alpiner und arktischer Arten. Auf größere Trockenheit und höheren Wärmegenuß weisen Feuchte- und Temperaturzahl hin.

19. BORSTGRASRASEN (*Nardetum alpigenum*) (Tabelle 20)

Weidebedingte Borstgrasrasen der Waldstufe wurden im Bereich der Bind-Alm und der Priesberg-Alm gefunden. Die Gesellschaft besiedelt Böden aus saurem Ausgangsgestein; im Bereich der Bind-Alm kommen hierfür die Roßfeldschichten der Unterkreide, auf der Priesberg-Alm saure Liasgesteine in Frage. Charakter- bzw. Differentialarten sind im Gebiet ebenso wie im überregionalen Zusammenhang (was die ganze Klasse der *Nardo-Callunetea* betrifft) *Nardus stricta* selbst sowie *Arnica montana*, *Calluna vulgaris*, *Carex pallescens*, *C. pilulifera*, *Hieracium pilosella*, *Campanula barbata*, *Antennaria dioica* und *Danthonia decumbens*. Dazu kommen einige andere, für Borstgrasrasen normalerweise weniger spezifische Arten. Das regelmäßige und reichliche Vorkommen von strauchförmiger Fichte weist darauf hin, daß die wenigen vorhandenen Aufnahmen grundsätzlich aus dem Randbereich der Almweiden stammen.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 51 +- 2
davon Gefäßpflanzen: 44 +- 4

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	7 +- 3
pralp:	12,7 +- 0,7
kont:	3,3 +- 0,7
smed:	10 +- 3
euras:	19 +- 1
subatl:	5,7 +- 0,9
no:	16,6 +- 0,9
arkt:	2,3 +- 0,7

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	6,6 +- 0,3	(Halblicht)
Temperaturzahl:	3,6 +- 0,2	(kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,56 +- 0,08	(subozeanisch)
Feuchtezahl:	5,0 +- 0,1	(frisch)
Reaktionszahl:	4,6 +- 0,4	(mäßig sauer)
Stickstoffzahl:	3,6 +- 0,3	(stickstoffarm bis mäßig stickstoffreich)

Wie die Gesamtartenzahl zeigt, ist die Gesellschaft trotz ihres sauren Substrates recht artenreich und daher von besonderem floristischem Interesse, zumal sie im Gebiet nicht allzu häufig ist. Charakteristisch für Magerweiden ist die niedrige Stickstoffzahl. Auch die Reaktionszahl ist naturgemäß niedrig.

20. QUELLFLUREN UND RISPENSEGGENRIED (Tabelle 21)

Alle waldfreien Gesellschaften nasser Standorte auf Karbonatgestein wurden in der Karte einheitlich dargestellt. Zumeist handelt es sich hierbei um die Vegetation m.o.w. quelliger Orte. Als initialeres Entwicklungsstadium findet sich hier die eigentliche Quellflur des *Cratoneuretum filicino-commutati*, das mit zunehmender Humusanreicherung in das Quellmoor des *Caricetum davallianae* übergeht. *Cratoneuron commutatum* kommt auch im letzteren als Entwicklungsrelikt noch regelmäßig vor. Die beweidete *Prunella*-Ausbildung des *Caricetum davallianae* leitet zu den Naßwiesen, speziell wohl zur Schwalbenwurz-Pfeifengraswiese (*Asclepiado-Molinietum* Oberd 57) über. *Molinia caerulea* tritt im übrigen, z.T. dominierend, in allen Aufnahmen des *Caricetum davallianae* auf. Charakterarten der ganzen Gesellschaftsgruppe sind im Gebiet v.a. *Equisetum sylvaticum*, und *E. palustre* sowie *Bryum pseudotriquetrum* und *Calliergonella cuspidata*.

Das Rispenseggenried wurde nur einmal gefunden. Es besiedelte einen ebenfalls quelligen Hang. Als einzige Röhrichtpflanze tritt hier *Carex paniculata* selbst auf, dies jedoch in hoher Dominanz.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 30 +- 2
davon Gefäßpflanzen: 25 +- 2

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	5,1 +- 0,9
pralp:	9 +- 1
kont:	1,1 +- 0,3
smed:	6 +- 1
euras:	12 +- 1
subatl:	2,5 +- 0,3
no:	12 +- 1
arkt:	2,1 +- 0,1

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	6,5	+ 0,1	(Halblicht)
Temperaturzahl:	3,6	+ 0,2	(kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,50	+ 0,05	(subozeanisch)
Feuchtezahl:	6,7	+ 0,1	(feucht)
Reaktionszahl:	7,3	+ 0,2	(schwach sauer bis schwach basisch)
Stickstoffzahl:	4,3	+ 0,3	(stickstoffarm bis mäßig stickstoffreich)

Am auffälligsten ist hier naturgemäß die hohe Feuchtezahl. Der besonderen Standortfeuchtigkeit sind hier auch nur wenige Arten gewachsen. Die Gesamtartenzahl liegt deshalb nicht höher als die des Alpenlattich-Fichtenwaldes. Von der Reduktion der Artenzahl sind fast alle Geoelemente betroffen. Besonders gering ist dabei der Anteil des kontinentalen Elements, so daß auch die Kontinentalitätszahl relativ niedrig ist. Dies entspricht der im Jahresverlauf meist wenig variierenden Temperatur des Quellwassers. Auf relativ niedrige Standorttemperaturen weist dabei die Temperaturzahl hin. Ungewöhnlich hoch ist demgegenüber die Reaktionszahl, die fast den Wert derjenigen des Polsterseggenrasens erreicht. Sie weist auf den besonders hohen Karbonatgehalt des frisch ausgetretenen Quellwassers hin.

21. BRAUNSEGGENSUMPF (*Caricetum fuscae*) (Tabelle 10)

Der Braunseggensumpf besiedelt nasse Stellen im Bereich des Alpenlattich-Fichtenwaldes; häufig sind Vorkommen an schlammigen Wasserstellen. Ausgangsgesteine sind wie beim Alpenlattich-Fichtenwald saure Liasgesteine. Als subalpine Form des Braunseggensumpfes ist die vorliegende Gesellschaft durch das Vorkommen von *Juncus filiformis* und *Drepanocladus exannulatus* ausgezeichnet. *Calycocorsus stipitata* und *Homogyne alpina* charakterisieren die Kalkalpenrasse. Charakter- und Differentialarten sind im Gebiet mit Ausnahme von *Homogyne alpina* die schon genannten Arten sowie v.a. *Carex fusca* selbst, des weiteren *Caltha palustris*, *Stel-*

laria uliginosa, *Callitriche palustris* s.l., *Epilobium anagallidifolium*, *Viola palustris* sowie *Pellia epiphylla*, *Sphagnum squarrosum*, *S. girgensohnii* und *Drepanocladus exannulatus*.

Die erhaltenen Aufnahmen sind meistens nicht rein, sondern mit Waldarten der Umgebung durchsetzt. Häufig ist ein recht starker Weideeinfluß festzustellen, der von der nahen Kühroint-Alm ausgeht.

Pflanzensoziologisch-systematisch gehört der Braunseggensumpf zwar wie das oben beschriebene *Caricetum davallianae* zur Klasse der Niedermoore. Da er jedoch eng mit dem Alpenlattich-Fichtenwald vergesellschaftet ist und viele von dessen Arten hier eindringen, erschien es vorteilhaft, ihn in der Tabelle neben diese Waldgesellschaft zu stellen.

Statistik:

Mittlere Gesamtartenzahl: 34 +- 5
davon Gefäßpflanzen: 21 +- 4

mittlere Artenzahl der Geoelemente

alp:	5 +- 1
pralp:	7 +- 2
kont:	1,7 +- 0,3
smed:	3,0 +- 0,6
euras:	10,3 +- 0,7
subatl:	2,3 +- 0,7
no:	12 +- 2
arkt:	5,0 +- 0,6

Mittlere Zeigerwerte

Lichtzahl:	5,8 +- 0,3	(Halbschatten bis Halblicht)
Temperaturzahl:	3,5 +- 0,2	(kühl bis mäßig warm)
Kontinentalitätszahl:	3,35 +- 0,05	(ozeanisch bis subozeanisch)
Feuchtezahl:	7,2 +- 0,3	(feucht)

Reaktionszahl:	4,1 +- 0,2	(mäßig sauer bis sauer)
Stickstoffzahl:	4,7 +- 0,1	(mäßig stickstoffreich)

Die Gesamtartenzahl ist hier ähnlich niedrig wie bei den Quellfluren. Sie wäre wohl noch wesentlich niedriger, wenn nicht aus dem in engem Kontakt stehenden Alpenlattich-Fichtenwald noch häufig zahlreiche Arten eindringen würden. Die besonders homogene Aufnahme 273 besitzt z.B. nur 24 Arten. Moose haben an der Gesamtartenzahl einen besonders hohen Anteil.

Die Feuchtezahl ist naturgemäß hier wieder besonders hoch; sie besitzt den höchsten Wert aller erfaßten Pflanzengesellschaften. Die niedrige Reaktionszahl entspricht dem sauren Ausgangsgestein. Ausgesprochen niedrig ist auch die Kontinentalitätszahl. Für sie mag wieder die ausgleichende Wirkung des Wassers eine Rolle spielen. Die Lichtzahl ist deutlich niedriger als bei den Quellfluren. Sie weist auf den Charakter des Braunseggensumpfes als eines durch die Umgebung stark beschatteten Waldumpfes hin, der vom Wald oft gar nicht ohne weiteres abgetrennt werden kann. Unter den Geoelementen fallen besonders die arktischen Arten auf, die an Anzahl alle anderen erfaßten Pflanzengesellschaften des Gebiets übertreffen.

E) Beschreibung der Einzelgebiete

1. Schapbach (664 ha)

Dieses größte aller Teilgebiete nimmt den NO-Hang des Watzmannmassivs ein. Es erstreckt sich von der Forststraße nördlich der Wimbachbrücke im N bis zum Kederbichl und zur Archenkanzel im S sowie vom Schapbachriedel im NO bis zur Gruben-Alm im SW des Gebietszentrums. Der Höhenbereich liegt zwischen 760 m nahe der Wimbachbrücke und 1700 m am Kederbichl. Im Gebiet eingeschlossen sind Stuben-, Gruben-, Mitterkaser-, Schapbach- und Kühroint-Alm. Außerdem werden hier zwei Wildfütterungen unterhalten.

Im östlichen Teil des Gebiets verläuft von NW nach SO das Schapbachtal mit seinem breiten, wenig geneigten und relativ feuchten Talgrund und ziemlich steilen, etwa 35 bis 45 Grad geneigten, teils felsigen Einhängen in Richtung Schapbachriedel und Mitterkaser-Alm. Die vorherrschende Exposition der Hänge ist, v.a. im nördlichen Teil, N bis NO. Im oberen, südlichen Bereich verebnet sich das Gelände weithin; die Exposition wird hier uneinheitlicher.

Geologisch herrscht im Gebiet Würmmoräne vor. Am Schapbachriedel finden sich Reichenhaller Schichten, die deutlich silikatreichere Karbonatgesteine führen als die Formation des Dachsteinkalks, der im oberen, südlichen Gebietsteil ansteht. Kleine Vorkommen von Haselgebirge finden sich am Nordrand des Gebiets. Vegetationskundlich besonders auffällig sind Gesteine des Jura nordöstlich der Kühroint-Alm. Es finden sich Rote Lias-Mergel, Kiesel- bzw. Hornsteinkalk und Radiolarit.

Die Vegetation des Gebiets ist wie auch in den meisten anderen Teilgebieten in zwei deutlichen Höhenstufen angeordnet. Die untere Stufe im mittleren montanen Bereich wird v.a. vom Weißseggen- und Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald eingenommen. Ausgedehnte Bestände des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes finden sich dabei v.a. auf dem sicher hangschuttbeeinflussten Moränenmaterial im Norden des Gebiets. Unterhalb der Stuben-Alm tritt die Gesellschaft vorwiegend in Form ihrer Reinen Ausbildung auf, die auf offenbar lehmreicherem Substrat von kleinen Flächen ihrer Galium rotundifolium-Ausbildung durchsetzt ist. Recht auffällig sind auch einige ausgedehntere Quellfluren am Nordrand des Gebiets, die evt. auf wasserundurchlässige Partien des Moränenmaterials, möglicherweise aber auch auf Vorkommen des Haselgebirges mit seinen tonig verwitternden Gesteinen hinweisen. In der Umgebung der Stuben-Alm

geht mit zunehmender Meereshöhe die Reine Ausbildung des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes in die Soldanella-Ausbildung über. Sie weist meist deutliche Anzeichen von Beweidung auf.

Charakteristisch für den Schapbachboden ist ein ausgedehntes Vorkommen des relativ feuchtigkeits- und säureliebenden Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes, der im unmittelbaren Einflußbereich des Schapbachs mit - allerdings durchaus noch basischen - Niedermooren in Kontakt steht. Von den angrenzenden Lichtweideflächen der Schapbach-Alm aus dringt Weidevieh in weite Bereiche des Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes ein. Dies wird durch das ebene Gelände noch zusätzlich erleichtert, so daß die Waldvegetation hier deutliche Spuren einer m.o. w. intensiven Beweidung zeigt. Der Wald ist vielfach durchsetzt von kleinen Rasenflecken (*Hypericum maculatum*-Ausbildung des Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes), die vom Vieh und wohl auch vom Rotwild weitgehend baumfrei gehalten werden. Laubbäume haben im gesamten Bereich des Schapbachbodens wohl kaum Verjüngungschancen und treten auch in der Baumschicht nicht auf.

Viel schwerer zugänglich als der Talboden sind naturgemäß die steilen Einhänge des Schapbachtals. Besonders unwegsam ist dabei v.a. der felsige Abhang auf der Westseite des Tales, der weithin vom Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald bestockt ist. Der schweren Zugänglichkeit verdankt diese Waldgesellschaft hier und auch an vielen anderen Stellen ihre naturnahe Ausprägung. Kennzeichen hierfür ist v.a. der Laubholz- - im Schapbachtal speziell der Bergahornreichtum - der Gesellschaft.

Der westexponierte Gegenhang ist im nördlichen Teil, also im Bereich des Schapbachriedels, weithin von der locker von Fichten überstandenen Reinen Ausbildung des Blaugras-Horstseggenrasens bewachsen. Weidezeiger finden sich hier v.a. im unteren, leichter zugänglichen Bereich, nicht dagegen in den felsigen höhergelegenen Partien. Im südlichen Teil des Hanges wurde ein vielfältiges Mosaik von teils relativ schwer anzusprechenden Vegetationseinheiten kartiert. Es entspricht der Vielfalt der hier anzutreffenden Gesteine, unter denen sich neben den verbreiteten Karbonat- auch m.o.w. saure, tonig verwitternde Gesteine des Lias befinden, die für die Ausbildung von Quellfluren und azidophilen Waldgesellschaften verantwortlich sind. Kompliziert werden die Verhältnisse noch durch zahlreiche Schlagfluren in diesem Bereich.

In der hochmontanen Stufe dominiert im Schapbachgebiet und auch andernorts der Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald in seinen verschiedenen Ausbildungen. Seine Baumschicht wird heute in allen Teilgebieten weitgehend von der Fichte aufgebaut. Speziell im Schapbachgebiet

spielt hier jedoch auch die Lärche eine größere Rolle, die evt. im Interesse der Weidewirtschaft künstlich gefördert wurde. Der Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald des Schapbachgebiets scheint dabei allgmein und flächenmäßig wenig differenziert beweidet zu sein. Im Umkreis der Kühroint-Alm ist er außerdem durch größere Schlag- bzw. Windwurf-flächen gestört.

Mit zunehmender, wohl wiederum weidebedingter Auflichtung geht der Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald vielerorts in die *Luzula sylvatica*-Ausbildung des Horstseggenrasens über. An offenbar besonders schneereichen Nordhängen oder in ausgedehnten, vom Kaltluftstau betroffenen Muldenlagen, wie sie am Fuß des Mooslahnerkopfes recht auffällig in Erscheinung treten, wird der Wald dagegen von einer grünerlen- und teils auch weidenreichen Ausprägung des Schneeheide-Alpenrosenbusches abgelöst. Auf kleiner Fläche, v.a. am Kederbichl, wurden auch Lat-schengebüsche angetroffen, die jedoch schon im subalpinen Bereich angesiedelt sind.

Besonders auffällig ist im hochmontanen Bereich des Schapbachgebiets das Vorkommen des ausgesprochen bodensauren und artenarmen Alpenlattich-Fichtenwaldes, der auf relativ kleiner Fläche nordöstlich der Kühroint-Alm erfaßt wurde, in Richtung Herrenroint jedoch zweifellos noch in größeren Beständen vorkommen dürfte. Er besiedelt saure Liasgesteine und bildet v.a. auf Radiolarit besonders artenarme Bestände.

2. Eckau (387 ha)

Das Eckaugebiet nimmt im wesentlichen den NW-Abhang des Hochkalter ein. Sein Hauptteil wird vom Fendtgraben im W, von der Oberkante des Wimbachtales im O und vom Wildzaun an der Nationalparkgrenze im N umschrieben. Im S reicht es bis zur Waldgrenze im Bereich der Hoch-Alm. Es biegt dort nach O zum Wimbachtal hin ab, überquert dieses im Bereich des Bachaustritts aus dem Wimbachgries und zieht sich jenseits der Alpelwand bis zur Schütt-Alm hinauf. Im Zentrum des Gebiets liegen die Eckau-Alm und eine nördlich davon angelegte Wildfütterung. Die Höhe des Gebiets reicht von 766,3 m (Wimbachtal) bis etwa 1500 m (Hoch-Alm).

Der Hauptteil des Gebiets wird zentral von einer N-S verlaufenden, m.o.w. ausgeprägten Talsenke durchschnitten, in der die Eckau-Alm liegt. Die Exposition der Hänge variiert in diesem Gebietsteil zwischen NO, N und NW. Südlich der Eckau-Alm wird das Gelände ausgesprochen steil und

felsig. Der Abbruch zum Wimbachtal erfolgt sogar weithin über senkrechte Felswände.

Geologisch ähnelt das Gebiet dem vorhergehenden. Es wird im nördlichen Teil vorwiegend von Würmmoräne eingenommen. Südlich der Eckau-Alm stehen im Halbkreis silikatreiche Juragesteine wie Roter Liaskalk sowie Kiesel- bzw. Hornsteinkalk des Lias an. Silikatreich sind auch kleine Haselgebirgsvorkommen am Nordrand und schon etwas außerhalb des Gebiets. In den südlichen Bereichen findet sich auch anstehender Dachsteinkalk auf größerer Fläche. Der Talgrund des Wimbachtales wird von den rezenten Schuttmassen des Wimbachgrieses erfüllt.

Die Vegetation des Eckau-Gebietes weist trotz ähnlicher Geologie doch charakteristische Unterschiede gegenüber dem Schapbach-Gebiet auf. Auf dem Moränenmaterial der unteren Höhenstufe sind insgesamt gesehen weder Weißseggen- noch Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald mehr so typisch ausgebildet. In beiden Gesellschaften treten hier die Galium rotundifolium-Ausbildungen stärker in den Vordergrund. Die Bodenvegetation des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes leidet hier unter einem höheren Dichtschluß der forstwirtschaftlich bedingten reinen Fichtenbestände. Aufgrund geringeren Alters oder auch schlechterer Wüchsigkeit sind die Bestände hier der Dickungsphase insgesamt noch nicht so weit entwachsen wie im Schapbach-Gebiet und teils noch so dicht, daß hier weithin nur die uncharakteristische Fichten-Ausbildung des Reinen Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes kartiert werden konnte. Typische und nicht nur auf schwer ansprechbare Schlagfluren beschränkte Vorkommen der Soldanella-Ausbildung des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes fehlen im Eckau-Gebiet weitgehend. Dieser rostseggenreichen, eher lichtbedürftigen Gesellschaft fehlt es hier offenbar an weidebedingten Auflichtungen.

Was den auf der Karte dargestellten Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald untypisch macht, ist sein Vorkommen im hängigen Gelände. Ob v.a. die größeren Bestände im Westteil des Gebiets nicht eher als vom Dichtschluß der Fichte in Mitleidenschaft gezogener Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald aufzufassen sind und evt. ebenfalls besser als Fichtenausbildung des Reinen Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes hätten dargestellt werden sollen, ist ungewiß. Im untersten Teil des Gebiets und größtenteils außerhalb der kartierten Fläche und des Nationalparks wird das Ausgangsgestein dagegen offenbar zunehmend silikatreicher und liefert lehmigere Böden. Bestände des Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes sind hier durchaus typisch ausgebildet und gehen - vermutlich auf

Haselgebirge - sogar in den relativ bodensauren Labkraut-Buchen-Tannenwald über. In diesen Bereichen lehmigerer Substrate im untersten Gebietsteil finden sich auch das grauerlenreiche Stadium des Ahorn-Eschenwaldes (etwas außerhalb des Gebiets) und kleine Quellfluren.

Eine Besonderheit stellt in den unteren Lagen des Eckau-Gebiets die Vegetation des Wimbachtales dar, die auch schon von THIELE (1978) bearbeitet wurde. Auf lockerem Blockschutt am Fuß der Felswände finden sich hier kleine Vorkommen des Hirschzungen-Bergahornwaldes und der näher damit verwandten Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft, die ihre Hauptverbreitung im Königsseebereich besitzt. Auf ähnlichen, aber noch weniger gereiften Standorten siedeln kleine Bestände der Schildampferflur. Auf den Schotterfeldern des Wimbachgrieses entwickelte sich dort, wo der Schutt seit genügend langer Zeit zur Ruhe gekommen ist, eine Tieflagenform des normalerweise alpinen Polsterseggenrasens.

In der oberen Höhenstufe des Eckau-Gebiets dominiert der laubholzreiche Ahorn-Buchenwald auffällig über den fichtenreichen Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald. Der Ahorn-Buchenwald tritt v.a. zwischen Eckau- und Hoch-Alm großflächig in Erscheinung und wird offensichtlich durch den hier anstehenden silikatreichen Roten Liaskalk gefördert. Seine Standorte sind z.T. schwer zugänglich. Mit aus diesem Grund konnten sich hier wohl einerseits buchen- und bergahornreiche Waldbestände erhalten. Andererseits konnten trotz nahegelegener Almen weithin auch kaum Weidezeiger festgestellt werden. Oberhalb der Hoch-Alm steht der Ahorn-Buchenwald in Kontakt mit m.o.w. baumfreien Hochstaudenfluren (v.a. der Heliosperma-Ausbildung der Alpendostflur) und feuchteren, lärchen- und teils auch grünerlenreichen Ausbildungen des Schneeheide-Alpenrosenbusches.

3. Gotzenthal (153 ha)

Die Grenzen des unvollständig kartierten Gotzenthalgebiets werden von Königssee, Abwärtsgraben, Priesberg-Alm und Kesselbach gebildet. Im Zentrum liegt die Gotzenthal-Alm. Aufnahmen liegen auch noch östlich der Priesberg-Alm im Bereich der Mooswand. Das kartierte Gebiet umfaßt den Höhenbereich von 603 m (Königssee) bis 1460 m (Priesberg-Alm); es herrschen W-exponierte Hänge vor. Die Hangneigung ist im Bereich der Königsseehänge mit etwa 45 Grad am größten. In den höhergelegenen Gebiets teilen im O nimmt sie auf durchschnittlich 20 Grad ab.

Geologisch herrscht Würm-Lokalmoräne vor. Daneben finden sich Dachsteinkalk und Ramsa dolomit. Reichenhaller Schichten und Muschelkalk stehen im Bereich der Torrener Joch-Störungslinie an, an die sich auch der Verlauf des Kesselbaches hält. Stellenweise tritt auch Haselgebirge an die Oberfläche, dem evt. ein vorgefundenes lokales Gipsvorkommen angehört. Kiesel- bzw. Hornsteinkalk des Lias nehmen im Bereich der Priesberg-Alm größeren Einfluß auf die Ausbildung der Vegetationsdecke.

Die Vegetation in der unteren Höhenstufe des Gotzenthals-Gebiets wird grobenteils von ausgesprochen untypischen Ausbildungsformen des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes eingenommen: Auf dem anstehenden Dachsteinkalk der Steilhänge zwischen Gotzenthals-Alm und Königssee wurde die *Luzula luzulina*-Ausbildung kartiert - eigentlich eine Übergangsausbildung zum Hainsimsen-, hier im steilen, felsigen Gelände wohl eher ein Übergang zum Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, der auch seinerseits in größerem Umfang kartiert wurde. Der Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald tritt auf den genannten Steilhängen teils in recht buchenreicher Form in Erscheinung, die sich wohl wie so oft aufgrund schwerer Zugänglichkeit erhalten hat. Auf der Würm-Lokalmoräne in der Umgebung der Gotzenthals-Alm wurde der Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald fast nur in Form ausgedehnter Schlagfluren kartiert, deren Parallelisierung mit bestimmten Waldgesellschaften allgemein schwierig ist.

Stellenweise recht auffällig, wenn auch nicht kartiert, sind in den Hanglagen zwischen Königssee und Gotzenthals-Alm kleinere, und teils auch etwas außerhalb des kartierten Gebiets liegende Vorkommen des humussaurer Block-Fichtenwaldes. Er scheint hier durch Dolomit der Reichenhaller Schichten besonders gefördert zu werden, der aufgrund seiner schweren Löslichkeit nur wenig Basen anliefert.

Charakteristisch für die tiefsten Lagen des Gotzenthals-Gebiets ist die thermophile, auf luftfeuchtes Klima angewiesene Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft. Sie entfernt sich hier nur wenig vom Königsseeufer. Ökologisch und floristisch ähnelt sie etwas dem Hirschzungen-Bergahornwald. Nahe der Haltestelle Kessel fand sich auch ein kleiner Bestand, der evt. dieser Waldgesellschaft hätte zugeordnet werden können. In typischerer Form kommt der Hirschzungen-Bergahornwald außerdem im Abwärtsgraben vor.

Lehmreichere, relativ feuchte Böden bevorzugt der Ahorn-Eschenwald i.e.S. der wie die beiden vorgenannten Gesellschaften zu den Edellaubwäldern zählt. Ein ziemlich großes Vorkommen seiner Eschen-Ausbildung wurde in etwa 900 m Meereshöhe im Bereich einer Hangmulde vorgefunden. Der Bestand wird vom Bergahorn dominiert; Esche ist (zumindest auf der Aufnahme fläche) viel weniger zahlreich.

Wie der Ahorn-Eschenwald bevorzugt auch der Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald lehmreichere, allerdings durch Fichtenreichtum seiner Bestände etwas zur Versauerung neigende Böden. Er wurde auf kleiner Fläche am Rand der Gotzenthalm-Alm vorgefunden. Seine Bestände stocken hier typischerweise auf relativ ebenen Standorten. Weidezeiger sind trotz Altnähe nicht allzu zahlreich; möglicherweise sind die Fichtenbestände hier zu dicht, um eine ausreichende Lichtversorgung dieser Arten zu gewährleisten.

Noch azidophiler als der Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald erscheint der Labkraut-Buchen-Tannenwald, der nördlich der Gotzenthalm-Alm auf kleiner Fläche vorkommt. Er weist möglicherweise auf Tonschiefer des Haselgebirges hin, zumal in seiner Nähe das erwähnte Gipsvorkommen festgestellt wurde. Zahlreiche Quellfluren im Osten der Gotzenthalm-Alm deuten gleichfalls auf tonreiche, wasserstauende Gesteinspartien hin.

In der oberen Höhenstufe mit ihren vergleichsweise wenig geneigten Hängen dominiert auch im Gotzenthalmgebiet der für die höheren Lagen allgemein typische Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, v.a. in seiner Reinen Ausbildung. Er ist hier gekennzeichnet durch eine recht dicht geschlossene Baumschicht aus Fichte, die meist keine allzu üppige Bodenvegetation aufkommen läßt. Deshalb sind auch Weidezeiger nur in kleinen Auflichtungen zahlreicher vertreten.

Typisch für die silikatreichen, tonig verwitternden, teils m.o.w. sauren Gesteine in der Umgebung der Priesberg-Alm - freilich schon etwas außerhalb des kartierten Bereichs - sind u.a. Grünerlengebüsche, die hier steile Nordhänge besiedeln. Auch der Frauenfarn-Alpenlattich-Fichtenwald tritt auf den genannten Gesteinen auf. Über der aktuellen Waldgrenze, und deshalb nicht mehr erfaßt, dehnen sich große Heidelbeerbestände aus. Sie scheinen auf Radiolarit beschränkt zu sein und bilden wohl eine Ersatzgesellschaft des Alpenlattich-Fichtenwaldes.

4. Jennerbahn (90 ha)

Dieses Teilgebiet liegt außerhalb des Nationalparks. Es erstreckt sich beiderseits der Jennerbahn vom Ortsrand Königssee bis zur Mittelstation der Seilbahn. In O-W-Richtung wird es von einer Skiabfahrt durchquert. Die Meereshöhe des Gebiets liegt zwischen 700 und 1270 m, die Exposition der Hänge schwankt zwischen W und NW.

Reichlich vertreten sind im Gebiet silikatreiche Gesteine des Jura, wie Lias-Fleckenmergel und Kiesel- bzw. Hornsteinkalk derselben Formation. Auch Dogger- und Kiesel- bzw. Spatkalke treten auf. Weitverbreitet sind außerdem Moränen, die wohl größtenteils aus den genannten Juragesteinen gebildet wurden. Im tiefergelegenen Bereich steht etwas Dachsteinkalk an.

Die Vegetation des Teilgebiets beschränkt sich weitgehend auf Einheiten der unteren Höhenstufe. Es dominiert v.a. im tiefergelegenen Bereich der Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald - unterbrochen von dichten Fichtenbeständen, die aufgrund spärlicher Bodenvegetation nur der Fichtenausbildung des Reinen Hainlattich-Tannen-Buchwaldes zugeordnet werden konnten. Die Nähe des Königssees macht sich noch im Auftreten kleinerer Bestände der Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft bemerkbar. Die sporadisch im ganzen Gebiet vorzufindenden silikatreichen, lehmige Böden liefernden Gesteine haben allenthalben die Ausbildung von relativ azidophilen und feuchte- bzw. nässeliebenden Gesellschaften zur Folge. Azidophil ist der Labkraut-Buchen-Tannenwald, der allerdings vorwiegend in Form von Schlagfluren angetroffen wurde, deren Zuordnung auch hier wieder zweifelhaft ist. Auf Staukörper im Untergrund weisen relativ großflächige Quellfluren bzw. Kalkflachmoore hin. An seiner Nordgrenze wird das Teilgebiet Jennerbahn von Schluchtwäldern gesäumt, die dem luftfeuchten Lokalklima des Krautkasergrabens ihre Entstehung verdanken.

Waldweide scheint mit Ausnahme der unmittelbar an Almlichten grenzenden Bestände im gesamten Gebiet von untergeordneter Bedeutung zu sein. Menschliche Einflüsse beschränken sich hier offenbar weitgehend auf forstliche Maßnahmen, wie den Ersatz von Laubholz durch Fichte und den Holzeinschlag, der zur Ausbildung der genannten Schlagfluren führte. Der Einfluß der Skifahrer bleibt zumindest im kartierten Bereich weitgehend auf die nicht näher untersuchte Abfahrtsstrecke begrenzt.

5. St. Bartholomä (165 ha)

Diese Teilfläche nimmt die gesamte vom Eisbach aufgeschüttete Halbinsel von St. Bartholomä ein. Das Gelände ist hier m.o.w. eben und erleichterte damit die Anlage einer kleinen Ansiedlung mit landwirtschaftlich genutztem Grünland. Auch eine größere Wildfütterung findet sich in diesem Bereich.

Nach NW zieht sich das Kartierungsgebiet bis zur orographischen Waldgrenze in etwa 1000 m Meereshöhe den Palfenlahner hinauf; nach W folgt es über teils blockschuttreiches Gelände dem Verlauf des Eisbaches bis in 1 km Entfernung von der Eiskapelle.

Geologisch ist das Gebiet zum allergrößten Teil von den Ablagerungen des Eisbaches geprägt, deren Sedimentation gegenwärtig im Südteil der Halbinsel erfolgt, wo sich große Schotterfelder befinden. Daneben tritt etwas anstehender Dachsteinkalk und -dolomit auf.

Ähnlich dem Teilgebiet Jennerbahn treten in St. Bartholomä nur Gesellschaften der unteren Höhenstufe auf. Am weitesten verbreitet ist hierbei die Eschen-Ausbildung des Reinen Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes, eine Waldgesellschaft, die aufgrund der geringen Meereshöhe der meisten Standorte in St. Bartholomä bereits gewisse Merkmale submontaner Wälder aufweist. Der Reichtum der Gesellschaft an Buche und ihre Armut an Fichte ist dabei sicher nicht nur durch die Höhenlage bedingt; die Buche wurde vielmehr in St. Bartholomä weithin durch die Forstwirtschaft gefördert - evt. noch über den ihr von Natur aus zukommenden Anteil hinaus. Trotzdem macht die Eschen-Ausbildung des Reinen Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes einen relativ naturnahen Eindruck und ist auch nur in der Umgebung der Wildfütterung deutlich beweidet. Durchsetzt ist die Gesellschaft stellenweise und v.a. am Rand der Mähwiesen und des Siedlungsbereiches von kleinen Flächen des feuchtigkeits- und in St. Bartholomä auch besonders stickstoffliebenden Ahorn-Eschenwaldes i.e.S.. Dessen Baumschicht ist im Gegensatz zu den meisten anderen erfaßten Vorkommen hier tatsächlich auch reich an den namengebenden Baumarten.

Der Reine Hainlattich-Tannen-Buchenwald tritt im westlichsten Abschnitt des Gebiets im Bereich von Dachsteindolomitvorkommen auch in seiner artenarmen Buchenfazies und hier wieder in deren etwas azidophiler *Vaccinium myrtillus*-Fazies auf. In ihrer Nachbarschaft fanden sich kleine Alpenrosenbestände. Ein nahegelegenes Bergsturzgebiet westlich von St. Johann und Paul besiedelt der Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchen-

wald in buchen- z.T. aber auch fichtenreicher Ausprägung.

Im Norden des Teilgebiets - mitunter im Kontakt mit waldfreien Felsfluren - gibt es Vorkommen der für das Königsseegebiet allgemein charakteristischen Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft. Typisch für St. Bartholomä ist dabei v.a. die Buphthalmum-Ausbildung mit *Molinia*, die im gegenüberliegenden Gotzenthälgebiet weniger auftritt. In Kontakt mit der Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft steht in der Umgebung des Rinnkendlsteiges die thermophile *Molinia*-Ausbildung des Horstseggenrasens mit *Allium*. Sie besiedelt teilweise recht felsiges Gelände und ist möglicherweise brandbeeinflusst.

Rasengesellschaften sind auch im Süden der Halbinsel auf den jungen Aufschüttungen des Eisbaches verbreitet. Als Bewuchs wenig gereifter Schotterböden findet sich hier die *Salix elaeagnos*-Ausbildung der Tief lagenform des Polsterseggenrasens. Sie ist locker von Fichte überstanden und wohl als Folgestadium des gleichfalls hier verbreiteten Lavendelweidengebüsches anzusehen. Neben Rasen- und Gebüschgesellschaften finden sich im Aufschüttungsbereich des Eisbaches auf recht großer Fläche auch frisch überschotterte Bergahornbestände. In deren Schatten haben sich Kalkschuttfluren in einer artenverarmten und relativ nährstoffliebenden Form ausgebildet.

6. Röth (246 ha)

Das Teilgebiet Röth reicht vom Obersee im N bis zur Wasser- und Schabau-Alm im S. Es wird durch die Röthwand in zwei sehr unterschiedliche Teilbereiche gegliedert. Der tiefergelegene Teil im Umkreis der Fischunkel-Alm wird v.a. von Hangschuttmassen und den Sedimenten des Röthbaches eingenommen. Die Meereshöhe liegt hier zwischen 620 und 900 (1000) m. Die Geländeformen sind relativ ausgeglichen. Der ganze untere Abschnitt des Teilgebietes Röth bildet einen WNW-OSO verlaufenden Taleinschnitt mit entsprechend teils mehr nord- und teils mehr südexponierten Hängen.

Der Bereich der eigentlichen Röth südlich und oberhalb der Röthwand in 1200 - 1580 m Höhe wird von anstehendem Dachsteinkalk eingenommen. Das Gestein ist hier stark zerklüftet und läßt ein reich gegliedertes Relief entstehen. Relativ trockene Plateaus wechseln ab mit feuchten Mulden; hohe Felsabbrüche erschweren die Begehung des Geländes. Exposition und Neigung der Hänge sind recht uneinheitlich; nördliche Expo-

sitionen überwiegen jedoch.

Entsprechend der fast treppenartigen Stufengliederung des Teilgebiets Röth sind auch die Vegetationsstufen hier ungewöhnlich scharf voneinander abgesetzt. Im unteren Bereich dominiert westlich und nördlich der Fischunkel-Alm der allgemein von der Fichte geprägte Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald. Er findet hier die für ihn typischen wenig geneigten Standorte vor. Im Talgrund tritt stellenweise seine feuchte Ausbildung auf. In seinen Randbereichen - dort, wo das Gelände steiler anzusteigen beginnt und teils in Felswände übergeht - wird er von Beständen der Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft umsäumt. Auf grobblockigem Hangschutt lösen ihn laubholzreiche Bestände des Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes ab.

In ungewöhnlich großen, wenn auch nicht allzu typisch ausgeprägten Beständen ist sowohl am Obersee als auch am Ostrand der Fischunkel-Alm der Hirschzungen-Bergahornwald vertreten. Er besiedelt, wie es typisch für ihn ist, v.a. die wenig gefestigten Schutthalden am Fuß von Steilwänden. Zumindest östlich der Fischunkel-Alm könnte sein Substrat evt. durch periodisch bei Starkregen auftretenden Oberflächenabfluß in Bewegung gehalten werden. Dies mag der Grund dafür sein, daß hirschzungenreiche Bestände hier recht weit auf relativ ebenes Gelände vorstoßen.

Die Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft besitzt auf den Steilhängen östlich der Fischunkel-Alm besonders ausgedehnte Vorkommen. Sie steht hier in engem Kontakt mit der floristisch verwandten *Molinia*-Ausbildung des Horstseggenrasens mit *Convallaria*, einer relativ thermophilen, zugleich aber offenbar auf Hangzugswasser angewiesenen Rasengesellschaft felsiger Standorte.

Die hochmontane Stufe des Teilgebiets - also die eigentliche Röth - ist wieder v.a. durch den fichtenreichen Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald gekennzeichnet. Daneben sind hier jedoch auch bergahornreiche Bestände des Ahorn-Buchenwaldes ausgesprochen häufig. Sie weisen auf insgesamt größere Naturnähe der Wälder in der Röth hin, die zweifellos auf das etwas abgelegene, bringungsungünstige Vorkommen zurückzuführen ist.

Die räumliche Struktur der Vegetation in der Röth ist stark durch das feingegliederte Relief bestimmt. Der Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald bzw. Ahorn-Buchenwald durchschnittlicher Standorte wird auf tangelhumusreichen Felsrippen von azidophilen, v.a. der Hochlagenform der Karbonat-Fichtenwälder zuzurechnenden Gesellschaften ersetzt. Relativ saure Böden besiedelt auch die kleinfächig eingestreute Reine *Lyc-*

podium-Ausbildung des Schneeheide-Alpenrosenbusches. Sie tritt in der Röth häufig in grünerlenreicher Form auf und scheint auf feinerdereichere und deshalb auch besser wasser- und nährstoffversorgte, evt. auch schneereichere Standorte hinzuweisen als der floristisch ähnliche Karbonat-Fichtenwald. In den feuchteren, besonders nährstoffreichen Mulden treten dagegen - teilweise auch auf größerer Fläche - baumfreie Hochstaudenfluren auf. Regelmäßig eingestreute kleine Verlichtungen des Waldes an trockeneren Standorten werden vom Horstseggenrasen in seiner auf die höheren Lagen beschränkten *Luzula sylvatica*-Ausbildung besiedelt.

Deutliche Anzeichen von Waldweide lassen sich im gesamten Teilgebiet Röth offenbar fast nur in den höheren Lagen feststellen, obwohl sich hier im Gegensatz zum tiefergelegenen Gebietsteil heute keine bestoßenen Almen mehr befinden. Hierfür mag der hohe Dichtschluß der Fichtenbestände in der Umgebung der Fischunkel-Alm verantwortlich sein, der den Weidezeigern im Unterschied zu den allgemein lichterem Hochlagenwäldern der eigentlichen Röth zu ungünstige Lebensbedingungen bietet. Die Beweidung der Hochlagen wird nach Auflassung der Almen heute v.a. vom Rotwild fortgeführt.

7. Hirschbichtal II (218 ha)

Im südlichen Hirschbichtal wurde das Gebiet zwischen Sulzenstein im W und Hocheiskopf im O kartiert. Im S und SW grenzt das Areal an Mittereis- und Bind-Alm, im N an die Engert-Alm. Die Meereshöhe liegt zwischen 960 und 1699 m.

Der westliche Bereich wird in N-S Richtung vom Klausbach durchflossen; sein Bett ist z.T. schluchtartig eingeschnitten. Der Klausbach teilt das Gebiet in zwei sehr unterschiedliche Teilbereiche. Im Ostteil dominiert oben der anstehende, stark zerklüftete Dachsteinkalk. In den tieferen Lagen, durch einen N-S-verlaufenden Felsabbruch von etwa 50 m Höhe scharf abgesetzt, bildet Hangschutt - teils in Form von Bergsturmassen - das geologische Ausgangssubstrat.

Westlich des Klausbachs herrschen Dolomite vor. Es handelt sich um Ramsaudolomit und Dolomit der Reichenhaller Schichten. Das Gestein bildet teils schroffe Geländeformen mit scharfen, intensiv verwitternden Felsnasen und grusigen Schutthalden.

Am Nordende des Gebiets finden sich auf kleiner Fläche Gesteine der Unterkreide: mehr westlich Roßfeldschichten, die Almweiden tragen, im O Schrambachschichten.

Was das Lokalklima anbetrifft, so dürfte das gesamte Hirschbichtal in besonderem Maße föhnbeeinflusst sein. Im Unterschied zu anderen m.o.w N-S-verlaufenden Tälern in den übrigen Teilgebieten ist das Hirschbichtal nach S weitgehend offen und bietet damit südlichen Luftströmungen einen erleichterten Zutritt. Der von SW nach NO gerichtete Talverlauf liegt zudem genau in der bevorzugten Richtung der Föhnströmungen.

In der Vegetation des Teilgebiets dominieren sicher z.T. aus klimatischen Gründen allgemein schneeheidereiche Gesellschaften. Westlich des Klausbaches wird diese Tendenz noch durch das dolomitische Ausgangsgestein verstärkt. Hier besitzt deshalb auch der Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald das wichtigste Vorkommen aller Teilgebiete. Er ist höhenstufenmäßig nicht ohne weiteres einzuordnen, tendiert aber mehr zur unteren Stufe. Sein Buchenreichtum weist ihn als recht naturnahe Waldgesellschaft aus; v.a. an Nordhängen finden sich dichtgeschlossene Buchenhochwälder. Anzeichen von Beweidung finden sich nur im Kontakt zur Lichtweidefläche der Bind-Alm; hier scheint auch die Fichte auf Kosten der Buche begünstigt zu sein. Der Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald ist regelmäßig von Beständen der Tieflagenform des Schneeheide-Alpenrosenbusches durchsetzt. Er besiedelt v.a. in seiner typischeren, latschenreichen Ausbildung extremere, felsige Geländepartien. Die dem Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald selbst noch sehr nahestehende latschenfreie Ausbildung besiedelt im typischen Fall nur etwas lichtere Stellen in den Waldbeständen.

Im Gebiet östlich des Klausbaches dominieren auf den grobblockigen Hangschuttmassen in der unteren Höhenstufe fichtenreiche Bestände des Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Laubholz tritt nur stellenweise auf. An lehmigeren Hängen in Talnähe gibt es kleine Bestände des Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Was an Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald kartiert ist, dürfte wohl nicht allzu typisch ausgebildet sein; es handelt sich meist nur um Schlagfluren und die rasenartige Lotus-Ausbildung. Der Weideeinfluß ist hier - bedingt durch den Kontakt mit den Lichtweiden von Bind- und Mittereis-Alm - recht stark.

Luftfeuchtes Klima und relativ feinerdereiche Böden prägen den tan-

nenreichen Schluchtwald im Tal des Klausbaches. In seiner Nachbarschaft finden sich auf sauren Gesteinen der Kreide teils spezielle Ausbildungen des Labkraut-Buchen-Tannenwaldes, teils Borstgrasrasen. Ersterer stockt auf Schrambachschichten. Besonders charakteristisch ist im Gebiet seine feuchte bis nasse Subassoziatio von *Equisetum sylvaticum*, die in einem Quellgebiet auftritt. Der Borstgrasrasen siedelt auf Roßfeldschichten am Rand der Bind-Alm.

Die hochmontane bis subalpine Höhenstufe des Teilgebiets unterscheidet sich von den Hochlagen aller anderen Gebiete durch das großflächige Auftreten der *Erica*-Ausbildung des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes und der *Luzula sylvatica*-Ausbildung des Karbonat-Fichtenwaldes. Die *Erica*-Ausbildung als etwas trockenere und z.T. humussaure Einheit des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes tritt v.a. an süd-, aber auch an westexponierten Hängen auf. Sie ist wohl in besonderem Maße föhnbeeinflusst. Ihre Bestände sind recht licht und weithin mit Weidezeigern angereichert. Verantwortlich für die Beweidungsspuren dürfte dabei heute ausschließlich das Rotwild sein.

Mehr nordwestliche Exposition nimmt demgegenüber der auffallend humussaure Karbonat-Fichtenwald ein. Er wird mit zunehmender Meereshöhe lichter und reicher an Lärche, Zirbe und Alpenrose; der Weideeinfluß scheint in gleicher Weise zuzunehmen. Die Gesellschaft steht in engem Kontakt mit größeren Latschenfeldern, die offenbar besonders flachgründige oder hochgelegene Felsstandorte bevorzugen.

8. Hirschbichtal I (320 ha)

Das Kartierungsgebiet im nördlichen Hirschbichtal reicht von der Halsgrube im NW bis zur Grubermahd-Diensthütte im SO. Im vom Klausbach durchflossenen Talgrund umfaßt es den weiteren Bereich zwischen Lahnwald-Diensthütte und der nördlich davon befindlichen Wildfütterung. Die Meereshöhe reicht von 805 m im Talgrund bis 1600 m im Bereich oberhalb der Ofental-Diensthütte.

An den relativ einheitlich 35 Grad geneigten NW-Hängen im SO-Teil des Gebietes steht oben weithin Dachsteinkalk an. Mehr in Talnähe finden sich Lias-Fleckenmergel und Roter Liaskalk. An den SW-Hängen der anderen Talseite kommen wie im südlichen Hirschbichtal Ramsadolomit und Dolomit der Reichenhaller Schichten auf größerer Fläche vor und bilden teil-

weise ungangbare Felsgebiete. Am weitesten verbreitet sind jedoch Hangschuttmassen. Kleinflächig stehen im unteren Bereich Werfener Schichten an. Der breite, weitgehend ebene Talgrund ist von jungen Sedimenten erfüllt. Sie scheinen weithin aus Dolomitgrus zu bestehen.

Wie im südlichen Hirschbichtal dürfte klimatisch der Föhn wieder eine besondere Rolle spielen und manche Eigentümlichkeit der Vegetation erklären.

Ein besonders charakteristischer Vegetationsbestandteil ist hierbei der zweifellos föhngeprägte Weißseggen-Fichtenwald des ebenen Talgrundes. Er weist allerdings trotz des erhöhten Föhneinflusses und auch trotz seines wasserdurchlässigen dolomitischen Ausgangssubstrats noch deutliche Anzeichen größerer Standortsfeuchtigkeit auf. Die Bodenvegetation ist relativ azidophil; trotzdem entsprechen die heute fichtenreichen Bestände sicher nicht dem Naturzustand. Reicher Laubholzjungwuchs innerhalb von Zäunen beweist eine starke verbißabhängige Benachteiligung der Laubbäume zugunsten der Fichte. Die Weideintensität ist sicher hoch, denn das Gebiet ist leicht zugänglich und durch die Futterstelle werden im Winter auch Wildtiere angelockt. Die Belastung der Waldvegetation wird nun zwar beim Vergleich der straucharmen, grasreichen Bestände außerhalb der Zäune mit den innerhalb der Zäune vorgefundenen Jungwuchsdickichten sofort deutlich. Trotzdem findet man in der Bodenvegetation nicht sehr viele Weidezeiger. Möglicherweise ist deren Nährstoffversorgung hier unzureichend. In der Karte wurde deshalb hier eine höhere Weideintensität verzeichnet, als der Menge der Weidezeiger eigentlich entsprechen würde.

In engem Kontakt mit dem Weißseggen-Fichtenwald steht die relativ azidophile Biscutella-Ausbildung des Polsterseggenrasens. Sie bildet den blumenreichen Bewuchs flachgründiger Böden auf offenbar jungen, vor der Regulierung des Klausbaches aufgeschütteten Bachsedimenten. Offensichtlich ist sie im Begriff, sich zum Weißseggen-Fichtenwald weiterzuentwickeln. Da frische Sedimentaufschüttungen heute kaum mehr vorkommen können, wird die Gesellschaft aus dem Hirschbichtal wohl langsam verschwinden.

Die Vegetation der südostexponierten dolomitreichen Hänge wird im wesentlichen vom Weißseggen- und Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald sowie einem vergleichsweise fichtenreichen Horstseggenrasen gebildet. Die übliche Höhenstufengliederung ist hier nicht erkennbar, auch wenn der Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald offenbar nur den

oberen Hangteil bestockt. Die Vegetationseinheiten des undeutlich beweideten unteren Hangbereichs sind meist nicht besonders charakteristisch ausgebildet. Der Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald beschränkt sich weitgehend auf Schlagfluren. Seine Föhnbeeinflussung könnte sich im Vorkommen von Adlerfarn äußern, der jedoch als alleinige Differentialart keine Aufstellung einer weiteren Einheit rechtfertigte. Untypisch ist weiterhin auch der hier kartierte Horstseggenrasen; er besitzt nicht nur eine etwas zu dichte Baumschicht, sondern ist auch an Differentialarten weithin etwas verarmt. Reichlich vertreten ist noch das Ochsenauge (*Bupthalmum salicifolium*), das jedoch mit dem Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald verbindet, dem die Bestände zumindest teilweise wohl durchaus zugeordnet werden könnten. Durchzogen wird dieser Horstseggenrasen von Grauerlenbeständen. Sie besiedeln felsige, meist trockenliegende Abflußrinnen.

Bestände des Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes wurden, wie erwähnt, nur im oberen Hangbereich kartiert. Sie sind wie im südlichen Hirschbichtal buchenreich und wie dort werden wieder die Nordhänge von geschlossenem Buchenhochwald bestockt. Charakteristisch ist auch wieder der Kontakt dieser Waldgesellschaft mit Latschengebüsch. Zwischen den Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald und die Bestände des Horstseggenrasens im unteren Hangteil legt sich ein undurchdringlicher Komplex scharf zerklüfteter Dolomitfelsen, der neben Felsspaltengesellschaften auch kleinflächige Bestände von Horstseggenrasen beinhaltet.

Auf den Werfener Schichten am Hangfuß tritt kleinflächig, aber in seiner Eigenart doch recht auffällig, der Bach-Grauerlenwald auf. Seine Böden sind naß, lehmig und wenig stabil. Die Gesellschaft steht in Kontakt mit der *Cardamine trifolia*-Ausbildung des Labkraut-Buchen-Tannenwaldes, die in Form von Schlagfluren auf der gegenüberliegenden Talseite auf Lias-Fleckenmergel bzw. -kalk weiter verbreitet ist.

Auf der südöstlichen Talseite ist die gewohnte Höhenstufengliederung - nicht zuletzt wegen der größeren Höherenstreckung - deutlicher. Im untersten Hangbereich finden sich noch Spezialgesellschaften: neben dem schon erwähnten Kahlschlagstadium des Labkraut-Buchen-Tannenwaldes der Ahorn-Eschenwald und der Grauerlen-Auwald. Der Ahorn-Eschenwald besiedelt wohl ähnlich tiefgründige Substrate wie die *Cardamine trifolia*-Ausbildung des Labkraut-Buchen-Tannenwaldes. Nur die Wasserversorgung ist bei ihm offensichtlich reichlicher.

Der Grauerlen-Auwald ist auf der südöstlichen Talseite zwar nur auf kleiner Fläche, dafür aber in seiner typischsten Ausprägung vertreten.

Er besiedelt meist den unmittelbaren Uferbereich des Klausbaches, stockt stellenweise aber auch im Unterhangbereich auf steinigem Hangschutt.

Reichlich vertreten sind im unteren Hangbereich undurchdringliche Jungholzdickungen mit spärlicher Bodenvegetation, die der Fichten-Ausbildung des Reinen Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes zugerechnet wurden, an einer Stelle aber auch laubholzreich sind. Sie scheinen teilweise auf Standorten der *Cardamine trifolia*-Ausbildung des Labkraut-Buchen-Tannenwaldes zu stocken.

In etwas größerer Höhe, teils im Kontakt mit der hochmontanen Stufe des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes, dominieren felsige Ausbildungen des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Sie stocken auf anstehendem Dachsteinkalk. Weitverbreitet sind hier wieder Schlagfluren. Auf extremeren Felsstandorten geht die Gesellschaft in den Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald über. Etwas fragwürdig sind die kartierten Bestände an Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald und Karbonat-Fichtenwald; sie müßten bei einer Nachkartierung wohl anders zugeordnet werden.

Die hochmontane Stufe baut im vorliegenden Gebiet, wie schon angedeutet, wieder im wesentlichen der Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald auf und zwar v.a. in seiner hier vielleicht noch föhnbedingt etwas trockeneren Reinen Ausbildung. Er stockt wie die *Luzula sylvatica*-Ausbildung des Karbonat-Fichtenwaldes im südlichen Hirschbichtal auf anstehendem Dachsteinkalk. Auch Höhenlage und Exposition sind ähnlich. Daß hier trotzdem die Vegetation weniger azidophil als am Hocheiskopf ist, mag durch die im Vergleich zu dort deutlich weniger föhnausgesetzte Lage bedingt sein. Immerhin spielt doch die relativ azidophile Reine Ausbildung des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes mit *Calamagrostis villosa*, die zum Karbonat-Fichtenwald überleitet, eine größere Rolle.

Die Beweidungsintensität des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes erscheint im Gebiet recht gering: Es gibt hier zum einen keine Alm in der Nähe; andererseits ist auch das Gelände im Bereich anstehenden, meist stark zerklüfteten Dachsteinkalks allgemein recht unwegsam. Geringe Beweidung mag hier auch die Erhaltung recht dicht geschlossener Bestände ermöglichen, die für die verarmte Ausbildung des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes typisch sind.

Beide Höhenstufen des NW-Hanges durchzieht ein breites Band von Beständen des Horstseggenrasens, v.a. von dessen *Molinia*-Ausbildung. Sie sind wesentlich typischer ausgebildet als auf der anderen Talseite und besiedeln einen wohl von Lawinen und Schmelzwasser baumfrei gehaltenen Hangeinschnitt.

F) Arealtypenspektren

Zusätzlich zu den im vorstehenden bereits für alle größeren Einheiten angegebenen Zeigerwerten und absoluten mittleren Artenzahlen wichtiger Geoelemente wird in einer beiliegenden Graphik ein zusammenfassender Überblick sowohl über die Zeigerwerte als auch über die prozentualen Anteile der Geoelemente - letzteres in Form von Arealtypenspektren - gegeben; der Überblick über die verschiedenen Vegetationseinheiten soll hierdurch erleichtert werden. Näher eingegangen sei hier noch einmal auf die Arealtypenspektren, wobei insbesondere Vergleichsspektren zweier anderer Gebiete Berücksichtigung finden sollen.

Die Berechnung der Geoelementanteile erfolgte auf der Basis der Angaben in der Pflanzensoziologischen Exkursionsflora OBERDORFERS (1979). Die Ansprache der Arealcharakteristiken erfolgt dort allerdings weitgehend aus mitteleuropäischer Sicht und geht weniger von der Gesamtverbreitung der einzelnen Arten aus, wie es bei MEUSEL et al. (1965, 1978) geschieht. Im engeren mitteleuropäischen Rahmen ist jedoch eine vereinfachende Typisierung der Areale eher möglich als im weltweiten Maßstab, weshalb MEUSEL auf die Angabe von Arealtypen überhaupt verzichtet und dafür für jede Art eine genaue Arealdiagnose und differenzierte geographische Verbreitungsangaben liefert. Beim statistischen Vergleich größerer Artenkollektive ist jedoch die Anwendung der stärker typisierenden Angaben OBERDORFERS einfacher, so daß diesen hier wie bei KÜNNE (1969) und ZUKRIGL (1973) der Vorzug gegeben wird. Damit wird außerdem der Vergleich der eigenen Ergebnisse mit denjenigen der genannten Autoren erleichtert. Der bei der Charakterisierung der Einzelarten in Kauf genommene Informationsverlust könnte dabei u.U. durch die große Zahl der in die Berechnung eingehenden Arten wieder wettgemacht werden. Größere systematische Verschiebungen von Mittelwerten, die aus einer evt. etwas einseitigen Sicht von einem zentraleuropäischen Bezugspunkt aus resultieren, dürften außerdem alle ausgewerteten Einheiten gleichermaßen betreffen und damit den Vergleich nicht beeinträchtigen.

Die Berechnung selbst erfolgte durch Division der vom vorliegenden EDV-Programm ermittelten durchschnittlichen Artenzahlen einer Gruppe pro Aufnahme durch die Summe der mittleren Artenzahlen sämtlicher Gruppen. Die einzelnen Gruppen können dabei überlappen, wie die folgenden Definitionen der für sie verwendeten Symbole zeigen:

- pra: alle bei OBERDORFER mit alp oder pralp gekennzeichneten Arten, also solche, die ihre Hauptverbreitung im Umkreis der süd-, mittel- und osteuropäischen Hochgebirge haben, sei es über (alp) oder unter der Waldgrenze (pralp)
- kont: alle Arten mit m.o.w. kontinentaler Verbreitungstendenz, bei OBERDORFER gekennzeichnet mit nokont, euraskont, europkont, kont oder gemäßkont
- sm: Arten mit Verbreitungsschwerpunkt im nordmediterranen Flaumengebiet
- eu: Arten des eurasiatischen Laubwaldgebiets, auch wenn sie hauptsächlich im eurasiatischen Westen (eurassubozan) oder mehr küstenfern (euraskont) verbreitet sind
- satl: Arten mit Massenverbreitung in den Laubwaldgebieten Westeuropas, auch solche mit gleichzeitig submediterraner Verbreitung (smed-subatl)
- no: Arten des borealen Nadel- (Birken-)waldgebietes, seien sie küstenfern (nokont) oder küstennah (nosubozan) oder gleichzeitig in den Waldstufen der Alpen (no-pralp) verbreitet. Hinzugerechnet wurde außerdem der geringe Anteil an Arten des arktischen Tundrangebiets, die im vorliegenden Fall naturgemäß meist ein zweites Hauptverbreitungsgebiet über der Waldgrenze der Alpen besitzen.

Von OBERDORFER eingeklammerte Angaben gingen voll in die Berechnung ein.

Beim Vergleich des Berchtesgadener Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes mit dem Helleboro-Fagetum des Ostalpenrandes (ZUKRIGL) und dem Lathyro-Fagetum der Frankenalb (KÜNNE) fällt v.a. der insgesamt recht geringe Anteil der subatlantischen Arten des ersteren auf. Im Anteil der kontinentalen Arten unterscheiden sich die drei genannten Assoziationen nicht wesentlich, obwohl das Lathyro-Fagetum und das eigentliche Helleboro-Fagetum geringere Höhenlagen besiedeln als der Hainlattich-Tannen-Buchenwald und deshalb eigentlich kontinentaler geprägt sein sollten. Das Helleboro-(Abieti-)Fagetum seinerseits, als etwas höher verbreitete, tan-nenreiche Form des Helleboro-Fagetum, gleicht in seinem geringen Anteil

kontinentaler Arten schon dem Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald der hochmontanen Stufe Berchtesgadens, obwohl die dargestellte Subassoziation *caricetosum albae* eigentlich dem mittelmontanen Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald Berchtesgadens entspricht. Als Ursache für eine erhöhte Kontinentalität des Berchtesgadener Klimas spielen wohl die ausgedehnten Hochplateaus eine Rolle, die zu einer Steigerung der Massenerhebung und damit zu verstärkter Ein- und Ausstrahlung beitragen. Auch ein vermehrter Föhninfluß scheint den kontinentalen Charakter der Berchtesgadener Waldvegetation zu steigern. Er mag daneben auch für den auffallend großen Anteil submediterraner Arten in Berchtesgaden verantwortlich sein.

Weniger bedeutungsvoll scheinen Unterschiede in den Mengen der alpinen und präalpinen Arten zu sein. Naturgemäß sind sie in der Frankenalb besonders spärlich vertreten. Auch in Berchtesgaden scheinen sie in vergleichbaren Gesellschaften weniger häufig zu sein als am Alpenostrand.

G) Vergleich der vegetationskundlichen Ergebnisse mit Resultaten

anderer Fachgebiete

1. Waldgeschichte

Im Hinblick auf die Frage nach dem anthropogenen Einfluß auf die Wälder Berchtesgadens sind an waldgeschichtlichen Erhebungen v.a. solche interessant, die die Veränderungen der Baumartenzusammensetzung in der jüngeren Zeit unter dem Einfluß des wirtschaftenden Menschen betreffen. Der Bezug waldgeschichtlicher Daten auf bestimmte der im vorstehenden beschriebenen Vegetationseinheiten ist dabei nur möglich, wenn eine ausreichend genaue räumliche Zuordnung möglich ist. Pollenanalytische Daten (GÖSSINGER 1981, MAYER 1964, 1966) sind naturgemäß besonders schwer zu parallelisieren. Sie erfassen zwar naturgemäß in besonderem Maße Veränderungen in der Nähe der Probenentnahmestelle; trotzdem mischen sich an allen Lagerstätten Pollen aus vielen verschiedenen Vegetationseinheiten der näheren und weiteren Umgebung, so daß sich pollenanalytische Daten meist nicht einmal exakt auf ein bestimmtes der hier bearbeiteten Teilgebiete des Nationalparks beziehen lassen. Darüber hinaus finden sich nur wenige geeignete Pollenlagerstätten. Das Kartierungsgebiet ist z.B. neben den Profilen GÖSSINGERS, die aus dem Königsseesediment gewonnen wurden, nur von MAYERS Profil Priesbergmoos betroffen, das am Rande des Gotzenthalsgebiets liegt. Letzteres Profil ist in den Schichten des jüngeren Subatlantikums bis zur Gegenwart relativ reich an Buchenpollen. Recht ähnlich ist der Verlauf des Buchenpollenanteils während des Subatlantikums auch im nördlichsten Profil GÖSSINGERS, das aus der unmittelbaren Nähe des Gotzenthalsgebiets stammt. Allerdings variieren die Anteile des Buchenpollens im Königsseesediment stark je nach Lage des Profils: An allen südlicher gelegenen Probenentnahmestellen - auch in der Nähe des bis heute sehr buchenreichen St. Bartholomä - fand sich wesentlich weniger Pollen dieser Baumart. Signifikante Veränderungen seines Anteils während der letzten Phase des Subatlantikums sind nicht erkennbar: Im Profil Priesbergmoos nimmt sein Anteil zuletzt etwas ab, in den Königsseeprofilen dagegen ist er in der letzten Phase weitgehend konstant. Herkunftsgebiet des Buchenpollens der genannten Profile ist dabei sicher nur zum geringsten Teil das Gotzenthalsgebiet selbst; der größte Teil stammt nach GÖSSINGER wohl aus dem nördlich gelegenen Flachland.

Haselpollen scheint andererseits nicht sehr weit transportiert zu werden, da trotz noch relativ nahegelegener Vorkommen der Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft der Anteil des Haselpollens im Priesberg-Profil kaum höher ist als in anderen Vergleichsprofilen MAYERS. Stärker beteiligt ist er in den Profilen GÖSSINGERS, die den heutigen Haselvorkommen wesentlich näher liegen.

Kaum eindeutige Hinweise auf eventuelle Häufigkeitsänderungen während der letzten Phase des Subatlantikums ergeben die angesprochenen Profile MAYERS und GÖSSINGERS auch im Falle der Fichte. Der Anteil dieser anthropogen besonders begünstigten Baumart nimmt zu den jüngsten Profilabschnitten hin meist etwas ab.

Genauer als pollenanalytische Daten sind naturgemäß archivalisch überlieferte Angaben. Diese erfassen zwar nur die nähere Vergangenheit. Weiter zurückliegende Epochen sind jedoch für die Ausprägung des heutigen Vegetationsbildes ohnehin nur von untergeordneter Bedeutung. Die im folgenden wiedergegebenen Baumartenanteile wurden mir dankenswerterweise von H. KNOTT mitgeteilt. Die Angaben beziehen sich auf ganze Forstdistrikte; ein Bezug auf bestimmte Vegetationseinheiten ist somit auch nur beschränkt möglich. Die Taxationsresultate des Kgl. Salforstamtes Berchtesgaden von 1819 beinhalten folgende Baumartenanteile für die vom Kartierungsgebiet berührten Distrikte:

Distrikt	Ahorn	Buche/Ulme	Lärche	Kiefer	Fichte	Tanne
Hocheis	3	2	38	2	39	16
Hintersee S	1	1	30	1	59	8
Eckau	-	5	20	-	50	25
Wimbach	2	1	34	1	60	2
Schappach	-	1	22	-	75	2
Roint	2	10	18	-	67	3
Eis	2	35	9	-	53	1
Röth	-	3	52	-	45	-
Fischunkel	2	22	6	-	70	-
Seewände	5	17	15	-	61	2
Priesberg	4	3	36	-	56	1

Deutliche Unterschiede gegenüber den heute vorgefundenen Verhältnissen scheinen hier im Bereich von Röth und Eckau zutage zu treten. Beide Gebiete sind als lokale Verbreitungszentren des Ahorn-Buchenwaldes heute offenbar deutlich laubbaum- und v.a. ahornreicher als 1819. Ahornvorkommen werden von KNOTT für die Röth erst ab 1811 und früher angegeben.

Stark zurückgegangen ist dagegen nach unseren Ergebnissen die Tanne im Bereich der Distrikte Eckau und Hocheis. Gleichgeblieben scheint der relativ hohe Tannenanteil des Distriktes Hintersee Süd zu sein, der vielleicht z.T. die Deschampsia-Ausbildung des Weißseggen-Fichtenwaldes betrifft.

Der Buchenanteil im Distrikt Eis ist nach wie vor hoch. Er wird durch den Buchenreichtum der Eschen-Ausbildung des Reinen Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes bestimmt. Die Buche ist hier neben anderen Laubbaumarten nach KNOTT anthropogen begünstigt: Wie der Kultur-, Weg- und Waldbauplan des Reviers Königssee 1855/56 bis 1866/67 ausweist, wurden in der Bartholomäusau auf gezäunter Fläche neben Fichte auch Buche, Roßkastanie und Ahorn gesät. Auch Laubholzpflanzungen wurden für diesen Zeitabschnitt im Distrikt Eis angeordnet. 50 Stück Ahorn wurden im Distrikt Seewände, also m.o.w. im Bereich der Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft gepflanzt; diese Gesellschaft weist gegenwärtig mäßige Ahornanteile auf.

In allen übrigen Distrikten des Reviers Königssee waren für den angegebenen Zeitraum nur Nadelholzsaaten und -pflanzungen vorgesehen.

2. Wildbiologie

Im Bereich der Wildbiologie ist v.a. die Dissertation von J. KIORO-GLANIDIS von Interesse, der die botanische Zusammensetzung des Panseninhalts von Rothirsch, Gams und Reh im Nationalpark untersuchte. Gebietsspezifische Unterschiede in der Nahrungsauswahl lassen sich hier durchaus der unterschiedlichen Verbreitung bestimmter Pflanzengesellschaften zuordnen. Der hohe Farnanteil an der Sommernahrung der Rothirsche im Watzmanngebiet könnte z.B. auf das Vorkommen des Frauenfarn-Alpenlattich-Fichtenwaldes zurückzuführen sein. Schwerer erklärlich ist demgegenüber, daß im Sommer die Laubbäume im fichtenreichen Watzmannge-

biet einen höheren Anteil am Panseninhalt der Rothirsche haben als im laubbaumreichen Königsseegebiet. KIROGLANIDIS nimmt an, daß im Königsseegebiet Kräuter den Laubbäumen vorgezogen werden. Die weite Verbreitung des grasreichen und krautarmen Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes im Watzmannggebiet mag den hier relativ geringen Anteil der an sich bevorzugten Krautnahrung und den hohen Anteil der Gräser, aber - gemessen am Angebot - auch der Laubbäume erklären.

3. Bodenkunde

Da im Rahmen des vorliegenden Projektes kaum Bodenuntersuchungen durchgeführt werden konnten, wären Ergebnisse anderer Autoren aus dem Untersuchungsgebiet von besonderem Interesse; es liegen hier allerdings noch nicht allzu viele Arbeiten vor. Unser Kartierungsgebiet dürfte nur durch die Zulassungsarbeit von R. BOCHTER und die Diplomarbeit von H. RÖHLE berührt sein. Das Arbeitsgebiet von BOCHTER liegt freilich bereits weitgehend außerhalb unseres Kartierungsgebiets; nur im Bereich der Gotzenthalm-Alm ist eine Untersuchungsfläche eingeschlossen. BOCHTER gibt zwar für die Bodenprofile auch ausführliche Vegetationsaufnahmen an; die hier interessierenden Aufnahmen im Waldbereich sind jedoch alle sehr artenarm und lassen sich nur der standörtlich weitgehend indifferenten Fichten-Ausbildung des Reinen Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes zuordnen. BOCHTER fand hier im Bereich karbonatreicher Substrate v.a. Lehmrendzinen mit F-Mull oder dystrophem Moder und auf jurassischem Verwitterungslehm oligotrophe Braunerden mit rohhumusartigem Moder.

H. RÖHLE arbeitete am Hochkalter; seine Untersuchungsflächen liegen damit in größerem Umfang in unserem Eckaugebiet und im Gebiet des südlichen Hirschbichtals. Seine Bodenprofile lassen sich, soweit sie tatsächlich im Kartierungsgebiet liegen, mit gewisser Sicherheit bestimmten Vegetationseinheiten zuordnen. Einige Profilbeschreibungen seien hier, nach Untersuchungsflächen zusammengefaßt, auszugsweise wiedergegeben: (pH-Werte in KCl gemessen)

Untersuchungsfläche 1

Ort: Hoch-Alm
Bodenform: Rendzina aus Dachsteinkalk
Humusform: Moder
Vegetation: vermutlich Reine Lycopodium-Ausbildung des
Schneeheide-Alpenrosenbusches

OL	1,8 cm	pH=4,8; C/N=27,1
OF	0,5 cm	pH=5,1; C/N=20,5
Ah	0 - 10 cm	lehmig, schwarz, krümelig, Wurzelfilz, mäßig dicht, skelettfrei pH=5,7; C/N=13,7

Untersuchungsfläche 2

Ort: Eckau-Alm
Bodenform: Rendzina aus Dachsteinkalk
Humusform: Mullartiger Moder
Vegetation: evt. Galium rotundifolium-Ausbildung des
Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes

OL	1 cm	pH=4,7; C/N=27,7
OF	1 cm	pH=4,0; C/N=21,5
Ah	14...16 cm	lehmig, schwarzbraun, krümelig, mäßig dicht skelettfrei, 15...20 Wurzeln/qdm pH=5,0...6,2; C/N=13,3...13,7
AhCv	14...16 cm	lehmig, sehr dicht, 90 % Skelett, 2 Wurzeln/qdm pH=7,5...7,7; C/N=10,3...12,7

Untersuchungsfläche 3

Ort:	Nordhangweg	
Bodenform:	Rendzina aus interglazialen Schottern	
Humusform:	Mull bis Moder	
Vegetation:	vermutlich Reine oder Galium rotundifolium-Ausbildung des Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes	
OL	1 cm	pH=4,7...5,4; C/N=31,6...34,3
OF	0,5...1 cm	pH=5,3...6,0; C/N=26,3...26,4
Ah	8...11 cm	lehmig, schwarz bis schwarzbraun, krümelig, locker bis dicht, 5...10 % Skelett, meist mit Wurzelfilz pH=4,9...7,1; C/N=17,6...20,6
AhCv	10...20 cm	nicht immer vorhanden, lehmig, schwarzbraun bis braun, sehr dicht, 90 % Skelett, 2...5 Wurzeln/qdm pH=6,9...7,9; C/N=12,1...13,8

Untersuchungsfläche 4

Ort:	Bind-Alm-Osthang	
Bodenform:	Rendzina aus Reichenhaller Schichten	
Humusform:	Moder	
Vegetation:	vermutlich Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald	
OL	0,5 cm	pH=4,6; C/N=36,7
OF	1,5 cm	pH=3,8; C/N=32,0
Ah	17...18 cm	sandiger Lehm, schwarz, krümelig, locker, 5 % Skelett, 15...20 Wurzeln/qdm pH=7,2...7,5; C/N=17,9...18,9
Cv		sehr dicht, 0...3 Wurzeln/qdm pH=8,3...8,4; C/N=4,4...5,8

4. Klimatologie

Das Untersuchungsgebiet ist aufgrund der ausgeprägten Strukturierung der Geländeoberfläche zweifellos auch durch eine relativ starke lokale Differenzierung des Klimas ausgezeichnet, die sich m.o.w. deutlich in der Vielfalt der Pflanzengesellschaften widerspiegelt. Der differenzierende Einfluß klimatischer Faktoren auf die Artenzusammensetzung faßbarer Vegetationseinheiten gewinnt im Bereich der Kalkalpen offenbar auch dadurch an relativer Bedeutung, als hier, wie erwähnt, die Bodenmerkmale zum Teil bereits zu kleinräumig variieren, um sich in der Vegetation oder zumindest in den auf herkömmliche Weise erhaltenen Vegetationsaufnahmen noch voll ausprägen zu können. Aufgrund der starken Reliefdifferenzierung variieren die klimatischen Gegebenheiten immerhin noch so sehr, daß allgemeine Aussagen über Klimafaktoren von relativ beschränktem Wert sind. Differenzierte Angaben aufgrund realer Messungen sind dagegen nicht möglich, da das Netz meteorologischer Meßstationen im Gebiet des Nationalparks zu weitmaschig ist; keines der Kartierungsgebiete besitzt eine solche Station. Es gibt jedoch umfangreiche theoretische Berechnungen von ENDERS (1979), die flächendeckend für den ganzen Alpenpark durchgeführt und kartenmäßig dargestellt wurden. Der Bezug auf bestimmte Vegetationseinheiten kann teils unmittelbar aus den von ENDERS mitgeteilten Rechenvorschriften, teils durch Kartenvergleich hergestellt werden.

Aus den mittleren Standortdaten der Vegetationseinheiten (Mittel der erhaltenen Aufnahmen) wurden das Jahresmittel der Lufttemperatur, der mittlere Jahresniederschlag und die mittlere jährliche Verdunstungshöhe (Horizontalprojektion) berechnet. Hierfür wurden folgende Formeln verwendet:

$$(1) \quad t = 10,29 - 0,47 z$$

$$(2) \quad P = 100 (221,669 + 7,911 z + 0,505 z^2) \exp 0.5$$

$$(3) \quad E = (655,1 - 12,30 z) v / \cos n$$

Für: t = Jahresmitteltemperatur (Grad Celsius)

P = mittlerer Jahresniederschlag (mm)

E = mittlere jährliche Verdunstungshöhe (mm)

z = Meereshöhe (100 m)

n = mittlere Hangneigung (Grad)

v = angegebene Verdunstung / Verdunstung von Grünland

Temperatur und Niederschlag werden hier nur als von der Meereshöhe abhängig betrachtet; in die Berechnung der Verdunstungshöhe geht zusätzlich ein für verschiedene Vegetationsformationen unterschiedlicher Korrekturfaktor mit ein; außerdem wird ihr von der realen Oberfläche abhängiger Wert auf die in die Horizontale projizierte Fläche umgerechnet, auf die auch die Niederschlagsmenge bezogen ist. Zweifellos hängen die berechneten Klimafaktoren auch noch von anderen Faktoren ab - z.B. von Exposition und Horizontüberhöhung, die Verdunstung speziell wohl auch von der Dränage der Böden. Im Falle der Verdunstung können auch vegetationsabhängige Unterschiede nur sehr grob berücksichtigt werden. Von ENDERS werden hier folgende Korrekturfaktoren v gegenüber der Verdunstung über Grünland angegeben:

Wasser: 1,50

Wald: 1,43

Busch: 1,17

Fels: 0,54

Den Gesellschaften, die sich hier nicht eindeutig einordnen lassen, wurden nach Gutdünken Zwischenwerte zugeteilt. Zweifellos dürften jedoch auch innerhalb der Waldformation noch charakteristische Unterschiede auftreten, die jedoch schwer zu quantifizieren sind. Evt. könnte man hier noch Unterschiede im Bestandesschluß berücksichtigen. Zu beachten ist außerdem, daß die genannten Werte für ein Geländemodell gelten, dessen Flächenauflösung bei 200 x 200 m liegt. In diesem Bereich wurde auch die real vorhandene Oberflächenrauigkeit ausgeglichen, die Geländeoberfläche entsprechend kleiner und die Verdunstung pro Flächeneinheit größer angenommen, als der Wirklichkeit entspricht. Die Verdunstung von der realen Oberfläche dürfte nach ENDERS allgemein etwa 10% geringer sein. Der Vergleich der hier beschriebenen Vegetationseinheiten untereinander wird jedoch hierdurch nicht beeinträchtigt.

Die genannten Einschränkungen sind trotzdem bei der Betrachtung der folgenden Tabelle zu berücksichtigen, in der Ausgangsdaten und Rechenergebnisse zusammengefaßt sind:

	z	n	v	t	P	E	P-E
Weißseggen-H.-T.-B.	10,05	25,7	1,43	5,6	1877	843	1034
Schneeheide-H.-T.-B.	11,34	34,3	1,43	5,0	1940	893	1047
Hainsimsen-H.-T.-B.	9,63	15,6	1,43	5,8	1857	797	1060
Neckera-H.-T.-B.	10,38	33,2	1,43	5,4	1893	901	992
Reiner H.-T.-B.	7,96	16,3	1,43	6,5	1779	830	949
Eschen-Ausb.	6,85	11,4	1,43	7,1	1731	833	898
Fichten-Ausb.	9,60	23,4	1,43	5,8	1855	837	1018
artenarme Buchen-Fazies	9,67	24,7	1,43	5,7	1858	844	1014
Rostseggen-H.-T.-B.	14,09	26,4	1,43	3,7	2082	769	1313
Ahorn-Buchenwald	12,36	29,2	1,43	4,5	1991	824	1167
Sanicula-Ausb.	11,75	29,5	1,43	4,8	1960	839	1121
Reine Ausb.	12,63	29,3	1,43	4,4	2005	819	1186
Luzula sylvatica-Ausb.	13,20	28,8	1,43	4,1	2035	804	1231
Ahorn-Eschenwald i.e.S.	9,03	16,8	1,43	6,0	1828	813	1015
Waldgeißbart-Bergahornwald	6,58	33,3	1,43	7,2	1719	982	737
Hirschzungen-Bergahornwald	8,74	32,9	1,43	6,2	1815	933	882
Schluchtwälder i.allg.	9,65	38,0	1,43	5,8	1858	973	885
Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft	7,87	35,2	1,30	6,6	1775	888	887
Bach-Grauerlenwald	8,30	20,0	1,43	6,4	1795	842	953
Grauerlen-Auwald	8,18	9,2	1,43	6,4	1789	803	986
Labkraut-Buchen-Tannenwald	9,72	25,8	1,43	5,7	1861	851	1110
Waldschachtelhalm-L.-B.-T.	10,05	20,0	1,17	5,6	1877	662	1215
Reine Ausbildung	10,11	26,6	1,43	5,5	1880	849	1031
Cardamine trifolia-Ausb.	8,78	25,4	1,00	6,2	1817	606	1211
Weißseggen-Fichtenwald	8,36	0,0	1,43	6,4	1797	790	1007
Alpenlattich-Fichtenwald	14,09	17,2	1,43	3,7	2082	721	1361
Karbonat-Fichtenwälder	13,33	23,8	1,43	4,0	2042	768	1274
Block-Fichtenwald	10,53	33,6	1,43	5,3	1900	902	998
K.-F., Luzula sylvatica-Ausb.	14,48	19,8	1,43	3,5	2103	725	1378
Schneeheide-Alpenrosenbusch	13,70	31,3	1,18	3,9	2061	672	1398
Lycopodium-Ausb.	15,31	30,4	1,17	3,1	2147	633	1514
Amelanchier-Ausb.	11,44	32,7	1,20	4,9	1945	734	1211
Alpendostflur	13,73	24,9	1,00	3,8	2063	536	1527
Grünerlenbusch	14,70	43,3	1,17	3,4	2114	762	1352
Dost-Buntreitgrasflur	11,73	34,2	1,00	4,8	1959	618	1341
Rostseggenrasen	15,91	17,1	1,00	2,8	2180	481	1699
Blaugras-Horstseggenrasen	10,88	33,7	1,03	5,2	1917	645	1272
Reine Ausbildung	11,64	34,4	1,08	4,8	1955	670	1285
Hippocrepis-Ausb.	10,23	33,3	1,00	5,5	1885	633	1252

	z	n	v	t	P	E	P-E
Molinia-Ausb.	8,58	32,6	1,00	6,3	1808	652	1156
Primula auricula-Ausb.	11,10	53,3	0,80	5,1	1928	694	1234
Hookeria-Ausb.	9,00	43,5	1,00	6,1	1827	751	1076
Luzula sylvatica-Ausb.	14,70	26,1	1,00	3,4	2114	528	1586
Polsterseggenrasen	7,13	4,1	1,00	6,9	1743	569	1174
Verarmte Kalkschuttflur	6,13	2,0	1,43	7,4	1700	829	871
Schneepestwurzflur	7,80	6,0	1,43	6,6	1772	804	968
Lavendelweidengebüsch	6,10	0,5	1,17	7,4	1699	679	1020
Rostseggen-Alpenrispengrasweide	13,24	23,0	1,00	4,1	2037	535	1502
Rotschwingelweide	12,05	6,5	1,00	4,6	1976	509	1467
Borstgrasrasen	12,10	24,0	1,00	4,6	1978	554	1424
Quellfluren, Rispenseggenried	10,16	20,3	1,25	5,5	1882	707	1175
Braunseggensumpf	13,90	1,0	1,25	3,8	2072	605	1477

Die mit zunehmender Meereshöhe der Standorte abnehmende Temperatur und zunehmende Niederschlagsmenge ist hier noch einmal genauer quantifiziert. Für den Wasserhaushalt einer Gesellschaft erscheint v.a. die Differenz zwischen Niederschlag und Verdunstung bedeutungsvoll. Der Wasserüberschuß nimmt mit zunehmender Meereshöhe sehr rasch zu, weil hier einerseits die Niederschlagsmenge größer, andererseits aber die Verdunstung, v.a. temperaturbedingt, abnimmt. Die charakteristischen Plateaueformen der Berchtesgadener Berge bringen außerdem eine mit zunehmender Meereshöhe allgemein verringerte Hangneigung mit sich, die ihrerseits die verdunstende Oberfläche kleiner werden läßt. Eine geringe Hangneigung bei gleichzeitig relativ großer Meereshöhe findet sich darüber hinaus bevorzugt bei Nichtwaldgesellschaften mit von Natur aus schon geringer spezifischer Verdunstung. Aus diesem Grund berechnen sich die größten Wasserüberschüsse für die *Luzula sylvatica*-Ausbildung des Horstseggenrasens, den Rostseggenrasen, die Alpenrispengrasweide und die Alpenrostflur. Im Bereich der Waldgesellschaften weisen naturgemäß Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald und Alpenlattich-Fichtenwald hohe Werte von P-E auf. Ein noch höherer Betrag errechnet sich für die *Luzula sylvatica*-Ausbildung der Karbonat-Fichtenwälder; hier dürfte jedoch föhnbedingt die Verdunstung höher liegen, als die Berechnung nach der angegebenen Methode ergibt. Allerdings besiedelt diese Gesellschaft auch besonders schwach geneigte Hänge.

Als trockenste Gesellschaft - gemessen am nicht verdunsteten Niederschlagswasser - erscheint in der Tabelle paradoxerweise der zweifellos

luftfeuchte Waldgeißbart-Bergahornwald. Er bestockt relativ steile Hänge in geringer Meereshöhe und kann daher nur einen hohen Verdunstungswert bei gleichzeitig niedrigem Niederschlag zugeordnet erhalten. Die Verdunstung dürfte hier in Wirklichkeit - bedingt durch die Lage am Nordhang und evt. stagnierende - Luft wesentlich geringer sein, als die Rechnung ergibt.

Im Gegensatz dazu kann der relativ hohe Wert P-E des Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes nicht als Hinweis auf eine hier vielleicht besonders hohe Standortsfeuchtigkeit aufgefaßt werden. Der Betrag von P-E könnte zwar durchaus den wahren Verhältnissen nahekommen, da die Verdunstung zwar föhnbedingt gesteigert, durch gute Dränage des dolomitischen Ausgangsgesteins aber gleichzeitig wieder reduziert sein dürfte. Eben diese Dränagewirkung verhindert hier jedoch zweifellos, daß das Überschußwasser längere Zeit am Standort zur Verfügung steht.

Exakter zu berechnen, aber nur durch Kartenvergleich auf bestimmte Vegetationseinheiten zu beziehen sind die Werte der mittleren solaren Hangbestrahlung unter Berücksichtigung von Horizonteinengung und Transmission der wolkenlosen Atmosphäre. Der Maßstab ihrer Darstellung ist bei ENDERS zwar wesentlich kleiner als der der vorliegenden Vegetationskarte; für gut lokalisierbare und d.h. v.a. großflächig vorkommende Vegetationstypen meist höheren Ranges lassen sich jedoch folgende Werte in W/qm ermitteln:

Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald:	100-200
Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald:	100-200
Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald:	100-200
Reiner-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, Eschen-Ausbildung	
Ausbildungen mit Moehringia (Hang):	150-200
Ausbildungen ohne Moehringia (Ebene):	100-150
Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, Erica-Ausbildung:	200-250
Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, übrige Ausbildungen:	0-250
Ahorn-Buchenwald:	0-150
Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft:	100-200
Weißseggen-Fichtenwald:	100-200
Karbonat-Fichtenwald, Luzula sylvatica-Ausbildung:	150-200
Alpenlattich-Fichtenwald:	150-200
Blaugras-Horstseggenrasen, Reine Ausbildung:	200-250
Polsterseggenrasen:	100-150

Bedeutungsvoll erscheint hier v.a. die relativ hohe Bestrahlungsstärke im Bereich der typischen Ausbildung des Horstseggenrasens und der Erica-Ausbildung des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Recht indifferent gegenüber der Hangbestrahlung ist dagegen der Rest des Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes. Besonders gering ist die Einstrahlung am Standort des Ahorn-Buchenwaldes.

Aus klimatischen Faktoren werden von ENDERS auch Werte für die jährliche Primärproduktion berechnet; diese sind im wesentlichen höhenabhängig. Für die Wälder der tieferen Bereiche (v.a. Reiner, Hainsimsen-, Weißseggen- und Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald) liegen sie bei 1450-1650g/qm und für die Wälder höherer Lagen (v.a. Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, Ahorn-Buchenwald, *Luzula sylvatica*-Ausbildung des Karbonat-Fichtenwaldes) bei 1250-1450 g/qm.

H) Diskussion

1. Vegetationskundlich erfaßte Umweltfaktoren

a) Abiotische Faktoren

Die im vorstehenden beschriebenen Vegetationseinheiten spiegeln in den höheren hierarchischen Rangstufen v.a. die Einflüsse des Klimas wider. Hierzu zählen besonders die von der Meereshöhe abhängigen Faktoren von Temperatur und Niederschlagsmenge. Die Variation der Meereshöhe ist z.B. verantwortlich für die Unterschiede zwischen dem Komplex Reiner, Weißseggen- und Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald einerseits und Rostseggen- sowie auch Ahorn-Buchenwald andererseits. Daneben treten Unterschiede in der Föhnbeeinflussung zutage, die v.a. im Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald und im Weißseggen-Fichtenwald deutlich wird. Luftfeuchtes Klima führt wiederum zur Ausbildung verschiedener Schluchtwaldgesellschaften - im offenbar zusätzlich wärmebegünstigten Königsseebereich speziell zur Entstehung der Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft.

Einflüsse des Bodens treten in der Vegetation meist nur in Erscheinung, wenn sie auf größeren Flächen einheitlich einwirken. In den Kalkalpen pflegen jedoch die Bodeneigenschaften sehr oft noch innerhalb des Bereichs einer normalen Aufnahmefläche recht stark zu variieren, ohne daß dies in der Vegetation besonders deutlich würde. Vegetationskundlich sind solche Unterschiede schon deshalb nicht zu fassen, weil eine bestimmte Pflanzengesellschaft bei zu enger Verzahnung mit anderen kaum mehr unbeeinflusst durch deren abweichenden Artenbestand bleiben dürfte.


Was im vorliegenden Fall an Bodeneigenschaften erfaßt wurde, sind v.a. Unterschiede im Kalk- und Feinerdegehalt, in der Wasserversorgung und im Humuszustand. Genauere Bodenuntersuchungen wurden freilich nicht durchgeführt; sie bleiben der bereits in Angriff genommenen Standortserkundung vorbehalten. Es wurden nur wenige kleinere Profile gegraben und nach visuell erkennbaren Merkmalen beschrieben.

Besonders gewichtige Bodenunterschiede springen z.B. an der Grenze zwischen dem bodenbasischen Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald und dem ausgeprägt bodensauren Alpenlattich-Fichtenwald ins Auge. Durch auffälligeren bodenkundliche Besonderheiten sind daneben z.B. auch Labkraut-

Tannen-Buchenwald, Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald und Ahorn-Eschenwald i.e.S. gekennzeichnet, die durchweg auf überdurchschnittlich lehmreichen Böden entwickelt sind.

Um ein möglichst übersichtliches Bild der wichtigsten Standortsfaktoren zu vermitteln, sei an dieser Stelle zusätzlich zu den Säulendiagrammen der Zeigerwerte im Tabellenanhang auch ein aus Zeigerwerten konstruiertes Ökogramm der Waldgesellschaften wiedergegeben. Auf den beiden Koordinatenachsen des Diagramms sind Reaktions- und Temperaturzahl aufgetragen, letztere von oben nach unten, um gleichzeitig die Höhenverbreitung der Waldgesellschaften zu veranschaulichen. Nährstoff- und Wasserversorgung sind durch Hohlzylinder symbolisiert, deren Radius durch die Stickstoff- und deren Länge durch die Feuchtezahl gegeben ist. Die ähnliche Form der meisten Zylinderfiguren läßt die Korrelation (Korrelationskoeffizient $r = 0,73$) beider Zahlenwerte erkennen: Stickstoffliebende Pflanzen sind meist auch feuchteliebend. Im Diagramm ist auch die Korrelation zwischen Temperatur- und Reaktions- ($r = 0,70$) sowie auch Stickstoffzahl ($r = 0,64$) erkennbar: Mit abnehmender Temperatur sinken Reaktions- und Stickstoffzahl im Zusammenhang mit der Verlangsamung der Streuzersetzung im kühlen Hochlagenklima. Wenig Korrelation ($r = 0,14$) zeigen dagegen Temperatur- und Feuchtezahl, obwohl mit steigender Meereshöhe die Temperatur sinkt und gleichzeitig die Niederschlagsmenge zunimmt. Dies mag zum Teil damit zu erklären sein, daß mit zunehmender Meereshöhe auch die Böden flachgründiger werden und so den Effekt der höheren Niederschläge kompensieren: Gesellschaften besonders lehmreicher und bodenfeuchter Standorte wie der Ahorn-Eschenwald bzw. die Auwälder des Gebiets kommen nur in den tieferen Lagen vor und besitzen darum auch hohe Temperaturzahlen.

Sehr deutlich wird im Diagramm die Sonderstellung des Alpenlattich-Fichtenwaldes in Bezug auf seine Reaktionszahl. Sie entspricht seinem Vorkommen auf saurem Ausgangsgestein bei gleichzeitig relativ großer Meereshöhe. Letztere spiegelt sich ihrerseits in der niedrigen Temperaturzahl wieder. Auf ähnlich geartetem Ausgangsgestein, jedoch geringerer Meereshöhe besitzt der Labkraut-Buchen-Tannenwald eine bereits wesentlich größere Reaktionszahl. Eine intermediäre Stellung nehmen die Karbonat-Fichtenwälder und der offensichtlich eng damit verwandte Schneeheide-Alpenrosenbusch ein. Sie sind beide durch niedrige Reaktions-, Temperatur-, Feuchte- und Stickstoffzahlen ausgezeichnet. Unter den Subassoziationen des Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes setzt sich der Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald vor allem durch seine höhenbedingt niedrige Temperatur- bzw. Reaktionszahl ab.



- 1: Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald
- 2: Erica-Hainlattich-Tannen-Buchenwald
- 3: Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald
- 4: Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald
- 5: Reiner Hainlattich-Tannen-Buchenwald
- 6: Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald
- 7: Ahorn-Buchenwald
- 8: Ahorn-Eschenwald
- 9: Schluchtwald
- 10: Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft
- 11: Auwälder
- 12: Labkraut-Buchen-Tannenwald
- 13: Weißseggen-Fichtenwald
- 14: Alpenlattich-Fichtenwald
- 15: Karbonat-Fichtenwälder
- 16: Schneeheide-Alpenrosenbusch

Alle übrigen Waldgesellschaften liegen, was Temperatur- und Reaktionszahl anbelangt, nahe beieinander. Der Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald nähert sich dabei naturgemäß relativ stark dem Labkraut-Buchen-Tannenwald an. Zwischen beiden ist der Weißseggen-Fichtenwald angesiedelt, der sich jedoch durch niedrige Feuchte- und Stickstoffzahlen abhebt. Der Bergahorn-Buchenwald läßt seine Verwandtschaft mit dem Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald erkennen, erscheint jedoch feuchter und besser nährstoffversorgt. In dieser Beziehung ist der Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald der Subassoziation mit Rostsegge ähnlicher, während er bezüglich Temperatur- und Reaktionszahl dem Ahorn-Buchenwald näher steht.

In allen Zeigerwerten drückt sich die große ökologische Ähnlichkeit des Ahorn-Eschenwaldes i.e.S. mit den Schluchtwäldern und den Auwäldern des Gebiets aus; alle diese Gesellschaften weisen hohe Temperatur-, Reaktions-, Stickstoff- und Feuchtezahlen auf. Sehr nahe steht dieser Gruppe die floristisch am ehesten den Schluchtwäldern zuzuordnende Hasel-Felsenbirnengesellschaft. Ihre Reaktionszahl ist besonders hoch; niedrig sind dagegen, bedingt durch flachgründige Standorte, Feuchte- und Stickstoffzahl. Die Gesellschaft ähnelt darin dem in dieser Beziehung allerdings noch extremeren Erica-Hainlattich-Tannen-Buchenwald sowie dem viel bodensaureren Weißseggen-Fichtenwald. Eine ausgesprochen intermediäre Stellung nimmt der weitverbreitete Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald ein.

b) Biotische Faktoren

An biotischen, insbesondere anthropogenen Einflüssen erschienen im Gebiet v.a. die forstliche Bewirtschaftung und die Beweidung der Wälder durch Vieh, Rotwild und evt. Gamsen bedeutungsvoll. Unsicher sind Hinweise auf eine eventuelle Streunutzung. Der Einfluß der Erholungssuchenden schließlich spielt in den meist recht unzugänglichen Bergwäldern keine flächenmäßig bedeutsame Rolle. Er wäre wohl auch von Weideeffekten nicht zu unterscheiden.

Forstliche Einflüsse äußern sich am unmittelbarsten in Gestalt von Schlagfluren, die im Gebiet vielerorts anzutreffen sind, z.T. allerdings auch natürlichen Ursprungs sein können. Die Standortverhältnisse auf Schlagfluren sind allgemein geprägt durch eine Verbesserung der Licht-,

Wasser- und Nährstoffversorgung der Bodenvegetation nach der Beseitigung der konkurrierenden Baumschicht. Die Verfügbarkeit der Nährstoffe, unter denen v.a. der Stickstoff eine besonders wichtige Rolle spielt, wird zusätzlich noch verbessert durch eine wesentlich beschleunigte Mineralisierung der Humusvorräte und nicht zuletzt der am Standort verbliebenen Bestandesabfälle unter den speziellen Feuchtigkeits-, Licht- und Wärmebedingungen im Bereich der Schlagfluren. Nach Erschöpfung des Vorrats an rasch mineralisierbaren organischen Substanzen kann es jedoch auch zu Aushagerungserscheinungen kommen. Einzelne Schlagflurpflanzen weisen auch auf Bodenverletzungen hin, die v.a. für Windwurf Flächen typisch, aber auch bei der Holzernte unvermeidbar sind.

Im Gebiet wurden folgende Arten gefunden, die die jeweils angegebenen, im Bereich von Schlagfluren anzutreffenden Faktoren bevorzugen und diese Gesellschaften daher in je nach Ausgangsgesellschaft unterschiedlicher Kombination charakterisieren:

<i>Agrostis tenuis</i>	Aushagerung
<i>Atropa belladonna</i>	Nitrifizierung
<i>Calamintha clinopodium</i>	Licht
<i>Cardamine flexuosa</i>	Stickstoff, Feuchte
<i>Carex pallescens</i>	Aushagerung, Bodenverdichtung
<i>Cirsium arvense</i>	Stickstoff
<i>Epilobium montanum</i>	Eutrophie
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Nitrifizierung, Feuchte
<i>Festuca gigantea</i>	Feuchte
<i>Fragaria vesca</i>	Nitrifizierung
<i>Galeopsis speciosa</i>	Stickstoff
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Stickstoff
<i>Geranium robertianum</i>	Eutrophie
<i>Melandrium rubrum</i>	Eutrophie, Feuchte
<i>Moehringia trinervia</i>	Nitrifizierung
<i>Mycelis muralis</i>	Nitrifizierung
<i>Myosotis sylvatica</i>	Eutrophie
<i>Petasites albus</i>	Feuchte
<i>Poa nemoralis</i>	Aushagerung
<i>Poa trivialis</i>	Stickstoff, Feuchte
<i>Ranunculus repens</i>	Bodenverletzung, -verdichtung
<i>Rubus idaeus</i>	Nitrifizierung, Feuchte
<i>Sambucus racemosa</i>	Nitrifizierung

<i>Scrophularia nodosa</i>	Eutrophie, Feuchte
<i>Senecio fuchsii</i>	Nitrifizierung
<i>Solanum dulcamara</i>	Stickstoff, Feuchte
<i>Stachys sylvatica</i>	Eutrophie, Feuchte
<i>Stellaria media</i>	Stickstoff
<i>Tussilago farfara</i>	Bodenverletzung
<i>Urtica dioica</i>	Stickstoff, Feuchte
<i>Veronica officinalis</i>	Aushagerung
<i>Vicia sepium</i>	Eutrophie

Als Endergebnis der forstlichen Bewirtschaftung ist eine starke Anreicherung der Fichte in den allerdings von Natur aus schon fichtenreichen Waldbeständen zu beobachten. Die Intensität der Waldnutzung war dabei im Untersuchungsgebiet zweifellos stärker als in anderen Teilen der bayerischen Alpen, da bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in der Reichenhaller Saline ausschließlich das Holz der Wälder in der weiteren Umgebung zum Salzsud und daneben auch für den Bau der Bergwerksanlagen verwendet wurde. Die zunächst sehr vital und reichlich vertretene Buche war für diese Zwecke wesentlich schlechter zu verwenden als die Fichte, weil ihr schweres Holz kaum triftbar ist und außerdem bei der Verbrennung in den Salzöfen zu viel Hitze entwickelte; das Feuer des Buchenholzes wurde nur zum Fieseln, d.h. zum Härten der Salzblöcke gebraucht. Somit wurde im Gebiet die Fichte stark gefördert und die Buche zusammen mit allem übrigen Laubholz mit allen Mitteln bekämpft. Die Tanne konnte dem Verjüngungsgang in den hauptsächlich im Großkahlschlagbetrieb genutzten Wäldern nicht folgen und verlor aus diesem Grund an Boden. (Nach v. BÜLOW 1962)

Wie groß der natürliche Anteil der Fichte in den verschiedenen Bereichen des Nationalparks wäre, konnte mit der gegebenen Methode nicht festgestellt werden, da es auf durchschnittlichen Standorten an naturnahen Beständen, die zum Vergleich herangezogen werden könnten, fehlt. Problematisch ist dabei v.a. die Beurteilung von Beständen des hochmontanen, bzw. subalpinen Bereichs, in dem zweifellos höhere natürliche Fichtenanteile zu erwarten sind, und wo auch die Bodenvegetation einen stärkeren Fichtenwaldcharakter aufweist.

Der Einfluß der Fichte auf die Bodenvegetation erwies sich im Gebiet als relativ unbedeutend verglichen mit Anbaugebieten im Flachland. In älteren Beständen ist die Artenzahl durchweg hoch und nur in lichtarmen Stangenhölzern ist die Bodenvegetation naturgemäß m.o.w. stark unterdrückt. Dies ist jedoch keinem spezifischen Effekt der Fichte zuzu-

schreiben, sondern ist in mindestens gleichem Umfang auch in entsprechenden Buchenbeständen zu beobachten. Die geringen Auswirkungen der Fichten-Nadelstreu auf die Bodenvegetation können auf die hohen Niederschläge im Gebiet zurückgeführt werden, durch die vorhandene Hemmstoffe rasch ausgewaschen werden. Insoweit es im übrigen trotzdem noch Einflüsse der Fichte auf Standort und Bodenvegetation gibt, so wirken sich diese auch in naturnahen Beständen aus, die im Gebiet ebenfalls stark durch die Fichte geprägt sind. Die deutlichsten Veränderungen bewirkt die Fichte dabei auf lehmreichen, zur Versauerung neigenden Böden, wie z.B. im Bereich des Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes, wo azidophile Arten wie *Luzula luzulina*, *Veronica officinalis*, *Rhytidiadelphus loreus* oder *Polytrichum formosum* durch die Fichte zumindest begünstigt sein dürften. Allgemein dominieren Moose in Fichtenbeständen stärker als unter Buche, weil sie dort nicht durch Laubstreu verdämmt werden. Im wesentlichen wurde nur eine Art gefunden, die in reinen Fichtenbeständen verdrängt zu werden scheint; dies ist *Polystichum lobatum*, der im Gebiet recht eng mit der Buche vergesellschaftet ist. Ob daneben auch Buchenwaldarten wie *Galium odoratum*, *Bromus benekenii*, *Elymus europaeus* u.a., die in den Tabellen KUOCHs, OBERDORFERS und ZUKRIGLs zusammen mit höheren Laubholzanteilen verstärkt auftreten, im Gebiet durch die hohe Fichtendominanz zurückgedrängt werden, erscheint fraglich. Sie wurden hier v.a. in Schluchtwäldern gefunden und sind deshalb sicher an bestimmte abiotische Faktoren gebunden. Trotz größeren Laubholzanteils treten sie auch im Kaisergebirge (SMETTAN 1981) nicht häufiger auf als in Berchtesgaden.

Neben der Fichte wurde auch die Lärche weithin durch die Forstwirtschaft und außerdem auch durch den Almweidebetrieb gefördert, weil sie einerseits gerade in früheren Jahrhunderten ein begehrtes Bauholz lieferte und andererseits unter ihrem lichten Kronenschirm eine reichhaltige Bodenvegetation aufkommen läßt, die für Weidezwecke genutzt werden kann.

Wie die Fichte bildet stellenweise auch die Buche anthropogen bedingte Reinbestände. Sie wurde v.a. in Bauernwäldern der Laubstreu wegen gefördert (v. BÜLOW 1962).

Sichere vegetationskundliche Hinweise auf Streunutzung wurden im Gebiet trotzdem kaum gefunden. Dies liegt sicher an dem weithin sehr basenreichen Ausgangsgestein und der nachschaffenden Hangkraft, durch die Böden im geeigneten Gelände nachhaltig mit Basen versorgt werden. Als einziger Streunutzungsanzeiger könnte evt. *Frangula alnus* angesehen wer-

den. Als eine Art nährstoffarmer Böden kommt er fast nur in ebenen Tal-lagen vor, die einerseits für Streunutzung besonders gut zugänglich sind, andererseits aber auch kaum Nährstoffe nachgeliefert bekommen. Ein besonders ausgedehntes Vorkommen des Faulbaums bildet der Weißseg-gen-Fichtenwald des Hirschbichtales.

Ein besonders wichtiger biotischer Einflußfaktor im Bereich der un-tersuchten Waldbestände ist die Beweidung. Sie ist, nach dem Artenbe-stand zu urteilen, wesentlich stärker ausgeprägt als in den von KUOCH, OBERDORFER, SMETTAN und ZUKRIGL untersuchten vergleichbaren Waldgesell-schaften, da diese Autoren zweifellos bevorzugt die naturnäheren Wald-bestände aufgenommen haben.

Die Beweidung wurde im wesentlichen mittels empirisch aufgefundener soziologischer Artengruppen erfaßt. Da durch Beweidung eine Reihe ganz verschiedener Standortsfaktoren verändert werden können, kann auch die Zusammensetzung einer Gruppe von Weidezeigern durchaus heterogen er-scheinen. Es gibt Weidezeiger die durch Eutrophierung gefördert werden, wie z.B. *Alchemilla vulgaris* agg. Andere, wie etwa *Briza media*, erhalten durch weidebedingte Nährstoffentzüge Konkurrenzvorteile. Solche Vorteile ergeben sich auch für giftige, schlecht schmeckende oder stachelige Ar-ten, wie *Veratrum album*, *Nardus stricta* oder *Cirsium palustre*. *Tussilago farfara* andererseits spricht auf weidebedingte Bodenverletzungen an und *Ranunculus repens* erscheint bei Bodenverdichtung. Nicht wenige Arten wurden schließlich gefunden, die sicher nur einer weidebedingten Bestan-desauflichtung ihr Vorkommen verdanken.

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle irgendwann einmal in Weidezeigergruppen auftretenden Arten und die möglichen weidebedingten Standortsfaktoren, bzw. spezifischen Anpassungen an diese, denen die Arten ihr Vorkommen verdanken könnten. (Der bei fast allen Arten mit hereinspielende Lichtfaktor ist nur dann genannt, wenn er allein aus-schlaggebend zu sein scheint.)

<i>Crataegus monogyna</i>	Bewehrung
<i>Achillea millefolium</i>	Trittfestigkeit, Eutrophie
<i>Agrostis stolonifera</i>	Verbißtoleranz, Eutrophie
<i>Alchemilla hoppeana</i>	Licht
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	Eutrophie
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Verbißtoleranz, Nährstoffverarmung
<i>Bellis perennis</i>	Eutrophie

<i>Briza media</i>	Verbißtoleranz, Nährstoffverarmung
<i>Carex flava</i>	Licht
<i>Carlina acaulis</i>	Bewehrung
<i>Cerastium fontanum</i> agg.	Eutrophie
<i>Cirsium palustre</i>	Bewehrung, Bodenverdichtung
<i>Coeloglossum viride</i>	Nährstoffverarmung
<i>Crepis aurea</i>	Eutrophie
<i>Dactylis glomerata</i>	Verbißtoleranz, Eutrophie
<i>Dactylorhiza maculata</i>	Nährstoffverarmung
<i>Deschampsia caespitosa</i>	Bodenverdichtung
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Giftigkeit, Nährstoffverarmung
<i>Festuca rubra</i>	Verbißtoleranz
<i>Galium anisophyllum</i>	Licht
<i>Gentiana asclepiadea</i>	Ungenießbarkeit
<i>Gentiana pannonica</i>	Ungenießbarkeit, Nährstoffverarmung
<i>Heracleum austriacum</i>	Licht
<i>Hypericum maculatum</i>	Nährstoffverarmung
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Eutrophie
<i>Leontodon hispidus</i>	Eutrophie
<i>Lotus corniculatus</i>	Licht
<i>Luzula campestris</i> agg.	Nährstoffverarmung
<i>Melandrium rubrum</i>	Eutrophie
<i>Myosotis palustris</i>	Eutrophie
<i>Nardus stricta</i>	Ungenießbarkeit, Nährstoffverarmung
<i>Phleum alpinum</i>	Verbißtoleranz, Eutrophie
<i>Pimpinella maior</i>	Eutrophie
<i>Plantago lanceolata</i>	(Eutrophie), Verbißtoleranz
<i>Plantago maior</i>	Trittfestigkeit, Bodenverdichtung
<i>Plantago media</i>	Licht
<i>Poa alpina</i>	Verbißtoleranz, Eutrophie
<i>Poa annua</i>	Verbißtoleranz, Eutrophie, Trittfestigkeit
<i>Poa trivialis</i>	Verbißtoleranz, Eutrophie
<i>Polygonum viviparum</i>	Licht
<i>Potentilla aurea</i>	Nährstoffverarmung
<i>Potentilla erecta</i>	Nährstoffverarmung
<i>Prunella vulgaris</i>	Eutrophierung
<i>Ranunculus acris</i>	Giftigkeit, Eutrophie
<i>Ranunculus montanus</i>	(Eutrophie), Licht
<i>Ranunculus repens</i>	Bodenverdichtung
<i>Rumex alpestris</i>	Eutrophie

<i>Selaginella selaginoides</i>	Licht
<i>Senecio abrotanifolius</i>	Licht
<i>Senecio alpinus</i>	Eutrophie
<i>Stellaria media</i>	Eutrophie
<i>Succisa pratensis</i>	Nährstoffverarmung
<i>Taraxacum officinale</i>	Eutrophie, Verbißtoleranz
<i>Thymus polytrichus</i> (sp.)	Licht
<i>Tofieldia calyculata</i>	Licht
<i>Trifolium pratense</i>	Eutrophie
<i>Trollius europaeus</i>	Ungenießbarkeit
<i>Tussilago farfara</i>	Bodenverletzung
<i>Valeriana dioica</i>	Licht
<i>Veratrum album</i>	Giftigkeit
<i>Veronica beccabunga</i>	Eutrophie
<i>Veronica chamaedrys</i>	Licht
<i>Climacium dendroides</i>	Licht
<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	Licht

Neben dem Auftreten von Weidezeigern weist auch das weithin zu beobachtende Fehlen einer gut ausgebildeten Strauchschicht und damit auch das Ausbleiben von Naturverjüngung auf eine insgesamt recht starke Beeinflussung durch Wild und Weidevieh hin. Als einzige Strauchart erreicht der giftige Seidelbast noch höhere Stetigkeiten.

Gesicherte Naturverjüngung wird v.a. bei den Laubbäumen vermißt. Im Fall der Buche könnte dies noch mit einem Mangel an Samen erklärt werden, da die flugunfähigen Samen der Buche aus den wenigen Restbeständen dieser Baumart nur schwer verbreitet werden können. Ahornkeimlinge finden sich dagegen fast in jeder Aufnahme und damit in genügender Menge, um die Verjüngung unter ungestörten Verhältnissen sicherzustellen.

Zwischen den Effekten von Weidevieh und dem hohen Rotwildbestand konnte nicht unterschieden werden. Von Seiten des Nationalparkamtes wird versucht, diese Unterschiede durch doppelte, außen vieh- und innen wild-dichte Umzäunungen herauszufinden.

2. Vegetationsgliederung

In der vorliegenden Arbeit wurde die Waldvegetation eines eng umgrenzten Gebiets in relativ zahlreiche verschiedene Einheiten untergliedert. Die Frage ist nun, ob eine scheinbar so feine Untergliederung sinnvoll und notwendig ist. Um dies beurteilen zu können, muß noch einmal klargestellt werden, wie die große Vielfalt von Einheiten zustandekam. Ursache hierfür ist nämlich sicher weniger eine besonders feine Untergliederung auf niedrigem hierarchischem Niveau, etwa durch Unterscheidung zahlreicher verschiedener Feuchtigkeits- oder Aziditätsstufen bei ein und derselben Ausgangsgesellschaft. Die Unterteilung erfolgte vielmehr meist relativ schematisch nur nach dem Vorhandensein oder Fehlen weniger Faktoren wie Felsigkeit, Beweidung, Schlag und evt. noch Laubholzbegünstigung. Diese Faktoren sind freilich m.o.w. frei kombinierbar und liefern damit zwangsläufig bereits eine wesentlich größere Zahl von Untereinheiten, als der Zahl der Faktoren entspricht und führen zu einer stärkeren Untergliederung der Vegetation, als oft üblich sein mag.

Einen bedeutenderen Beitrag zur Vegetationsvielfalt liefert trotz allem mehr die Differenzierung auf hohem hierarchischem Niveau. Diese ist ihrerseits wesentlich durch die vielfach abgewandelten Klimabedingungen im Untersuchungsgebiet bedingt, wobei Klimafaktoren wegen ihrer relativ großflächigen Einheitlichkeit als primäre Gliederungskriterien der Vegetation dienen. Im Gebiet weist nun fast jedes größere Tal seine klimatischen Besonderheiten auf - sei es ein m.o.w. starker Föhneinfluß oder der klimatische Effekt des Königssees. Hinzu kommt nicht zuletzt die Änderung des Klimas mit der Meereshöhe. Jedes Klimagebiet ist nun durch seinen eigenen Komplex von Vegetationseinheiten gekennzeichnet, je nachdem z.B. durch die Einheiten des Weißseggen-, Schneeheide- oder Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes bzw. der Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft mit den jeweiligen Kontaktgesellschaften. Nach Abschluß der gesamten Kartierungsarbeiten kann auch daran gedacht werden, das Gesellschaftsinventar dieser Komplexe genauer zu analysieren.

Eine Reduzierung der Zahl der Einheiten ist unter diesen Umständen ohne wesentlichen Informationsverlust nur in relativ geringem Umfang möglich. Eine Zusammenfassung übergeordneter, also meist klimatisch bedingter Einheiten kommt sicher nicht in Betracht. Eine Vereinfachung auf niedrigem hierarchischem Niveau könnte dagegen zwar für manche Zwecke durchaus noch ein brauchbares Ergebnis liefern; sie geht jedoch weithin

auf Kosten von Informationen über die anthropogene Beeinflussung, auf die es bei der vorliegenden Arbeit eigentlich in besonderem Maße ankam. Hinzu kommt hier, daß gerade Faktoren wie Felsigkeit, Beweidung, Schlag usw. floristisch und physiognomisch weithin eher faßbar sind als klimatische. Die durch Klimafaktoren bestimmten Einheiten zeichnen sich zwar durch ihr Vorkommen im räumlichen Zusammenhang, nicht immer jedoch durch besonders stabile Artengruppen aus. Außerhalb des Gebiets, in dem sie aufgenommen wurden, werden diese Einheiten leicht uncharakteristisch und lassen sich dem Typus oft nur noch mit Mühe zuordnen, weil natürlich einmal das Klima sich gewandelt haben kann; daneben bestimmen aber wohl auch eingeschränkte Ausbreitungsmöglichkeiten oder reine Zufallsfaktoren die räumliche Verteilung der Arten mit. Trotzdem sind die grundlegenden Vegetationseinheiten der Berchtesgadener Waldstufe durch sovielen auch in den Standortsansprüchen ähnliche Differentialarten voneinander geschieden, daß ein reines Zufallsspiel selbstverständlich nicht anzunehmen ist.

Die überregionale Gültigkeit dieser Einheiten ist jedoch durchaus noch zweifelhaft angesichts der Tatsache, daß im Gebiet noch fast jedes Transekt seine Spezialvegetation besitzt. Dies bewirkte, daß im Lauf der Arbeit ein einmal aufgestelltes Gliederungsprinzip der Vegetation immer wieder in Frage gestellt wurde. Differentialartengruppen, die gerade für die feinere Vegetationsgliederung wichtiger sind als Charakterarten, lösen sich zusehends in ihre Bestandteile auf, je mehr Einheiten miteinander verglichen werden. Letztlich gleicht ja keine Art der anderen völlig in ihren Standortsansprüchen, und die Unterschiede treten umso mehr zutage, je mehr verschiedene Standorte zur Besiedlung angeboten werden. Innerhalb größerer geographischer Räume ist die Erscheinung der soziologischen Vereinzelung der Arten nun sicherlich nichts Ungewöhnliches. Sie erschwert auch hier die Aufstellung eines allgemeingültigen Systems von Pflanzengesellschaften auf der Basis soziologischer Artengruppen. Im standörtlich reich differenzierten Kalkalpenbereich tritt die Auflösung der Differentialartengruppen dagegen offenbar schon in relativ kleinen Gebieten auf, so daß zumindest eine relativ übersichtliche Vegetationseinteilung mittels größerer Artengruppen nur in besonders kleinen Landschaftsausschnitten möglich ist. Bei welcher Flächengröße und welchem Zahlenwert eine Sättigung in der Anzahl der verschiedenen Einheiten und dem Grad der soziologischen Vereinzelung der Arten im Bereich des Hainlattich-Tannen-Buchenwaldes auftritt, kann anhand des vorliegenden Datenmaterials nicht entschieden werden; im untersuchten Gebiet ist sicher nur ein kleiner Teil aller möglichen Einheiten vertreten, denn al-

lein bei Reduktion der forstlichen Beeinflussung ist wegen des Wiederauftretens von naturnahen Waldgesellschaften mit einer Erhöhung der Gesamtzahl an Einheiten zu rechnen. Um die Übertragbarkeit der für Berchtesgaden gefundenen Gliederung der Waldvegetation auf die Wälder der übrigen bayerischen Alpen überprüfen zu können, müßten noch mehr Aufnahmedaten aus diesen Bereichen gesammelt werden, als bisher zur Verfügung stehen.

I) Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch der floristischen Gliederung der Pflanzengesellschaften in der Waldstufe des Nationalparks Berchtesgaden unter besonderer Berücksichtigung des anthropogenen Einflusses. Nach einer allgemeinen Gebietsbeschreibung sowie der Erläuterung von Aufgabenstellung und spezifischer Problematik der pflanzensoziologischen Arbeit in den Kalkalpen und der angewandten Methodik werden die vorgefundenen Vegetationseinheiten beschrieben. Der größte Teil der Einheiten wurde dem Hainlattich-Tannen-Buchenwald zugeordnet. Diese Gesellschaft ist heute fast durchweg stark mit Fichte angereichert. Sie gliedert sich deutlich in zwei Höhenformen: Der mittlere montane Bereich ist das Verbreitungsgebiet von Reinem, Neckera-, Hainsimsen- und Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald. Etwas isoliert steht der Schneeheide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, der zwar dem Weißseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald nahesteht, dem aber die Differentialarten der unteren Höhenstufe weitgehend fehlen. Die hochmontane Stufe besiedelt der Rostseggen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald. Ihm steht der Ahorn-Buchenwald nahe.

Edellaubwälder treten meist an relativ feuchten Standorten auf. Dabei bevorzugt der Ahorn-Eschenwald i.e.S. feuchte Böden, Schluchtwald

und Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft benötigen dagegen v.a. feuchte Luft. Auwälder spielen im Gebiet nur eine geringe Rolle.

Azidophilere Waldgesellschaften mit von Natur aus höherem Nadelholzanteil treten in den unteren Lagen fast nur auf silikatreichem Gestein auf. Es handelt sich hier im wesentlichen um den Labkraut-Buchen-Tannenwald. In den Hochlagen tritt auf Silikat der besonders bodensaure Alpenlattich-Fichtenwald und auf anstehendem Kalkgestein die *Luzula sylvatica*-Ausbildung der Karbonat-Fichtenwälder auf.

Gebüschgesellschaften v.a. der Hochlagen und der Lawenstriche bildet der Schneeheide-Alpenrosenbusch.

Unter den waldfreien Gesellschaften spielt im Gebiet der Blaugras-Horstseggenrasen die größte Rolle.

In der folgenden Beschreibung der einzelnen Teilgebiete wird neben Geologie und Geländemorphologie v.a. die Vegetationsdecke genauer charakterisiert. Die Beschreibung der Vegetation im räumlichen Zusammenhang läßt dabei besonders die wechselseitige Vergesellschaftung der Einheiten deutlicher werden.

Ein weiteres Kapitel versucht, die vegetationskundlichen Ergebnisse mit den bisher vorliegenden Resultaten anderer Autoren aus den Bereichen Waldgeschichte, Wildbiologie, Bodenkunde und Klimatologie zu verknüpfen.

Die Diskussion schließlich gibt neben einer kritischen Bewertung der vorliegenden Vegetationsgliederung einen Überblick über maßgebliche Umweltfaktoren, die die Vegetation des Untersuchungsgebietes prägen. Dabei wird nicht zuletzt auch der Einfluß des Menschen noch einmal näher gewürdigt.

LITERATURVERZEICHNIS

- ADE, A. - 1911 - Vorarbeiten zur Durchforschung des Pflanzenschonbezirks bei Berchtesgaden. Jahresbericht des Vereins zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen 10.
- AGER, Th. - 1970 - Die Waldweide im oberbayerischen Bergbauerngebiet. Der Almbauer 22 (2). München
- AGER, Th. - 1968 - Aus der Geschichte der Berchtesgadener Almwirtschaft. Der Almbauer 20 (10). München
- AICHINGER, E. - 1951 - Vegetationskundliche Vorarbeiten zur Ordnung von Wald und Weide. Angew. Pflanzensoz. 2. Wien
- ALTKOEFER, T. - 1975 - Jagdgeschichtliche Entwicklung im Berchtesgadener Land mit besonderer Berücksichtigung der Wildarten seit der Hofjagdzeit. Dipl.-Arb., Universität München
- Arbeitsgemeinschaft Bodenkunde - 1971 - Kartieranleitung. Hannover
- ATZLER, R. - 1978 - Schwankungen der Qualität der Bodenvegetation während der Vegetationszeit im Rothirsch-Untersuchungsgebiet Ammergauer Berge. Dipl.-Arb., Universität München
- BACHMANN, P. - 1965 - Die heutige, natürliche und im Rahmen der Regionalplanung anzustrebende Waldgrenze im Binnthal. Schweizer Zeitschr. f. Forstwesen 116. Zürich
- BARTSCH, J. u. M. - 1952 - Der Schluchtwald und der Bach-Eschenwald. Angew. Pflanzensoz. 8. Wien
- BAUER, H. - 1921 - Die Almböden im Berchtesgadener Gebiete. Alm und Weide 2 (6). München
- BAUER, H. - 1921 - Die Almverpachtung im Berchtesgadener Lande. Alm und Weide 2 (9). München

- BAUER, H. - 1921 - Die Besitzverhältnisse der Berchtesgadener Alpen.
Alm und Weide 2 (10). München
- BAUER, H. - 1921 - Die Hornviehsommerung im Berchtesgadener Land. Alm
und Weide 2 (12). München
- BAUER, H. - 1921 - Schwenden und Schwandreht im Berchtesgadener Lande.
Alm und Weide 2 (14). München
- BAUER, H. - 1921 - Die Almstaffeln und die Auftriebszeiten im Berchtes-
gadener Lande. Alm und Weide 2 (15). München
- BAUER, H. - 1922 - Die Hochalmen im Berchtesgadener Lande. Alm und
Weide 3 (6). München
- Bayerisches Geologisches Landesamt - 1964 - Erläuterungen zur Geologi-
schen Karte von Bayern 1 : 500 000. München
- BERTSCH, K. - 1966 - Moosflora von Südwestdeutschland. Stuttgart
- BERTSCH, K. - 1964 - Flechtenflora von Südwestdeutschland. Stuttgart
- BICHLMAIER, F., GUNDERMANN, E. - 1974 - Beiträge zur Quantifizierung
der Sozialfunktion des Waldes im bayerischen Hochgebirge. Forschungs-
ber. FFA München 21
- BODENMANN, A., EIBERLE, K. - 1967 - Über die Auswirkungen des Verbisses
der Gemse im Aletschwald. Schweizer Zeitschr. f. Forstwesen 118. Zü-
rich
- BOCHTER, R. - 1978 - Die Kohlenstoff- und Stickstoffvorräte in Wald- und
Almböden der montanen Stufe des Hagengebirges/Berchtesgadener Alpen
und ihre Beeinflussung durch die menschliche Wirtschaftsweise.
Unveröffentlichte Zulassungsarbeit, Fach Geographie, Universität Mün-
chen
- Botanical Society of Lund - 1956 - Illustrated Moss Flora of Fennoscan-
dia. Lund
- BRAUN-BLANQUET - 1964 - Pflanzensoziologie. Wien-New York

- BREHME, K. - 1951 - Jahrringschronologische und klimatologische Untersuchungen an Hochgebirgslärchen des Berchtesgadener Landes. Zeitschr. f. Weltforstwirtschaft 14 (3/4)
- BUBENIK, A.B. - 1967 - Probleme der Wildddichte im Lichte der Wildsoziologie. Schweizer Zeitschr. f. Forstwesen 118. Zürich
- v. BÜLOW, G. - 1962 - Die Sudwälder von Reichenhall. Mitt. Staatsforstverw. Bayerns 33. München
- CARBIENER, R. - 1970 - Frostmusterböden, Solifluktion, Pflanzengesellschaftsmosaik und -struktur, erläutert am Beispiel der Hochvogesen. In: R. TÜXEN (Hrsg.), Gesellschaftsmorphologie (Strukturforschung), Ber. Symp. Int. Ver. Vegetationskunde Rinteln 1966. Den Haag
- CARBIENER, R. - 1974 - Wald- und Baumgrenze in den Vogesen. In: R. TÜXEN (Hrsg.) Tatsachen und Probleme der Grenzen in der Vegetation. Ber. Int. Symp. Int. Verein. Vegetationsk. in Rinteln, 8. - 11. 4. 1968. Vaduz
- DANZ, W. - 1970 - Was kostet die Erhaltung der Kulturlandschaft im Bergbauerngebiet? Das Bergbauerngebiet als Erholungsraum. Der Almbauer 22 (6). München
- DIEHL, G. - 1925 - Weide- und Holzrechte in der Berchtesgadener Ramsau. Der Alpenfreund 6. München
- EIBERLE, K. - 1965 - Beobachtungen über den Verbiß der Rottanne. Schweizer Zeitschr. f. Forstwesen 116. Zürich
- EIBERLE, K. - 1975 - Das Rotwildproblem im Schweizerischen Nationalpark. Allg. Forstzeitschr. 30 (7)
- ELLENBERG, H. - 1978 - Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. Stuttgart
- ELLENBERG, H. - 1979 - Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. Scripta Geobotanica 9. Göttingen
- ENDERS, G. - 1979 - Theoretische Topoklimatologie. Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsberichte 1. Berchtesgaden

- FALINSKI, J.B. - 1975 - Die Reaktion der Waldbodenvegetation auf Tritt-
wirkung im Lichte experimenteller Forschungen. Phytocoenologia 2
(3/4). Berlin-Stuttgart, Lehre
- FEHN, K. - 1968 - Almen und Almwirtschaft im Berchtesgadener Land vom
Mittelalter bis zur Gegenwart. Zeitschrift für Agrargeschichte und
Agrarsoziologie 16. Frankfurt
- FEOLI, E., FEOLI CHIAPELLA, L. - 1979 - Releve Ranking Based on a Sum
of Squares Criterion. Vegetatio 39 (2). Den Haag
- FISCHBACHER, G. - 1956 - Über das Waldweideproblem und die Bergbauern-
frage. Bayer. Landwirtsch. Jahrb. 33, Sonderheft 2
- FRAHM, J.-P., FREY, W. - 1983 - Moosflora. Stuttgart
- FREIBERG, H.-M. - 1980 - Pflanzensoziologische Untersuchungen im Bereich
der alpinen Baumgrenze am Glunkerer im Funtenseegebiet - Nationalpark
Berchtesgaden. Dipl.Arb., Fachbereich Forstwissenschaft der Universi-
tät München
- GAMS, H. - 1973 - Die Moos- und Farnpflanzen. Stuttgart
- GANSS, O. - o.J. - Geologie der Berchtesgadener und Reichenhaller Al-
pen. Berchtesgaden
- GAYL, A. - 1951 - Ordnung von Wald und Weide im Bereich der Almen.
Angew. Pflanzensoz. 2. Wien
- GÖSSINGER, L. - 1981 - Pollenanalysen zur Waldgeschichte am Königssee
(603 m NN) - Nationalpark Berchtesgaden. Dipl.Arb., Fachbereich
Forstwissenschaft der Universität München
- GROSSER, K.H. - 1965 - Vegetationskomplexe und Komplexgesellschaften in
Mooren und Sümpfen. Feddes Repertorium, Beiträge zur Vegetationskunde
VII. Berlin
- HAEUSER, J. - 1930 - Die Niederschlagsverhältnisse in Bayern und den an-
grenzenden Staaten. Veröff. Bayer. Landesst. für Gewässerkunde. Mün-
chen

- HARTMANN, F.K. - 1974 - Mitteleuropäische Wälder. Stuttgart
- HESSE, W. - 1966 - Grundlagen der Meteorologie für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft. Leipzig
- HÖFLER, K., WENDELBERGER, G. - 1960 - Botanische Exkursion nach dem "Märchenwald" im Amertal (Hohe Tauern). Verh. Zool.-Botan. Ges. Wien 100
- HOFMANN, G., PASSARGE, H. - 1964 - Über Homogenität und Affinität in der Vegetationskunde. Arch. Forstw. 13 (11). Berlin
- HOFMANN, G. - 1965 - Über Vegetationskomplexe unter besonderer Berücksichtigung der Trockenwaldkomplexe. Feddes Repertorium, Beih. 142
- JACUCS, P. - 1970 - Bemerkungen zur Saum-Mantel-Frage. Vegetatio 21 (1-3). Den Haag
- JAHN, G. - 1977 - Die Fichtenwaldgesellschaften in Europa. In: SCHMIDT-VOGT (Hrsg.), Die Fichte. Hamburg
- JANCEY, R.C. - 1979 - Species Ordering on a Variance Criterion. Vegetatio 39 (1). Den Haag
- JELEM, H., KILIAN, W. - 1975 - Wälder und Standorte am steirischen Alpenostrand, Wuchsraum 18. Mitt. forstl. Bundesversuchsanst. Wien 111
- KARL, H. - 1970 - Die Wald- und Weidenutzung in den Bayerischen Alpen im Strukturwandel der Gegenwart. Natur und Landschaft 45 (3). Bonn
- KIELLAND-LUND, J. - 1981 - Die Waldgesellschaften SO-Norwegens. Phytocoenologia 9 (1/2). Berlin-Stuttgart, Braunschweig
- KIOROGLANIDIS, J. - 1981 - Nahrungswahl und Überlegungen zur Nahrungsnische bei Reh (*Capreolus capreolus*), Rothirsch (*Cervus elaphus*) und Gemse (*Rupicaprina rupicaprina*) im Nationalpark Berchtesgaden. Diss. Universität München
- KLÖTZLI, F. - 1967 - Zusammenfassende Schau über die Praxis der Wildschadensverhütung beim Rehwild. Schweizer Zeitschr. f. Forstwesen 118. Zürich

- KNAPP, R. - 1967 - Experimentelle Soziologie und gegenseitige Beeinflussung der Pflanzen. Stuttgart
- KNAPP, R. - 1975 - Zur Methodik der Untersuchung von Gesellschaftskomplexen mit Beispielen aus Hessen und Afrika. Phytocoenologia 2 (3/4) Berlin-Stuttgart, Lehre
- KNAPP, R. - 1954 - Über subalpine Buchenmischwälder in den nördlichen Ostalpen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 30. München
- KNECHT, T. - 1913 - Siedlungsgeographie von Berchtesgaden. Diss.
- KNOTT, H. - 1982 - Die Geschichte der Salinen Schellenberg und Frauenreuth/Berchtesgaden. Dipl.Arb., Fachber. Forstw. Universität München
- KÖSTLER, J.N. - 1950 - Die Bewaldung des Berchtesgadener Landes. Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere 15. München
- KÖSTLER, J.N., MAYER, H. - 1970 - Waldgrenzen im Berchtesgadener Land. Jb. Ver. Schutze Alpenpfl. -Tiere 35. München
- KÖSTLER, J.N., MAYER, H. - 1974 - Wälder im Berchtesgadener Land. Gutachten über die künftige Behandlung des Waldes im Alpenpark Berchtesgadener Land. München
- KRAUSE, W. - 1952 - Das Mosaik der Pflanzengesellschaften und seine Bedeutung für die Vegetationskunde. Planta 41 (3). Berlin - Göttingen - Heidelberg
- KÜNNE, H. - 1969 - Laubwaldgesellschaften der Frankenalb. Diss. Bot. 2. Lehre
- KUOCH, R. - 1954 - Wälder der Schweizer Alpen im Verbreitungsgebiet der Weißtanne. Mitt. Schweiz. Anst. Forstl. Versuchsw. 30. Zürich
- Landesjagdverband Bayern e.V. - 1973 - Gutachten: Wild und Jagd im Alpenpark
- LIPPERT, W. - 1966 - Die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes Berchtesgaden. Ber. Bayer. Bot. Ges. 39. München

- LOESKE, L. - 1904 - Bryologische Notizen aus den Salzburger und Berchtesgadener Alpen. Hedwigia 43. Dresden
- LOHMEYER, W. - 1963 - Erfahrungen bei der Verwendung von Luftbildern für die Vegetationskartierung. In: R. TÜXEN (Hrsg.), Bericht über das Internationale Symposium für Vegetationskartierung vom 23. - 26.3. 1959 in Stolzenau/Weser. Weinheim
- LOUPPEN, J.M.W., van der MAAREL, E. - 1979 - CLUSLA: A Computer Program for the Clustering of Large Phytosociological Datasets. Vegetatio 40 (2). Den Haag
- van der MAAREL, E., JANSSEN, J.G.M., LOUPPEN, J.M.W. - 1978 - TABORD: A Program for Structuring Phytosociological Tables. Vegetatio 38. Den Haag
- van der MAAREL, E., ORLOCI, L., PIGNATTI, S., - 1976 - Data Processing in Phytosociology, Retrospect and Anticipation. Vegetatio 32. Den Haag
- MAGIN, R. - 1949 - Einfluß der Waldweide auf Zuwachs und Ertrag des Waldes. Diss. Universität München
- MAGNUS, K. - 1914 - Botanisch-geologische Wanderung von St. Bartholomä nach Saalfelden nebst einer Schilderung der Flora der Eiskapelle. 13. Bericht des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen
- MAGNUS, K. - 1915 - Die Vegetationsverhältnisse des Pflanzenschonbezirks Berchtesgaden. Ber. Bay. Bot. Ges. 15. München
- MAYER, H. - 1950 - Die natürliche Verbreitung der Lärche in den Berchtesgadener Kalkalpen. Diss., Universität München
- MAYER, H. - 1957 - An der Kontaktzone des Lärchen- und Fichtenwaldes in einem Urwaldrest der Berchtesgadener Kalkalpen. Jb. Ver. Schutze Alpenpfl. -Tiere 22. München
- MAYER, H. - 1959 - Waldgesellschaften der Berchtesgadener Kalkalpen. Mitt. Staatsforstverw. Bayerns 30. München

- MAYER, H. - 1961 - Märchenwald und Zauberwald im Gebirge. Zur Beurteilung des Block-Fichtenwaldes (Asplenio-Piceetum). Jb. Ver. Schutze Alpenpfl.-Tiere 26. München
- MAYER, H. - 1963 - Tannenreiche Wälder am Nordabfall der mittleren Ostalpen. München-Basel-Wien
- MAYER, H. - 1964 - Zur Waldgeschichte des Steinernen Meeres (Naturschutzgebiet Königssee). Jb. Ver. Schutze Alpenpfl. -Tiere 30. München
- MAYER, H. - 1966 - Waldgeschichte des Berchtesgadener Landes (Salzburger Kalkalpen). Forstwiss. Forsch. 22. Hamburg-Berlin
- MAYER, H. - 1969 - Die Rolle der Charakterarten bei der Beurteilung fichtenreicher Wälder der Alpen. Vegetatio 19. Den Haag
- MAYER, H. - 1974 - Wälder des Ostalpenraumes. Stuttgart
- MAYER, H. - 1975 - Zum Alpenpark Berchtesgadener Land. Allg. Forstzeitschrift 30
- MAYER, H., FELDNER, R., GRÖBL, W. - 1967 - Montane Fichtenwälder auf Hauptdolomit im Naturschutzgebiet "Ammergauer Berge". Jb. Ver. Schutze Alpenpfl. -Tiere 32. München
- MAYER, H., PLOCHMANN, R. - 1954 - Natürliche Vorkommen und künstlicher Anbau der Lärche in zwei bemerkenswerten Waldgebieten Südbayerns. Berchtesgadener Land und Frankenjura. Forstwiss. Forsch. 4. Hamburg-Berlin
- MAYER, H., SCHLESINGER, B., THIELE, K. - 1967 - Dynamik der Waldentstehung und Waldzerstörung auf den Dolomit-Schuttflächen im Wimbachgries (Berchtesgadener Kalkalpen). Jb. Ver. Schutze Alpenpfl. -Tiere 32 München
- MEISTER, G. - 1970 - Die Entwicklung des Wildbestandes. Der Almbauer 22 (1). München
- MEISTER, G. - 1971 - Erholung im Gebirgswald. Der Almbauer 23 (2). München
- MEISTER, G. - 1976 - Nationalpark Berchtesgaden. München

- MERXMÜLLER, H. - 1952, 1953, 1954 - Untersuchungen zur Sippengliederung und Arealbildung in den Alpen. Jb. Ver. Schutze Alpenpfl. -Tiere 17, 18, 19. München
- van der MEULEN, F., MORRIS, J.W., WESTFALL, R. - 1978 - A Computer Aid for the Preparation of Braun-Blanquet Tables. Vegetatio 38 (3). Den Haag
- MEUSEL, H., JÄGER, E., WEINERT, E. - 1965 - Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Jena
- MEUSEL, H., JÄGER, E., RAUSCHERT, S. WEINERT, E. - 1978 - Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Jena
- MICHALKO, J. - 1970 - Über Mantel und Saumgesellschaften des Verbandes Quercion pubescenti-petraeae. In: R. TÜXEN (Hrsg.), Gesellschaftsmorphologie (Strukturforschung), Ber. Symposion Int. Ver. Vegetationssk. Rinteln 1966. Den Haag
- MISHRA, V.K. - 1982 - Genesis and Classification of Soils Derived from Hauptdolomit (Dolomite) in Kalkalpen and Effects of Soil Type and Humus Form on some Features of Forest Natural Regeneration. Diss., Fachbereich Forstwissenschaft der Universität München
- MOOR, M. - 1952 - Die Fagion-Gesellschaften im Schweizer Jura. Beitr. geobot. Landesaufn. Schweiz. 31. Bern
- MOOR, M. - 1975 - Ahornwälder im Jura und in den Alpen. Phytocoenologia 2(3/4). Berlin-Stuttgart, Lehre
- MOOR, M. - 1978 - Die Klasse der Eschen-Buchenwälder (Fraxino-Fagetea) Phytocoenologia 4 (4). Berlin-Stuttgart, Lehre
- MOOR, M. - 1979 - Das Felsenbirnen-Gebüsch (Cotoneastro-Amelanchieretum), eine natürliche Mantelgesellschaft im Jura, Phytocoenologia 6. Berlin-Stuttgart, Braunschweig
- MÜLLER - 1971 - Die speziellen landwirtschaftlichen Probleme im Berchtesgadener Land. Der Almbauer 23 (5). München

- MÜLLER, F. - 1977 - Die Waldgesellschaften und Standorte des Sengsengebirges und der Mollner Voralpen (Oberösterreich). Mitt. Forstl. Bundesversuchsanst. Wien 121
- MÜLLER, Th. - 1970 - Mosaikkomplexe und Fragmentkomplexe. In: R. TÜXEN (Hrsg.), Gesellschaftsmorphologie (Strukturforschung), Ber. Symposion Int. Ver. Vegetationsk. Rinteln 1966. Den Haag
- MÜLLER-STOLL, W.R. - 1954 - Beiträge zur Ökologie der Waldgrenze am Feldberg im Schwarzwald. Angew. Pflanzensoz., Festschrift E. AICHINGER Bd. II. Wien
- MUTZBAUER - 1972 - Stand der Almwirtschaft im Landkreis Berchtesgaden. Der Almbauer 24 (3). München
- NEUHÄUSL, R. - 1977 - Delimitation and Ranking of Floristic-sociological Units on the Basis of Relevé Similarity. Vegetatio 35 (2). Den Haag
- OBERDORFER, E. - 1950 - Beitrag zur Vegetationskunde des Allgäu. Beitr. naturk. Forsch. Südwestdt. 9. Karlsruhe
- OBERDORFER, E. - 1953 - Der europäische Auenwald. Beitr. naturk. Forsch. Südwestdt. 12. Karlsruhe
- OBERDORFER, E. - 1957 - Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Jena
- OBERDORFER, E. - 1977 - Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil I, Stuttgart-New York
- OBERDORFER, E. - 1978 - Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil II, Stuttgart-New York
- OBERDORFER, E. - 1979 - Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Stuttgart
- ORLOCI, L. - 1976 - TRGRPS - An Interactive Algorithm for Group Recognition with an Example from Spartinetea. Vegetatio 32. Den Haag
- PASSARGE, H. - 1965 - Zur Frage der Probeflächenwahl bei Gesellschaftskomplexen im Bereich der Wasser- und Verlandungsvegetation. Feddes Repertorium, Beiträge zur Vegetationskunde VII. Berlin

- PAUL, H. - 1939 - Die Verbreitung südlicher Pflanzen in den bayerischen Alpen. Jb. Ver. Schutze Alpenpfl. -Tiere 11. München
- PAUL, H., v. SCHÖNAU, K. - 1925 - Die Kryptogamenflora des Naturschutzgebietes bei Berchtesgaden. Festschr. d. Sektion Berchtesgaden des D. u. Ö. A.-V.
- PAUL, H., v. SCHÖNAU, K. - 1927 - Botanische Ergebnisse (Naturschutzgebiet Berchtesgaden) I. Bericht des Vereins zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen 17
- PAUL, H., v. SCHÖNAU, K. - 1928 - Die wissenschaftliche Durchforschung des Naturschutzgebietes Berchtesgaden. Botanische Ergebnisse II. Bericht des Vereins zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen 18
- PAUL, H., v. SCHÖNAU, K. - 1929 - Die naturwissenschaftliche Durchforschung des Naturschutzgebietes Berchtesgaden. Botanische Ergebnisse III. Jb. Ver. Schutze Alpenpfl. 1. München
- PAUL, H., v. SCHÖNAU, K. - 1930 - Die wissenschaftliche Durchforschung des Naturschutzgebietes Berchtesgaden IV. Die Pflanzenbestände auf den Schottern des oberen Wimbachtales. Jb. Ver. Schutze Alpenpfl. 2 München
- PAUL, H., v. SCHÖNAU, K. - 1931 - Die wissenschaftliche Durchforschung des Naturschutzgebietes Berchtesgaden V. Botanische Notizen aus dem Naturschutzgebiet. Jb. Ver. Schutze Alpenpfl. 3. München
- PAUL, H., v. SCHÖNAU, K. - 1932 - Die naturwissenschaftliche Durchforschung des Naturschutzgebietes Berchtesgaden VI. Botanische Ergebnisse. Jb. Ver. Schutze Alpenpfl. 4. München
- PAUL, H., v. SCHÖNAU, K. - 1933 - Die naturwissenschaftliche Durchforschung des Naturschutzgebietes Berchtesgaden VII. Botanische Ergebnisse. Jb. Ver. Schutze Alpenpfl. 5. München
- PAUL, H., v. SCHÖNAU, K. - 1934 - Botanische Streifzüge im Funtenseegebiet. VIII. Jb. Ver. Schutze Alpenpfl. 6. München
- PETERMANN, R. - 1970 - Montane Buchenwälder im westbayerischen Alpenvorland zwischen Iller und Ammersee. Diss. Bot. 8. Lehre

- PETERMANN, R., SEIBERT, P. - 1979 - Die Pflanzengesellschaften des Nationalparks Bayerischer Wald. BStMELF (Hrsg.): Nationalpark Bayerischer Wald 4
- PFADENHAUER, J. - 1969 - Edellaubholzreiche Wälder im Jungmoränengebiet des bayerischen Alpenvorlandes und in den bayerischen Alpen. Diss. Bot. 3. Lehre
- PFADENHAUER, J. - 1975 - Beziehungen zwischen Standortseinheiten, Klima, Stickstoffernährung und potentieller Wuchsleistung der Fichte im bayerischen Flyschgebiet. Diss. Bot. 30. Vaduz
- PFEIFFER, H. - 1958 - Über das Zusammentreten von Pflanzengesellschaften in Komplexen. Phytion 7. Horn (Niederösterreich)
- PIGNATTI, S. - 1976 - A System for Coding Plant Species for Data-Processing in Phytosociology. Vegetatio 33. Den Haag
- PIGNATTI, E. u. S. - 1975 - Syntaxonomie of the Sesleria varia-Grasslands of the Calcareous Alps. Vegetatio 30. Den Haag
- PLOCHMANN, R. - 1970 - Die Waldweide im oberbayerischen Bergbauerngebiet. Lehren der Geschichte - Probleme der Zukunft. Natur und Landschaft 45. Bonn
- PROCTOR, M.C.F. - 1974 - Ordination, Classification and Vegetational Boundaries. In: R. TÜXEN (Hrsg.), Tatsachen und Probleme der Grenzen in der Vegetation, Ber. Int. Symp. Int. Verein. Vegetationsk. in Rinteln, 8. - 11. 4. 1968. Vaduz
- REHFUESS, K.E. - 1981 - Waldböden - Entwicklung, Eigenschaften und Nutzung. Hamburg - Berlin
- Reichsamt für Wetterdienst - 1939 - Klimakunde des Deutschen Reiches. Berlin
- RODI, D. - 1970 - Das Vegetations- und Bodenmosaik einer Waldinsel auf Mineralboden im Donaumoos. In: R. TÜXEN (Hrsg.), Gesellschaftsmorphologie (Strukturforschung), Ber. Symposion Int. Ver. Vegetationsk. Rinteln 1966. Den Haag

- RÖHLE, H. - 1977 - Über den Einfluß der menschlichen Wirtschaftsweise auf Humus- und N-Vorräte in Gebirgsböden des Hochkaltergebietes. Dipl.- Arb., Universität München
- SCAMONI, A. - 1965 - Zur Frage der Vegetationskomplexe. Feddes Repertorium, Beih. 142. Berlin
- SCAMONI, A., PASSARGE, H., HOFMANN, G. - 1965 - Grundlage einer objektiven Systematik der Pflanzengesellschaften. Feddes Repertorium, Beih. 142. Berlin
- SCHMIDTHÜSEN - 1963 - Der wissenschaftliche Inhalt von Vegetationskarten verschiedener Maßstäbe. In: R. TÜXEN (Hrsg.), Bericht über das Internationale Symposion für Vegetationskartierung vom 23. - 26.3. 1959 in Stolzenau/Weser. Weinheim
- SEIBERT, P. - 1958 - Die Pflanzengesellschaften im Naturschutzgebiet Pupplinger Au. Landschaftspflege und Vegetationskunde 1. München
- SEIBERT, P. - 1962 - Die Auenvegetation an der Isar nördlich von München und ihre Beeinflussung durch den Menschen. Landschaftspflege und Vegetationskunde 3. München
- SEIBERT, P. - 1963 - Pflanzensoziologische und bodenkundliche Untersuchungen im Naturschutzgebiet "Pupplinger Au" als Grundlage für Maßnahmen der Wasserwirtschaft. Ber. Intern. Symp. f. Vegetationskartierung vom 23. - 26. 3. 1959 in Stolzenau/Weser. Weinheim
- SEIBERT, P. - 1966 - Kiefernwälder des Erico-Pinion im bayerischen Vor-alpenland. Angew. Pfl.-Soz. 19. Wien
- SEIBERT, P. - 1968 - Übersichtskarte über die natürlichen Vegetationsgebiete von Bayern 1 : 500 000 mit Erläuterungen. Schriftenr. f. Vegetationsk. 3. Bad Godesberg
- SEIBERT, P. - 1968 - Vegetation und Landschaft in Bayern. Erdkunde 12. Bonn
- SEIBERT, P. - 1969 - Über das Aceri-Fraxinetum als vikariierende Gesellschaft des Galio-Carpinetum am Rande der bayerischen Alpen. Vegetatio 17. Den Haag

- SEIBERT, P. - 1973 - Waldgesellschaften nasser Standorte am bayerischen Alpenrand. Ber. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel 51. Zürich
- SEIBERT, P. - 1974 - Die Rolle des Maßstabs bei der Abgrenzung der Vegetationseinheiten. In: R.TÜXEN (Hrsg.), Tatsachen und Probleme der Grenzen in der Vegetation, Ber. Int. Symp. Int. Verein. Vegetationsk. in Rinteln, 8. - 11. 4. 1968. Vaduz
- SEIBERT, P. - 1978 - Vegetation. In: BUCHWALD, ENGELHARDT (Hrsg.), Handbuch für Planung, Gestaltung und Schutz der Umwelt, Bd. 2: Die Belastung der Umwelt. München-Basel-Wien
- SEIBERT, P. - 1981 - Bibliographie pflanzensoziologischer Arbeiten in Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. 52. München
- SENDTNER, O. - 1854 - Die Vegetationsverhältnisse Südbayerns. München
- SEYBERT, M. - 1973 - Die Sanierung des Alpengebiets. Der Almbauer 26 (10,11). München
- SICHLER, G. - 1969 - Jagd und Almwirtschaft. Der Almbauer 21 (1). München
- SIEDE, E. - 1960 - Untersuchungen über die Pflanzengesellschaften im Flyschgebiet Oberbayerns. Landschaftspflege und Vegetationskunde 2. München
- SILBERNAGL, H. - 1973 - Sind Almkühe Trampeltiere? Der Almbauer 26 (12). München
- SIMMERDING, E. - 1980 - Der Lärchen-Zirbenwald und die Strauchformationen auf der Reiteralm (Alpennationalpark Berchtesgaden). Dipl.Ar., Fachbereich Forstwissenschaft der Universität München
- SMETTAN, H.W. - 1981 - Die Pflanzengesellschaften des Kaisergebirges. Verein zum Schutz der Bergwelt, Jubiläumsausgabe. München
- SMITH, A.J.E. - 1978 - The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge-New York-Melbourne

- SPATZ, G. - 1972 - Eine Möglichkeit zum Einsatz der EDV bei der pflanzensoziologischen Tabellenarbeit. In: E. VAN DER MAAREL, R. TÜXEN, (Hrsg.), Grundfragen und Methoden der Pflanzensoziologie. Bericht über das Internationale Symposium für Vegetationskunde 1970. Rinteln. Den Haag
- STOCKINGER, J.J., HOLZNER, W.F., - 1972 - Rationelle Methode zur Auswertung pflanzensoziologischer Aufnahmen mittels Elektronenrechner. In: E. VAN DER MAAREL, R. TÜXEN (Hrsg.), Grundfragen und Methoden der Pflanzensoziologie. Bericht über das Internationale Symposium für Vegetationskunde 1970, Rinteln. Den Haag
- STÜCKER, G. - 1965 - Vegetationskomplexe auf Felsstandorten, ihre Auflösung und Systematisierung der Komponenten. Feddes Repertorium 142 Berlin
- STORCH, M. - 1977 - Sind die Waldgesellschaften der nördlichen Kalkalpen kartierbar? Dipl. Arb., Fachbereich Biologie der Universität München
- STRENG, R., SCHÖNFELDER, P. - 1978 - Ein heuristisches Computerprogramm zur Ordnung pflanzensoziologischer Tabellen. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 37
- SUKOPP, H. - 1957 - Der Einfluß des Menschen auf die Vegetation. Mitt. Florist.-soziolog. Arbeitsgem. N.F. 6/7. Stolzenau/Weser
- THIELE, K. - 1978 - Vegetationskundliche und pflanzenökologische Untersuchungen im Wimbachgries. Aus den Naturschutzgebieten Bayerns 1. München-Wien
- TRAUTMANN, W. - 1963 - Methoden und Erfahrungen bei der Vegetationskartierung der Wälder und Forsten. In: R. TÜXEN (Hrsg.), Bericht über das Internationale Symposium für Vegetationskartierung vom 23. - 26. 3. 1959 in Stolzenau/Weser. Weinheim
- TÜXEN, R., LOHMEYER, W. - 1962 - Über Untereinheiten und Verflechtungen von Pflanzengesellschaften. Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N.F. 9. Stolzenau/Weser

- WAGNER, H. - 1972 - Zur Methodik der Erstellung und Auswertung von Vegetationstabellen. In: E. VAN DER MAAREL, R. TÜXEN, (Hrsg.) Grundfragen und Methoden der Pflanzensoziologie. Bericht über das Internationale Symposium für Vegetationskunde 1970, Rinteln. Den Haag
- WENDELBERGER, G. - 1951 - Das vegetationskundliche System E. Aichingers und seine Stellung im pflanzensoziologischen Lehrgebäude Braun-Blanquets. Angew. Pflanzensoz. 1. Wien
- WENZEL, A. - 1963 - Technische Erfahrungen in der Vegetationskartographie. In: R. TÜXEN (Hrsg.), Bericht über das Internationale Symposium für Vegetationskartierung vom 23. - 26. 3. 1959 in Stolzenau/Weser. Weinheim
- WILMANNS, O. - 1970 - Kryptogamen-Gesellschaften oder Kryptogamen-Synusien. In: R. TÜXEN (Hrsg.), Gesellschaftsmorphologie (Strukturforschung), Ber. Symposium Intern. Ver. Vegetationsk. Rinteln 1966. Den Haag
- WILMANNS, O., EBERT, J. - 1974 - Aktuelle und potentielle Grenze des Latschengürtels im Quellgebiet des Lech (Vorarlberg). In: R. TÜXEN (Hrsg.): Tatsachen und Probleme der Grenzen in der Vegetation. Vaduz
- ZEIDLER, H. - 1970 - Edaphisch und anthropogen bedingtes Vegetationsmosaik in Wäldern. In: R. TÜXEN (Hrsg.), Gesellschaftsmorphologie (Strukturforschung), Ber. Symposium Int. Ver. Vegetationsk., Rinteln 1966. Den Haag
- ZIELONKOWSKI, W. - 1975 - Vegetationskundliche Untersuchungen im Rotwandgebiet zum Problemkreis Erhaltung der Almen. Schriftenr. Naturschutz u. Landschaftspfl. 5. München
- ZUKRIGL, K. - 1973 - Montane und subalpine Waldgesellschaften am Alpenostrand unter mitteleuropäischem, pannonischem und illyrischem Einfluß. Mitt. FBVA 101. Schönbrunn. Wien

ANHANG

1. Erläuterung bodenkundlicher Begriffe

Horizontbezeichnungen: (nach: REHFUESS, 1981 bzw. Kartieranleitung der
Arbeitsgemeinschaft Bodenkunde, 1971)

- O Organischer Auflagehumushorizont (außer Torf) über dem Mineralboden
- OL fast unzersetzte Pflanzenteile (Streu); locker, höchstens angebissen und löcherig, nicht zerkleinert und nicht verklebt
- OF Vermoderungslage; Blattfragmente und -rudimente, zerkleinert, verklebt, verpilzt
- OH Humusstofflage; dunkelbraune bis schwarze, feinsubstanzreiche Lage
- A im Bereich der Bodenoberfläche gebildeter Mineralbodenhorizont
- Ah humoser, von Bodentieren durchwühlter und vermischter Horizont
- Al hellbrauner, schluffreicher, durch Ausspülung an Ton verarmter Horizont
- Ae gebleichter, hellgrauer (aschefarbener), humusarmer, durch Auswaschung an Fe, P, K, Mg, Ca u.a. Elementen verarmter Horizont, infolge Tonzerfalls tonarm
- B Verwitterungs-, Verlehmungs- oder/und Anreicherungs- horizonz im tieferen Solubereich
- Bv verbrauchter und verlehmtter Horizont unter dem A ohne nennenswerte Illuviation (Anreicherung)
- Bt mit eingespültem, vorwiegend unzerstörtem Ton angereicherter Illuvialhorizont

Bs mit eingespülten Sesquioxiden (v.a. Fe-, Al-, Mn-Oxide und Hydroxide) angereicherter Illuvialhorizont

C Gestein unterhalb des Solums

Cv schwach (vorwiegend physikalisch) verwitterter Übergangsreich zum frischen Gestein

Cn frisches, unverwittertes Gestein

S durch Stauwasser beeinflusster Horizont

II Schichtensymbol zur Charakterisierung der geologischen Schichtung

Korngrößen:

S, s	Sand, sandig	0,0630...2,000 mm
U, u	Schluff, schluffig	0,0020...0,063 mm
T, t	Ton, tonig	<0,0002...0,002 mm

2. Beschreibung des für die Bearbeitung der Vegetationstabellen entwickelten FORTRAN-Programms (neuere Fassung)

1. Programmfunktionen

- Wiedergabe der meisten in Vegetationsaufnahmen enthaltenen Informationen: Darstellung von Artmächtigkeit und Soziabilität, bzw. von Prozentzahlen, originaler Aufnahmeummer und bei Bedarf von maximal 28 Tabellenkopfzeilen zur Angabe von Aufnahmemonat, Aufnahmefläche, Meereshöhe, Exposition, Hangneigung, Relief, Höhe und Deckungsgrad der Vegetationsschichten u.a. Gesonderte Tabellierung von beliebigen Zusatzzeichen (z.B. zur Kennzeichnung der Vitalität, von Felsbesiedlern usw.)
- Verschiedene Möglichkeiten der Tabellenanordnung:
 1. Sortierung von Aufnahmen und/oder Arten nach STRENG/SCHÖNFELDER
 2. Sortierung der Arten nach Nummern
 3. Eingabereihenfolge von Aufnahmen und Arten
 4. Durch Nummernlisten angegebene Reihenfolge von Aufnahmen und Arten, bei Bedarf kombiniert mit Stetigkeitssortierung der nicht aufgelisteten, aber in der Tabelle vertretenen Arten. Einzelne Nummern einer Liste können nachträglich eingefügt oder herausgenommen werden, ohne daß die ganzen Listen umgeschrieben werden müssen.
- Ausgabe neuer Anordnungslisten der Aufnahmen und Arten entsprechend der gerade erstellten Tabelle
- Tabelle wahlweise mit und ohne Punktraster
- Bei Bedarf platzsparende Ausgabe der Tabelle ohne Soziabilität, bzw. ohne die erste Stelle der Prozentzahlen
- Getrennte Auflistung der Arten mit ihren Nummern und Zusatzinformationen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle erscheinen

- Ausgabe von 2 Überschriftszeilen beliebiger Länge
- Kontrolltabelle im Spaltenabstand der Originaltabelle zur erleichterten Datenkontrolle auf dem Leuchttisch. (Voraussetzung: Originaltabelle auf normalem kariertem Papier, Ausdruck von 10 Zeichen pro Zoll). Die Aufnahmen können hierbei in Eingabereihenfolge oder in beliebig vorgegebener Reihenfolge ausgedruckt werden.
- Ausgabe beliebig großer Tabellen
- Auflistung von formalen Datenfehlern bzw. Artnummern im Aufnahmematerial, zu denen Bezugsdaten fehlen
- Meldung von Speicherbereichsüberschreitungen
- Ermittlung der absoluten und prozentualen Stetigkeit, der Artenzahlen sowie der mittleren Zeiger- und Futterwerte einschließlich deren Standardabweichung. Die Zeiger- und Futterwerte können sowohl mit als auch ohne Gewichtung von Artmächtigkeit oder Prozentanteil berechnet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, bestimmte Arten nicht zu berücksichtigen oder nur bestimmte Arten zu berücksichtigen. Letztere können entweder als Liste vorgegeben sein oder nach einer gewünschten Lebensform bzw. synsystematischen oder Geoelementzugehörigkeit automatisch ausgewählt werden. Im letzteren Fall werden die ausgewählten Arten aufgelistet.
- Einstellmöglichkeit auf unterschiedlich lange Druckzeilen (bis 254 Zeichen pro Zeile)
- Verwendung aufnahmeweise geschriebener Daten
- Verarbeitung formatfrei geschriebener Aufnahmedaten
- Sicherung der Aufnahmedaten (ohne Tabellenkopf) in formatisierter Form, mit der zeitsparend gerechnet werden kann
- interne Zuordnung fortlaufender Aufnahme- und Artnummern, so daß beliebig numerierte Eingabedaten verarbeitet werden können

- Auswahl der für die Tabelle vorgesehenen Aufnahmen und bei Bedarf auch der Arten aus einem umfassenden Datensatz, Sicherung dieser Daten für spätere Arbeitsgänge
- getrennte Schaltbarkeit von 62 verschiedenen Programmfunktionen, Auflistung der Schalterstellungen

2. Eingabe der Aufnahmedaten

Alle Aufnahmedaten werden formatfrei unter Verwendung bestimmter Schlüsselzeichen geschrieben. Eine Datenzeile umfaßt 80 Zeichen. Die Datei mit den Aufnahmedaten wird dem Programm über die Zuweisungsnummer 13 zugeordnet.

2.1 Tabellenkopf

Die Einzeldaten des Tabellenkopfes werden eingeleitet durch ein Buchstabenkennzeichen und abgeschlossen durch einen Schrägstrich. Dabei sind folgende Buchstaben für die angegebenen Daten zu verwenden:

A	Aufnahmenummer
J	Aufnahmejahr
Z	Aufnahmemonat
FL	Aufnahmefläche (qm)
H	Meereshöhe (10m)
E	Exposition
N	Hangneigung (Grad)
R	Relief
BH	Höhe der 1. Baumschicht (m)
BD	Deckung der 1. Baumschicht (%)
UH	Höhe der 2. Baumschicht (m)
UD	Deckung der 2. Baumschicht (%)
SH	Höhe der 1. Strauchschicht (cm)
SD	Deckung der 1. Strauchschicht (%)
TH	Höhe der 2. Strauchschicht (cm)
TD	Deckung der 2. Strauchschicht (%)

OH Höhe der 1. Krautschicht (cm)
OD Deckung der 1. Krautschicht (%)
KH Höhe der 2. Krautschicht (cm)
KD Deckung der 2. Krautschicht (%)
M Deckung der Moosschicht (%)
G Grasanteil (%)
W Krautanteil (%)
L Leguminosenanteil (%)
P Ertrag (dt/ha)
FR Fruchtart
C Deckung der Kulturarten (%)
I Deckung der Wildpflanzen (%)

Am Anfang jeder Aufnahme muß die Aufnahmeummer stehen, die Reihenfolge der übrigen Daten untereinander ist gleichgültig. Als Aufnahmeummer können beliebige voneinander verschiedene, maximal 4-stellige Zahlen verwendet werden.

Die Aufnahmedaten selbst können aus weitgehend beliebigen, maximal 3-stelligen Zeichenfolgen bestehen. Nur * darf nicht verwendet werden. Von über 3-stelligen Folgen werden nur die drei letzten Zeichen gespeichert (Korrekturmöglichkeit bei der Verwendung von Lochkarten). Weniger als 3-stellige Daten werden automatisch rechtsbündig wiedergegeben. Zur Korrektur können Einzeldaten auch komplett mit Schlüsselzeichen an irgend einer späteren Stelle wiederholt werden. Nur der letzte Wert ist dann gültig.

Beispiel für die Schreibweise der Tabellenkopfdaten:

A112/FL200/E270/H110/N20/BH20/BD70/UH10/UD1/SH150/SD+/KH20/
A112/KD30/M10 20/KD40/

2.2. Artenliste

Die Artenliste kann direkt hinter die Tabellenkopfdaten geschrieben werden oder - beginnend mit der Aufnahmenummer nach obigem Schema - vorausgehen. Sie kann auch getrennt vom Tabellenkopf aufgeführt werden. Ein Stern markiert den Beginn der Artenliste. Ihr Ende wird durch das nächste A einer Aufnahmenummer angezeigt.

Zur Identifikation der Arten dienen beliebig zu wählende maximal 4-stellige Zahlen. Bei Arten, die in mehreren Schichten auftreten, erhält jede Schicht eine eigene Nummer. Unter einer zusätzlichen Nummer ist außerdem das Gesamtvorkommen der Art in sämtlichen Schichten anzugeben. Nur diese Nummer darf bei der Bestimmung von Artenzahl und Zeigerwerten berücksichtigt werden.

Jedes Artvorkommen wird nach folgendem Schema geschrieben:

Artnummer - Doppelpunkt - Klammer (bei Bedarf) - Artmächtigkeit - Soziabilität (bei Bedarf) - beliebig viele Zusatzzeichen (bei Bedarf) - Querstrich

(Querstrich und Ausrufungszeichen sind identisch. Das A einer Aufnahmenummer kann den Querstrich ersetzen.)

Als Zusatzzeichen sind grundsätzlich möglich: (,),F,B,K,H. Falls eine Soziabilität (auch als Leerstelle) angegeben wurde, können dagegen beliebige Zusatzzeichen mit Ausnahme von Querstrich, Doppelpunkt, A und den für Artmächtigkeit und Soziabilität üblichen Symbolen verwendet werden.

Artmächtigkeit und Soziabilität können durch Wiederholung der ganzen durch Querstriche abgegrenzten Dateneinheit verbessert werden (Löschung durch explizite Angabe der Leerstellen), Zusatzzeichen dagegen nicht.

Prozentangaben sind ebenfalls zweistellig wie die Kombinationen aus Artmächtigkeit und Soziabilität anzugeben. Werte unter 1% werden durch + symbolisiert, 100% durch 00.

Beispiel für die Schreibweise der Artenliste:

A112/*22:12|23:+|64:(+2FH|66:13|187:+2|190:11|191:+
A112/*191:+2|200:12|

2.3 Hinweis zur Anordnung der Aufnahmedaten

Leerstellen zwischen den Einzelangaben der Tabellenkopfdaten und der Artenliste sind ohne Belang. Die Reihenfolge aller Zeilen der Aufnahmedaten untereinander ist gleichgültig, falls am Anfang jeder Zeile die Aufnahmeummer steht. Es würde zwar für die meisten Zwecke auch genügen, die Aufnahmeummer nur einmal am Anfang der Aufnahme anzugeben und kontinuierlich ohne Beachtung des Zeilenendes zuerst die Tabellenkopfdaten und dann nach dem Stern die Artenliste zu schreiben. Die automatische Aufteilung eines umfassenden Datensatzes nach verschiedenen Tabellen ist bei dieser Schreibweise der Daten jedoch nicht mehr möglich. Neue Aufnahmen müssen unbedingt auf einer neuen Zeile beginnen. Andernfalls käme es zum Verlust von Daten, wenn nicht die gesamte Aufnahmedatei eingelesen wird.

3. Daten der Pflanzenarten

In eine Datei mit der Zuweisungsnummer 12 wird für jede vorkommende Art eine Datenzeile nach folgendem Schema geschrieben:

Spalte Nr.	Inhalt	
1 - 4	Artnummer	rechtsbündig
6 - 35	Artname	
39 - 40	Lichtzahl	rechtsbündig
41 - 42	Temperaturzahl	"
43 - 44	Kontinentalitätszahl	"
45 - 46	Feuchtezahl	"
47 - 48	Reaktionszahl	"
49 - 50	Stickstoffzahl	"
51 - 52	Futterwertzahl	"

56 - 57	Lebensform in beliebiger Reihenfolge der	
59 - 60	Einzelfaktoren, zweistellige Zeichenfol-	
62 - 63	gen, deren Schreibweise mit derjenigen	
65 - 66	in der Aufrufzeile der Steuerdatei über-	
68 - 69	einstimmen muß	
71 - 72		
75 - 79	soziologisches Verhalten	linksbündig
81 - 88	Geoelement, 5 Angaben in beliebiger Rei-	
90 - 97	henfolge möglich; eingelesen nur, wenn	
99 - 106	die Steuerzahl 49 in der Steuerdatei	
108 - 115	steht.	
117 - 124		

Arten, die in mehreren Schichten vorkommen, benötigen gesonderte Nummern für jede einzelne Schicht sowie für die Zusammenfassung aller Schichten. Nur im letzteren Fall dürfen Lebensform und soziologisches Verhalten angegeben werden, da es sonst zur Mehrfachzählung der Arten kommen kann. Zeiger- und Futterwerte können für sämtliche Nummern angegeben sein, sind jedoch ebenfalls nur bei der zusammenfassenden Nummer nötig.

Falls keine Geoelemente mit aufgenommen werden sollen, können 80-spaltige Lochkarten für die Erfassung der Daten verwendet werden; Geoelementangaben die in 80-spaltigen Dateien keinen Platz haben, werden nur auf spezielle Anweisung hin eingelesen (s.u.).

Die erforderlichen Daten sind mit Ausnahme der Geoelemente zu entnehmen aus ELLENBERG (1979).

Das Fehlen entsprechender Daten ist ohne Einfluß auf die Funktion des Programmes.

Eine unbenannte Artnummer, ermöglicht den Einschub von Leerzeilen zur Gliederung der Tabelle. Auch alle Überschriften innerhalb der Tabelle sind wie Arten zu behandeln.

4. Steuerung des Programms

Die wesentlichen Steueranweisungen für den Betrieb des Programms sind in einer besonderen Datei (Zuweisungsnummer 11) zusammengefaßt, die der Reihe nach folgende Bestandteile enthält:

1. Programmsteuerzahlen
2. Leerzeile
3. Zeilenlänge
4. Artmächtigkeitssymbole
5. Gewichtungsfaktoren
6. Aufrufsymbol für die zu zählenden Arten
7. zu tabellierende Zusatzzeichen
8. Überschrift über die Tabelle
9. Leerzeile
10. Beschriftung der Einheiten
11. Leerzeile
12. Liste der einzulesenden und zu tabellierenden Aufnahmen
13. Redigierungsliste
14. Liste der zu tabellierenden Arten
15. Redigierungsliste
16. Liste der einzulesenden Pflanzenarten (nur wenn die Funktion 18 verlangt wird)
17. Liste der Arten, die gezählt bzw. nicht gezählt werden sollen

Die Positionen 4,5,6,7,12,13,14,15,(16) und 17 können durch Leerzeilen vertreten sein; die Positionen 1,8 und 10 können ganz fehlen. Die einzelnen Bestandteile der Steuerdatei werden im folgenden näher erläutert.

4.1 Programmsteuerzahlen

Die gerade benötigten Funktionen des Programms werden durch eine Folge von Programmsteuerzahlen eingeschaltet. Jede Zahl wird rechtsbündig in die ersten beiden Spalten einer eigenen Datenzeile geschrieben. Der Rest der Zeilen kann zur Kennzeichnung verwendet werden; er wird vom Programm ignoriert. Die Reihenfolge der Zahlen untereinander ist gleichgültig.

Die Zahlen aktivieren folgende Programmfunktionen:

- 1 Sortierung der Aufnahmen nach Ähnlichkeit
- 2 Sortierung der Arten nach Ähnlichkeit
- 3 Gesamttabelle: Tabellierung aller Aufnahmen und Arten der
 verarbeiteten Dateien in der dort vorgefundenen Reihenfolge
- 4 Sicherung der für die Tabelle vorgesehenen Aufnahmedaten
 auf File 14
- 5 Berechnung mittlerer Zeiger- und Futterwerte, falls gleich-
 zeitig die Steuerzahl 20 angegeben wird
- 6 Tabelle mit Punktraster (Kontrolltabelle unbeeinflusst)
- 7 Kontrolltabelle
- 8 Wiederholung der Artenfolge mit Zeigerwerten, Futterwerten
 und soziologischem Verhalten im Anschluß an die Tabelle
- 9 Tabellenausgabe einmal mit und einmal ohne Punktraster
- 10 Wiedergabe aller nicht aufgelisteten Arten nach Stetigkeit
 sortiert am Tabellenende
- 11 Haupttabelle
- 12 komprimierte Form der Haupt- und Gesamttabelle ohne Sozia-
 bilität bzw. ohne die erste Stelle der Prozentzahlen sowie
 ohne Zeiger- und Futterwerte
- 13 Nur die angegebenen Arten werden gezählt. Sie werden nicht
 mitgezählt, wenn diese Steuerzahl fehlt.
- 14 Tabellierung der Artvorkommen (Ohne diese Steuerzahl wird
 höchstens der Tabellenkopf ausgegeben.)
- 15 Auflistung der eingelesenen Pflanzenarten

- 16 Tabelle mit nach Nummern sortierten Arten (Haupt- und Kontrolltabelle)
- 17 In der Kontrolltabelle erscheinen die Arten in Eingabereihenfolge.
- 18 Eine Auswahl von Pflanzenarten wird eingelesen.
- 19 In der Kontrolltabelle erscheinen die Aufnahmen in vorgegebener Reihenfolge.
- 20 Ermittlung der Artenzahl jeder Aufnahme, zusammen mit Steuerzahl 5 auch der mittleren Zeigerwerte und Futterwerte
- 21 Test des gesamten Aufnahmedatensatzes auf formale Fehler
- 41 Sicherung der Anordnungsliste der Artnummern auf File 15
- 42 Sicherung der Anordnungsliste der Aufnahmeummern auf File 16
- 43 Sicherung der Nummernliste der gezählten Arten auf File 17
- 44 Sicherung der mittels Funktion 18 ausgewählten Pflanzenarten auf File 18. Die Reihenfolge der Arten in der Sicherungsdatei entspricht dabei derjenigen in der Ursprungsdatei.
- 45 Sicherung der internen Aufnahmefolge auf File 19 und der formatisierten Daten auf File 20
- 46 Rechnung mit formatisierten Daten: Einlesen der internen Aufnahmefolge von File 19 und der Daten von File 20
- 47 Sicherung der internen Artenfolge auf File 21
(Sie kann als komprimierte Auswahlliste der Arten verwendet werden: Jede Nummer ist auf ihr nur einmal vertreten)
- 48 Tabelle mit Artnummern
- 49 Einlesen von Artendateien mit mehr als 80 Spalten (für Geoelementangaben)

- 50 Tabelle mit Tabellenkopf (Artenzahl unbeeinflusst)
- 51 Gewichtung der Häufigkeit
- 52 Verarbeitung von Prozentzahlen (KLAPP-STÄHLIN)
- 61 Auflistung der eingesetzten Programmfunktionen
- 62 Berechnung der prozentualen Stetigkeit und der Tabellenmittelwerte von Artenzahl sowie Zeiger- und Futterwerten mit einer um 1 verminderten Aufnahmezahl (bei Verwendung einer Leeraufnahme zur Tabellengliederung)

Die folgenden Steuerzahlen unterdrücken bestimmte Zeilen des Tabellenkopfes:

- 22 Aufnahmemonat
- 23 Aufnahmefläche
- 24 Meereshöhe
- 25 Exposition
- 26 Hangneigung
- 27 Relief
- 28 Höhe der 1. Baumschicht
- 29 Höhe der 2. Baumschicht
- 30 Höhe der 1. Strauchschicht
- 31 Höhe der 2. Strauchschicht
- 32 Höhe der 1. Krautschicht
- 33 Höhe der 2. Krautschicht
- 34 Deckung der 1. Baumschicht
- 35 Deckung der 2. Baumschicht
- 36 Deckung der 1. Strauchschicht
- 37 Deckung der 2. Strauchschicht
- 38 Deckung der 1. Krautschicht
- 39 Deckung der 2. Krautschicht
- 40 Deckung der Mooschicht
- 53 Aufnahmejahr
- 54 Grasanteil
- 55 Krautanteil
- 56 Leguminosenanteil

57	Ertrag
58	Fruchtart
59	Deckung der Kulturarten
60	Deckung der Wildpflanzen

Nicht untergliederte Schichten bleiben in der Tabelle ohne Nummern. Wenn also z.B. die Zahl 32 angegeben wird, erscheint im Tabellenkopf die Bezeichnung HOEHE DER KRAUTSCHICHT statt HOEHE DER 2. KRAUTSCHICHT.

4.2 Zeilenlänge

Die Zeilenlänge wird durch eine rechtsbündige Zahl in Spalte 1 - 3 der dafür vorgesehenen Zeile der Steuerdatei festgelegt. Die Zahl darf maximal 254 betragen, aber die Zeilenlänge des verwendeten Druckers nicht überschreiten. Falls das Ergebnis in eine permanente Ausgabedatei geschrieben werden soll, so muß deren Zeilenlänge wegen der Vorschubzeichen um 1 größer sein als die in der Steuerdatei angegebene Zeilenlänge.

4.3 Tabellierung der Zusatzzeichen

Zusatzzeichen werden bei Bedarf getrennt wiedergegeben und müssen von Hand auf die Tabelle durchgepaust werden. Es können maximal 2 Zeichen gleichzeitig tabelliert werden. Diese werden in Spalte 16 und 18 der Aufrufzeile eingetragen.

4.4 Nummernlisten

Die in den Positionen 12,14,16 und 17 der Steuerdatei benötigten Nummernlisten werden als lückenlose Folge 4-stelliger, rechtsbündiger Zahlen geschrieben. Eine Zeile umfaßt 20 Zahlen. Die Listen können prinzipiell auf beliebig vielen Folgezeilen fortgesetzt werden. (Die Länge der Listen ist natürlich durch die Programmdimensionierung begrenzt.) Das Ende wird durch ein leeres oder 0 enthaltendes Zahlenfeld markiert. Entsprechend darf also einerseits innerhalb einer Liste keine Fehlstelle auftreten und muß andererseits am Ende jeder Liste mindestens ein Feld - äußerstenfalls eine ganze Zeile - freibleiben.

5. Zählung der Arten und Berechnung von mittleren Zeiger- und Futterwerten

Artenzahl und mittlere Zeiger- sowie Futterwerte werden zuerst getrennt für jede Aufnahme ermittelt; die Standardabweichung wird hier auf N bezogen (N = Zahl der Einzelwerte innerhalb der Aufnahme, wobei ein Zeigerwert 0 = nicht vorhanden und ein Futterwert 99 als Indifferenzwerte übergangen werden). Aus den Ergebnissen dieser Berechnungen werden dann Gesamtwerte für die Tabelle bestimmt; die Standardabweichung wird hier auf N-1 bezogen (N = Zahl der Aufnahmen, für die Werte existieren).

Die Ermittlung von Zeiger- und Futterwerten kann mit und ohne Gewichtung von Artmächtigkeit bzw. Prozentanteil erfolgen. Die Prozente werden dabei einfach proportional gewichtet, der Wert + (<1%) mit 0,25 und andere nichtnumerische Zeichen mit 1. Den Artmächtigkeitssymbolen können beliebige zweistellig ganzzahlige Gewichtungsfaktoren zugeordnet werden. Je nach Gewicht werden die einzelnen Arten dann mehrfach gezählt. Symbole und Gewichtungsfaktoren sind als Steuerdaten einzutragen. Die Artmächtigkeitssymbole sind einstellig in den Spalten 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 und 23 der betreffenden Zeile der Steuerdatei einzutragen, die Gewichtungsfaktoren zweistellig rechtsbündig in den Spalten 1-2, 4-5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20 und 22-23 der darauffolgenden Zeile - beides in entsprechender Reihenfolge. Alle Zeichen, für die keine Gewichtung angegeben ist, werden automatisch mit 1 gewichtet.

Im komprimierten Tabellenformat (Funktion 12) können nur Artenzahlen und keine Zeigerwerte wiedergegeben werden. Die Bestimmung beider für das normale Tabellenformat erfolgt jedoch parallel; beide Werte werden aus demselben Artensortiment berechnet. Zur Festlegung dieses Sortimentes stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- Vorgabe als Nummernliste:

Je nachdem, ob die Programmsteuerzahl 13 angegeben wurde oder nicht, werden entweder nur die Mitglieder einer Nummernliste in Position 17 der Steuerdatei berücksichtigt, oder diese werden bei der Berechnung übergangen. Letzteres dient vor allem zur Unterdrückung der Mehrfachzählung von Arten, die in mehreren Schichten auftreten. In diesem Fall müssen die nach Schichten differenzierten Vorkommen ausgelassen werden; nur das Gesamtvorkommen darf in die Berechnung eingehen.

- Automatische Auswahl der zu zählenden Arten nach vorgegebener Lebensform bzw. synsystematischer Stellung oder Arealtyp:

Zum Aufruf wird entweder die Lebensform in Spalte 1 und 2, die synsystematische Zugehörigkeit in Spalte 4 - 8 oder der Arealtyp in Spalte 11-18, 20-27, 29-36, 38-45 und 47-54 der Aufzeile in der Steuerdatei eingetragen. Die Schreibweise muß jeweils mit derjenigen in der Artendatei übereinstimmen. Zum Aufruf der übergeordneten Syntaxa können allerdings die letzten Stellen in der erforderlichen Zahl frei bleiben. Die Reihenfolge der Angaben zum Arealtyp ist gleichgültig; es können beliebige Kombinationen von Einzelangaben verarbeitet werden. Für die Kennzeichnung der Aufrufzeilen sind die Spalten 56-74 vorgesehen. Diese Spalten werden z.B. als Überschrift über die Listen der gezählten Arten verwendet.

Eine evt. vorhandene Nummernliste in Position 17 der Steuerdatei und auch die Steuerzahl 13 bleiben im automatischen Auswahlmodus wirkungslos.

Die Nummern der gezählten Arten werden auf File 17 gesichert, wenn die Steuerzahl 43 angegeben wird.

6. Ordnung der Vegetationstabellen

Das Programm kann in einem Job maximal 3 verschieden angeordnete Tabellen herstellen: Die sog. Haupt-, die Gesamt- und die Kontrolltabelle. Die in der im folgenden beschriebenen Weise erzeugte Reihenfolge der Aufnahmen und Arten in Haupt- und Gesamttabelle kann mittels der Funktionen 41 und 42 auf getrennte Dateien ausgegeben und später für die wiederholte Reproduktion der gerade, evt. mit viel Aufwand an Rechenzeit, erhaltenen Tabelle verwendet werden.

6.1 Haupttabelle

6.1.1 Vorgegebene Reihenfolge von Aufnahmen bzw. Arten

Die Reihenfolge der Aufnahmen und Arten wird durch die beschriebenen Nummernlisten in der Steuerdatei festgelegt. Damit lange Listen bei kleineren Korrekturen nicht neu geschrieben werden müssen, folgt jeder der beiden Ausgangslisten, die die Tabellenordnung bestimmen, eine Redigierungsliste nach. Dort werden nur die zu ändernden Positionen nach folgendem Schema aufgeführt:

Einfügung einer Nummer:

laufende Nummer - Pluszeichen - einzufügende Nummer - Querstrich

Entfernung einer Nummer:

laufende Nummer - Minuszeichen - Querstrich

Bei einer Folge von Auslassungen muß nur das erste Minuszeichen angegeben werden.

Beispiel: 110+99!82+10!79-!79+112!60-!59!58!57!56!

Auf den Folgezeilen ist kontinuierlich weiterzuschreiben. Die erste Leerstelle wird als Ende der Redigierungsliste interpretiert.

Bei der Ermittlung der jeweiligen laufenden Nummer sind alle Änderungen der Liste durch die vorhergehenden Redigierungen mitzubetrachten. Die Korrektur sollte also von hinten nach vorn durchgeführt werden.

Die Steuerzahlen 41 und 42 bewirken die Sicherung der neuen Anordnungslisten mit integrierten Redigierungen.

6.1.2. Sortierung nach Ähnlichkeit

Bei Bedarf können Aufnahmen und Arten automatisch nach Ähnlichkeit sortiert werden. Die Sortierung erfolgt durch die Unterprogramme YBALT3 und YBALT4 aus einem von R. STRENG in Zusammenarbeit mit P. SCHÖNFELDER entwickelten Sortierprogramm. (STRENG, P. SCHÖNFELDER (1978))

In die Sortierung werden nur die Aufnahmen und Arten einbezogen, die in der oben beschriebenen Weise aufgelistet wurden. Die Ähnlichkeitsberechnung der Aufnahmen erfolgt jedoch grundsätzlich auf der Basis sämtlicher vorkommenden Arten und die der Arten aus sämtlichen eingelesenen Aufnahmen. Die Gewichtung erfolgt i.w. genauso wie bei der Berechnung der mittleren Zeiger- und Futterwerte. (Allerdings werden nichtnumerische Zeichen außer + in Prozenttabellen, die dort ja eigentlich nicht vorkommen sollten, in rechter Position gar nicht und in linker wie eine Artmächtigkeit gewichtet; Artmächtigkeitswerte ohne zugeordnete Gewichtung werden ebenfalls nicht gewertet.) Eine unterschiedliche Gewichtung je nach Häufigkeit einer Art erfolgt auch hier nur, wenn die Steuerzahl 51 vorhanden ist; wenn nicht, wird nur das Vorhandensein einer Art gewertet. In diesem Fall wird jedes von Blank verschiedene Zeichen berücksichtigt.

6.1.3. Sortierung nach Stetigkeit

Bei Bedarf können alle vorkommenden Arten, die nicht explizit aufgelistet wurden, nach Stetigkeit sortiert ans Tabellenende gestellt werden (Funktion 10). Falls die Anordnungsliste der Arten leer ist, erfolgt eine vollständige Sortierung nach Stetigkeit - auch ohne die Steuerzahl 10.

Die Stetigkeitswerte werden sowohl absolut als auch in Prozenten auf der linken Seite der Tabelle wiedergegeben. Falls in der Tabelle einzelne Aufnahmen mehrfach auftreten sollten, so werden sie trotzdem nur einfach gezählt. Wenn zur vertikalen Gliederung der Tabelle eine Leeraufnahme verwendet wird, so kann mittels Funktion 62 die prozentuale Stetigkeit mit einer um 1 kleineren Aufnahmenzahl berechnet werden.

6.1.4 Sortierung nach Nummern

Wenn der Artendatei neue Arten hinzugefügt werden müssen, ist es von Nutzen, wenn die schon vorhandenen Arten nach Nummern sortiert aufgelistet werden. Zu diesem Zweck können die aus der Artendatei eingelesenen Arten entsprechend umsortiert (Funktion 16) und die Tabelle in dieser Reihenfolge ausgegeben werden.

6.1.5 Aufnahmen in Eingabereihenfolge

Falls die Liste der zu tabellierenden Aufnahmen leer ist, werden sämtliche Aufnahmen der vorgegebenen Datei in der Reihenfolge der Aufnahmendatei ausgegeben.

6.2 Gesamttabelle

Die Gesamttabelle wird grundsätzlich in der Reihenfolge der Eingabe von Aufnahmen und Arten aufgebaut, also so, wie diese in den Ausgangsdateien aufeinanderfolgen.

6.3 Kontrolltabelle

Die Anordnung der Aufnahmen in der Kontrolltabelle erfolgt entweder in Eingabereihenfolge (ohne die Steuerzahl 19) oder in der auch für die Haupttabelle vorgesehenen Reihenfolge (mit Steuerzahl 19, ohne die Steuerzahl 3). Die Anordnung der Arten kann hier entweder in Eingabereihenfolge (mit Steuerzahl 17) oder (ohne die Steuerzahlen 17 und 3) in der für die Haupttabelle vorgesehenen Weise, also z.B. auch nach Nummern sortiert, erfolgen.

7. Tabellengestaltung

7.1. Überschriftszeilen

Es sind zwei Überschriftszeilen für die Tabelle vorgesehen: Eine Hauptüberschrift in größerem Abstand von der Tabelle und eine Zeile zur Beschriftung der einzelnen Einheiten direkt über der Tabelle. Beide können grundsätzlich beliebig lang sein (je nach Deklaration der jeweiligen Vektoren). Das Ende der Überschriften wird in der Steuerdatei durch Leerzeilen markiert.

7.2. Gliederung der Tabelle

Zur horizontalen Unterteilung der Tabelle kann an beliebigen Stellen eine Leerzeile eingefügt werden, die wie eine Art zu behandeln ist, in der Artendatei jedoch nur als Nummer auftaucht. Ebenso kann für die vertikale Tabellengliederung eine leere Aufnahme verwendet werden. Es darf nur eine einzige Aufnahmenummer verwendet werden, die wie bei der leeren Artenzeile beliebig oft in der Tabelle erscheinen kann. (Am besten wird dafür die Nummer 9999 verwendet, bei der im komprimierten Tabellenformat das Nummernfeld im Tabellenkopf leer bleibt). Gleichzeitig muß die Funktion 62 eingeschaltet werden, damit bei denjenigen Berechnungen, in die die Aufnahmezahl der Tabelle eingeht, die Leeraufnahme nicht mitgezählt wird.

8. Benötigte Dateien

Über folgende Zuweisungsnummern, die nur bei Bedarf zu definieren sind, werden Daten eingelesen oder gesichert:

File Nr.	Inhalt und Funktion
----------	---------------------

6	Ausgabe der Tabelle und anderer Ergebnisse, die bevorzugt für den Ausdruck bestimmt sind.
---	---

11	Einlesen der Steuerdaten
----	--------------------------

12	Einlesen der Pflanzenarten
13	Einlesen der originalen Aufnahmedaten
14	Sicherung der ausgewählten Aufnahmen (in ursprünglicher Schreibweise)
15	Sicherung der Anordnungsliste der Arten
16	Sicherung der Anordnungsliste der Aufnahmen
17	Sicherung der Nummern der gezählten Arten
18	Sicherung der ausgewählten Pflanzenarten
19	Sicherung und Einlesen der internen Aufnahmefolge
20	Sicherung und Einlesen formatisierter Daten
21	Sicherung der internen Artenfolge

9. Maßnahmen zur Einsparung von Rechenzeit

Um Rechenzeit zu sparen, müssen v.a. die verarbeiteten Dateien möglichst klein gehalten werden. Dies beginnt damit, daß aus einem größeren Ausgangsbestand die zu einer Tabelle gehörigen Aufnahmen ausgewählt und gesichert werden. Die Auswahl erfolgt normalerweise bei jeder Erstellung einer Tabelle anhand der Anordnungsliste der Aufnahmen. (Nur wenn Steuerzahl 21 angegeben ist, wird die ganze Datei eingelesen). Die Funktion 4 bewirkt dann die Sicherung der Daten in einer für File 14 anzugebenden Datei. Mit dieser kann dann künftig weitergerechnet werden.


Falls außerdem durch Einsatz der Funktion 10 sämtliche in der jeweiligen Tabelle vorkommenden Arten auch in derselben dargestellt wurden und durch 41 die Anordnungsliste der Artnummern auf File 15 gesichert



wurde, können beim folgenden Umschreiben der Tabelle nebenbei auch die benötigten Arten gesichert werden. Dies geschieht dadurch, daß die gerade gesicherte Anordnungsliste jetzt als Auswahlliste für die einzulesenden Arten verwendet wird (Funktion 18) und mittels Funktion 44 die eingelesenen Arten in eine Datei mit der Zuweisungsnummer 18 geschrieben werden.



Gleichzeitig können die Daten formatisiert werden. Dies geschieht durch die Funktion 45. Die formatisierten Daten werden dadurch in eine Datei mit der Zuweisungsnummer 20 und die dazugehörige interne Aufnahme-
folge in eine Datei mit der Zuweisungsnummer 19 geschrieben. Die Daten des Tabellenkopfes werden dabei nicht miteinbezogen; die Funktion 50 darf also nicht verlangt werden, außer es werden die Tabellenkopfdaten zusätzlich auf File 13 eingelesen.


Die Rechnung mit den formatisierten Daten erfolgt, wenn die Steuerzahl 46 angegeben wird und die interne Aufnahme-
folge, wie sie bei der Formatisierung bestand, und die Daten selbst auf File 19 und 20 vorgegeben werden. Die jetzt verwendete Artendatei muß mit der bei der Formatisierung der Daten vorgefundenen identisch sein; nur am Ende derselben dürfen zusätzliche Überschriften hinzugefügt werden. Außerdem ist es gleichgültig, ob bei eingeschalteter Artenauswahl (Funktion 18) mit der Ausgangsdatei der Arten gerechnet wird oder mit der Datei, die die gesicherte Artenauswahl enthält.

3. Arealtypenspektren und Zeigerwerte














Grünertienbusch
3 Aufn.




Dist-Buntreitgrasflur
9 Aufn.




Rostseggenrasen
8 Aufn.






Blaugras-Horstseggenrasen
48 Aufn.












Polsterseggenrasen
Schneeheide-Variante
13 Aufn.




Gehölzreiche Gesellschaften
auf Feinschuttstandorten
12 Aufn.









Lathyro-Fagetum
(KUNNE, 1969)
147 Aufn.



Helleboro-Fagetum
dryopteridetosum
(ZUKRIGL, 1973)
16 Aufn.



Helleboro-Fagetum
typicum
(ZUKRIGL, 1973)
10 Aufn.



Helleboro-(Abieti-)Fagetum
caricet. alb. Cardam. trif.-V.
(ZUKRIGL, 1973)
10 Aufn.

4. Vegetationstabellen

[illegible]

[illegible][illegible]

<i>Elvum europaeus</i>	11	7.4	3		***	*		†
<i>Lonicera alpigena</i>	9	6.0		r	†	††		†

[illegible]

<i>Helyvetis limbosperma</i>	10	6.7	1+1	r +	r	1	+	
<i>Tritomaria guineensis</i>	7	4.7	3+					
<i>Sphagnum</i> (cf) nemoreum	3	2.0	1+					+
<i>Blechnum spicant</i>	1	0.7	r					
<i>Galium rotundifolium</i>	23	15.4		++r1++ ++	l+1++2rlr+	+		
<i>Pteridium aquilinum s.str.</i>	7	4.7				1	1+	
<i>Calamagrostis villosa</i>	7	4.7	3				544 2	
<i>Viola biflora</i>	57	38.3						
<i>Ventaria enneaphyllos</i>	52	19.5	+ 1+2 2 ++	r +	1	2+r r	211	1 11 +1+1 1+1+2121
<i>Carex ferruginea</i>	29	19.5				+	+	+
<i>Deshampsia caespitosa</i>	26	18.8	+ 2 +			+	+	+
<i>Luzula sylvatica s.l.</i>	28	15.4				+	+	+
<i>Soidanella alcea</i>	10	12.4				+	+	+
<i>Adenostyles alliariae</i>	10	9.4				+	+	+
<i>Geranium sylvaticum</i>	11	7.4				+	+	+

AUFNAHMENUMMER	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	778	0000228	337	00111133888	788	3	002478	033	077	055	0000	0111111247
	343	2344002	002	11677700223	455	5	555057	589	112	666	5566	600000968
	730	8101493	235	68914547689	145	7	456982	808	490	413	7957	612347048
Gymnocarpium dryopteris	31	20.8	++		+1		+1	++	r1			
Luzula pilosa	31	20.8	+	r			++r					r1
Luzula lucida	31	18.8	++				++	++	+		++	
Polytrichum formosum	29	18.8	++	r			++	++	+			r
Rhytidiadelphus loreus	19	12.8		1		2	1+	++	1			
Scleropodium purum	29	19.5	2			1						
Lophocolea bidentata	19	11.4	+1	2								
Trichocolea tomentella	5	3.4						+++				
Fagus sylvatica	55	36.9	1	r	r	1		+1	r	1		1 1
Rubus saxatilis	28	18.8	1+									
Hepatica nobilis	18	10.1		+		++			++			++
Fraxinus alnus	12	8.1										
Astrantia maxima	1	0.7										
Stachys officinalis	1	0.7										
Carex paleacea	1	30.7										
Lotus corniculatus	308	25.5		+								1+
Phytolacca orbicularis	300	20.1	*	1				r	++	+	r	+
Epipactis atrorubens	208	18.8			r				r			rr
Prunella pratensis	13	8.7					+			1	+	
Plantago lanceolata	12	8.1										
Tofieldia calyculata	12	8.1						rr				
Thymus polytrichus (sp.)	12	8.1									+	r1
Leontodon hispidus	12	8.1										
Briza media	10	6.7										+
Platanthera bifolia	6	4.0										
Erica herbacea	10	6.7	+1									
Selaginella selaginoides	10	7.4				+					+	r
Plantago media	9	6.0			+						+	+
Euphrasia picta	9	6.0					1				+	+
Prunella grandiflora	9	3.4										
Hippocrepis comosa	9	3.4										
Carlina acaulis	9	3.4										
Pimpinella saxifraga	9	3.4										
Succisa pratensis	2	1.3										
Blockschuttbesiedler												
Kormorphiten:												
Campanula cochleariifolia	49	32.9	++		+	1	+1	11	+			11+
Moehringia muscosa	47	31.5			++	++	+1	++				++
Huperzia selago	35	23.5	1+	+			++	++	r			++
Asplenium viride	35	23.5	+				++	++				++
Polydictyon loxanthum	20	13.0			r		++	++				++
Clematis alpina	18	12.1					++	++				++
Asplenium trichomanes	18	12.1					++	++				++
Asplenium ruta-muraria	5	3.4					r	+				+
Thallophyten:												
Ctenidium molluscum	91	61.1	1+	11+11+	1	21232212121	1	1	122122	+1	+	++
Tortellia tortuosa	89	58.9	++	1+		11+11+11+1	++	1	122211	1+	++	++
Schistidium crispatum	36	24.2	+	++		++	++	++	++	++	++	++
Schistidium apocarpum	26	17.4				++	++	++	++	++	++	++
Hypnum cupressiforme	26	17.4										
Rhytidiadelphus loreus	20	13.0				22		2	1	+		2
Phytolacca orbicularis	20	13.0										
Scapania aspera	17	11.4	+					1	+			
Scapania pyxidata (sp.)	16	10.7						1	++			++
Trentepohlia aurea	15	6.7	+								1	1
Scapania aequiloba	15	6.7						1	++			+
Isoetes macrospora	10	6.7				1	1+		+			
Schlaupflanzen												
Senecio fuchsii	84	56.4	+	++	11r1	321	+	++	+	1+	2	+
Mucella muralis	49	32.9			++	1+	+	++	+	+	+	+
Epilobium montanum	30	20.1				++	+	++	+	+	+	+
Epilobium montanum	30	20.1	+					+	2			
Geranium robertianum	25	16.8			++	+	+	+	+	+	+	+
Rubus idaeus	18	12.1			2			1	+	+	+	+
Poa nemoralis	18	12.1	+					1	+	+	+	+
Urtica dioica	18	12.1										
Festuca gigantea	15	10.4			112		r					
Poa trivialis	15	10.4										
Moehringia trinervia	11	7.4			+		r	r				
Scrophularia nodosa	9	6.7										
Viola belladonna	9	6.7			+							
Stellaria media	9	6.7										
Stachys sylvatica	9	6.7			+							
Viola sepium	9	6.7										
Cirsium arvense	6	4.0				1						
Melandrium rubrum	6	4.0										
Heidezeiger												
Prenanthes purpurea	52	34.9	11		++	++		++	1+			+
Veronica chamaedrys	49	32.9			r	+		r				
Hypericum maculatum	49	32.9	++		+	+		2	+	+	+	++
Dactylis glomerata	31	20.8			+	1		1				+
Anthoxanthum odoratum	31	20.8						+				+
Tussilago farfara	26	17.4			+	+	3					++
Prunella vulgaris	26	17.4			+	+	+	1				++
Alchemilla vulgaris	22	14.8						3				++
Rhytidiadelphus squarrosus	22	14.8										++
Verb. Char.:												
Helleborus niger	57	38.3		2+21	r	+	+	r2	3	+	221	r
Petasites albus	17	11.4			+			r				+
Polydictyon lobatum	11	7.4			+			r				+
Ulmus glabra	7	4.7						r				+
Aruncus dioicus	3	2.0			+							+
Taxus baccata	2	1.3										+
Euphorbia dulcis	2	1.3										+

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
AUFNAHMENUMMER	778	0000228	337	0011133888	788	003478	033	077	055	0000	011111	
	730	6101493	235	68914547689	145	9	456982	808	490	413	7957	612347
O.K	Ord. u. Klass.Char.:											
	113	75.8										
Aposeria foetida	113	75.8										
Acer pseudoplatanus	107	71.0										
Daphne mezereum	180	53.7										
Polygonatum verticillatum	180	53.7										
Lamium calceabolon	180	53.7										
Carex dicata	180	53.7										
Phytolacca spicata	180	53.7										
Paris quadrifolia	180	53.7										
Carex silvatica	180	53.7										
Fraxinus excelsior	180	53.7										
Dracopis filix-mas	180	53.7										
Aconitum vulpina	180	53.7										
Cephalanthus rubra (sp.)	180	53.7										
Lilium martagon	180	53.7										
Epipactis helleborine	180	53.7										
Lonicera xylosteum	180	53.7										
Corvulus avelana	180	53.7										
Actaea spicata	180	53.7										
Anemone nemorosa	180	53.7										
Cephalanthus ionifolia	180	53.7										
Crataegus monogyna	180	53.7										
Berberis vulgaris	180	53.7										
Circaea intermedia	180	53.7										
Aegopodium podagraria	180	53.7										
Malaxis monophyllos	180	53.7										
Amelanchier ovalis	180	53.7										
Clematis vitalba	180	53.7										
Geum urbanum	180	53.7										
Galium odoratum	180	53.7										
Asarum europaeum	180	53.7										
Thalictrum aquilegifolium	180	53.7										
Hypericum montanum	180	53.7										
Rosa canina	180	53.7										
Cypripedium calceolus	180	53.7										
Carex montana	180	53.7										
Atrichum undulatum	180	53.7										
Lilia platyphyllos	180	53.7										
Stellaria nemorum	180	53.7										
Chrysosplenium alternifolium	180	53.7										
Acer platanoides	180	53.7										
(cf) Cotoneaster integ.	180	53.7										
Viburnum opulus	180	53.7										
Cardamine impatiens	180	53.7										
Impatiens noli-tangere	180	53.7										
K2	Charakterarten der Klasse											
	Vaccinio-Piceetea											
	148	99.3	221	4553444	434	54444544454	13	3	444344	434	423	424
Picea abies	148	99.3	221	4553444	434	54444544454	13	3	444344	434	423	424
Homogyne alpina	77	51.7	11	1+								
Pyrola uniflora	77	51.7	11	1+								
Lycopodium annotinum	77	51.7	11	1+								
Peltigera leucophlebia	77	51.7	11	1+								
Corallorhiza trifida	77	51.7	11	1+								
Monotropa hypopitys	77	51.7	11	1+								
Placothecium undulatum	77	51.7	11	1+								
Vaccinium vitis-idaea	77	51.7	11	1+								
Ptilium crista-castrensis	77	51.7	11	1+								
Barbilophozia lycopodioides	77	51.7	11	1+								
Pyrola secunda	77	51.7	11	1+								
Juniperus sibirica	77	51.7	11	1+								
Pyrola cf rotundifolia	77	51.7	11	1+								
sonstige Kormophyten:												
Oxalis acetosella	121	81.2	1+1	222+211	1	1	2122212	111	1	1	221121	122
Fragaria vesca	117	78.5	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Hieracium sylvaticum	117	78.5	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Solidago virgaurea	86	57.7	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Campanula scheuchzeri	86	57.7	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Lysimachia nemorum	86	57.7	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Alysa reptans	76	51.0	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Galium album	74	49.7	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Centiana asclepiadea	74	49.7	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Thymum filix-temina	74	49.7	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Chaerophyllum hirsutum	69	46.3	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Sorbus aucuparia	69	46.3	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Potentilla anserina	63	42.3	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Ranunculus montanus	63	42.3	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Pimpinella major	44	29.5	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Vaccinium myrtillus	35	25.5	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Galium anisophyllum	35	25.5	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Carduus defloratus	30	20.1	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Festuca rubra	22	18.8	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Rosa pendulina	22	18.8	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Dactylorhiza maculata	22	18.8	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Aquilegia atrata	20	14.4	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Agrostis stolonifera	20	14.4	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Bupththalmum salicifolium	18	12.1	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Carex ornithopoda	18	12.1	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Agrostis tenuis	18	12.1	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Veronica officinalis	18	12.1	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Primula elatior	18	12.1	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Myosotis silvatica	18	12.1	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Abies alba	14	9.4	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Cirsium palustre	14	9.4	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Polygala amarella	14	9.4	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Calamintha alpina	13	8.7	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Faraxacum officinale	12	8.1	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Scabiosa columbaria	10	6.7	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Dracopis austriaca s.str.	10	6.7	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Cystopteris fragilis	10	6.7	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Ranunculus acris	10	6.7	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Thelypteris pheopteris	9	6.0	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Cardamine flexuosa	9	6.0	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Carex brachystachya	9	6.0	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Vincetoxicum hirsutaria	9	6.0	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Hieracium austriacum	9	6.0	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Stachys alopecurus	8	5.4	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Centaurea montana	8	5.4	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Anemone silvestris	7	4.7	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1
Ranunculus repens	7	4.7	1+1	1+1+1+1	22	1	1	1	1	1	1	1

778	0000228	337	0011113	3888	788	3	003478	033	077	055	0000	011111247
343	2344002	002	1167770	0223	455	5	558057	566	112	666	5566	600000968
770	0111698	002	4891664	700	145	5	466982	808	490	413	7957	01123470948

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
AUFNAHMENUMMER	778	0000228	337	00111133888	788	3	003478	033	077	055	0000	0111112477
	343	2344002	002	11677700223	455	5	558057	566	112	666	5566	6000009688
	730	8101493	235	68914547689	145	7	456982	808	490	413	7957	6123470488
sonstige Thallophyten:												
Hylocomium splendens	116	77.9	22+	21+	11+	++2	11++	21	+1	3	1	1211++
Plagiochila asplenoides	95	63.6	112	11+	112	+	11++	11	+	112+	121	222 112
Dicranum scoparium	95	63.6	111	+	11	++	++	++	++	++	++	++
Rhynidiadelphus triquetrus	91	1.7	+	21+	+	++	++	++	++	++	++	++
Thuidium tamariscinum	58	38.9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Plagiomnium rostratum	37	24.8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Plurozium schreberi	21	14.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cirripodium piliferum	21	14.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Rhizomnium punctatum	20	12.4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Plagiomnium affine s.str.	12	10.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cladonia sp.	12	10.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Plagiomnium cuspidatum	11	7.4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Peltigera praetextata	9	6.0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Rhodocorym roseum	9	6.0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Conocephalum conicum	8	5.4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Brum capillare aeq.	8	5.4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Brachythecium rutabulum (sp.)	7	4.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Brum sp.	7	4.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Brachythecium salebrosum (sp.)	7	4.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Peltigera sp.	7	4.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Brachythecium sp.	7	4.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cladonia cf. furcata	7	4.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Barbillophosia barbata	7	4.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Calypogeia trichomanis	6	4.0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Neckera crispa	6	4.0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Elephosetoma trichophyllum	6	4.0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Campylopus halleri	6	4.0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dicranodontium denudatum	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Scapania sp.	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Chiloscyphus pallescens	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Brum caespiticium (sp.)	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Entodon concinnus	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Campylopus stellatum	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mnium marginatum (sp.)	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Fissidens taxifolius	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Metzgeria conjugata	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cirripodium tenuinerve	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Collema sp.	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Pseudoleskea incurvata	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hookeria lucens	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Bazzania tricenata	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hypnum sauteri	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Pseudoleskeella catenulata	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Encalypta streptocarpa	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Brachythecium velutinum (sp.)	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Preissia quadrata	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Climacium dendroides	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Solorina saccula	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Frullania tamarisci	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Brotherella lorentziana	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Leucobryum clauum	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Brachythecium rivulare	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cratoneuron filicinum	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Brum argenteum	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Phacomitrium canescens	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Marchantia polymorpha	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Metzgeria pubescens	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Plagiothecium sp.	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Brum pseudotriquetrum	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hypnum lacunosum	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Pellia endiviasifolia	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Pohlia cruda	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Leptodozia reptans	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tristoma exsecta	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
cf. Brachythecium reflexum	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mnium stellare	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lophozia ventricosa	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Amblystegium juratzkanum	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Plagiomnium elatum	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Thuidium philibertii	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Homalothecium lutescens	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Campylopus chrysophyllum	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Homalothecium sericeum	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Calierdomella cuspidata	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Thuidium delicatulum	4	2.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AUFNAHMENUMMER	778	0000228	337	00111133888	788	3	003478	033	077	055	0000	0111112477
	343	2344002	002	11677700223	455	5	558057	566	112	666	5566	6000009688
	730	8101493	235	68914547689	145	7	456982	808	490	413	7957	6123470488

AUFNAHMENUMMER

2223 05 3567777 267 6666 00111334457778 0000000000001114567888
4886 50 5690255 192 1127 33006089941256 1112222222261179647234
9684 63 9011112 462 7808 67067572310693 3570123467900004604520

Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Tilia platyphyllos
Acer platanoides
Betula pendula

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Straucharten

Daphne mezereum
Rosa pendulina
Rosa pendulina
Rubus idaeus
Clematis alpina
Lonicera xylosteum
Lonicera xylosteum
Frangula alnus
Frangula alnus
Corvulus avellana
Corvulus avellana
Lonicera alpicana
Lonicera alpicana
Crataegus monodvna
Crataegus monodvna
Rubus fruticosus
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Salix appendiculata
Salix appendiculata
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis
Clematis vitalba
Lonicera nigra
Rosa canina
Solanium dulcamara
Sambucus racemosa
(cf) Cotoneaster integerrima
Viburnum opulus
Salix glabra
Hedera helix
Sambucus nigra
Juniperus sibirica
Alnus viridis
Salix elaeagnos
Salix waldesteiniana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Ass.Char.:

Elmum europaeus
Lonicera alpicana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Diff.Subass.:

Mercurialis perennis
Adenostyles glabra
Viola riviniana + reichenb.
Salvia glutinosa
Brachypodium sylvaticum
Sanicula europaea
Maianthemum bifolium
Plegiomnium undulatum
Eurythmum striatum
Listera ovata
Origanum vulgare
Calamintha clinopodium
Neottia nidus-avis
Bazzania trilobata
Calamagrostis varia
Ranunculus nemorosus
Melica nutans
Sesleria varia
Gymnocarpium robertianum
Melampyrum sylvaticum
Aster bellidifolius
Veronica urticifolia
Valeriana tripteris
Larix decidua
Knautia dipsacifolia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Carex alba
Euphorbia amygdaloides
Carex flacca
Polytrichum chaetopodus
Euphorbia cyperarissias
Sorbos aria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Diff.Ausb.:

Thelypteris limbosperma
Tritomaria quinqueidentata
Sphagnum (cf) nemoreum
Blechnum spicant

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Galium rotundifolium

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Pteridium aquilinum s.str.
Calamagrostis villosa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Viola biflora
Dentaria enneaphyllos
Carex ferrucaeana
Deschampsia cespitosa
Luzula sylvatica s.l.
Soldanella alpina
Adenostyles allariae
Geranium sylvaticum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

	M	N	O	P	Q	R	S
AUFNAHMENUMMER	2223	05	3567777	267	6666	00111334457778	0000000000001113567888
	4886	50	5690255	192	1127	33006089941256	111222222261179647234
	9684	63	9011112	462	7808	67067572310693	3570123467900004604520
Gymnocarpium dryopteris			+1	1	+	+	+
Luzula pilosa		r			+	+	+
Luzula luzulina					+	r	+
Polytrichum formosum			+	1			2
Rhytidiadelphus loreus			+	1			+
Scleropodium purum					+	+	+
Lophocolea bidentata	1	+			11	+	++211
Trichocolea tomentella			+			+	+
Fagus sylvatica		+	1	3342423	124	4324	+
Rubus saxatilis		+		+	1+	+	111+
Hepatica nobilis						+	+
Frangula alnus						+	+
Astrantia maior							
Stachys officinalis							
Carex pallens							
Lotus corniculatus		+			+	+	+
Phyteuma orbiculare					+	+	+
Epipactis atrorubens		r			+	+	+
Trifolium pratense					+	+	+
Plantago lanceolata					+	+	+
Tofieldia calyculata			r				
Thymus polytrichus (sp.)		+				+	
Leontodon hispidus					+		
Briza media							
Plantanthera bifolia							
Erica herbacea							
Selaginella selaginoides			r				
Plantago media					+		
Euphrasia pecta							
Prunella grandiflora					+		
Hippocrepis comosa							
Carlina scabris							
Pimpinella saxifraga							
Succisa pratensis							
Blockschuttbesiedler							
Kormophyten:							
Campanula cochleariifolia		++212		+	+	1++++11+	+2 1+
Moehringia muscosa		1111				+	+
Huperzia selago			+	+	+	+	+
Asplenium viride		+	+	+	+	+	+
Polystichum lonchitis		+	+	+	+	+	+
Clematis alpina		+	+	+	+	+	+
Asplenium trichomanes		+	+	+	+	+	+
Asplenium ruta-muraria		+	+	+	+	+	+
Thallophyten:							
Ctenidium molluscum		221+	11	321221	+	+	+
Tortella tortuosa		2+2+		1+1+11+	+	+	+
Fissidens cristatus		1++		1+1+1+	+	+	+
Schistidium apocarpum		1+		1+	+	+	+
Hypnum cupressiforme				1+	+	+	+
Rhynchostedion murale				1+	+	+	+
Mnium thomsonii				1+	+	+	+
Scapania aspera				1+	+	+	+
Cladonia pyxidata (sp.)		1		1	+	+	+
Trentepohlia aurea				1	+	+	+
Scapania aequiloba				1+	+	+	+
Isoetium alopecuroides				1+	+	+	+
Schlaepflanzen:							
Senecio fuchsii		1++3	12		+	+	+
Hycelis muralis		1111		+	+	+	+
Epilobium montanum		+	+	+	+	+	+
Eupatorium cannabinum		+	+	+	+	+	+
Geranium robertianum		+	+	+	+	+	+
Rubus idaeus		+	+	+	+	+	+
Poa nemoralis		+	+	+	+	+	+
Urtica dioica		+	+	+	+	+	+
Festuca gigantea		+	+	+	+	+	+
Poa trivialis		+	+	+	+	+	+
Moehringia trinervia		+	+	+	+	+	+
Scrophularia		+	+	+	+	+	+
Atropa belladonna		+	+	+	+	+	+
Stellaria media		+	+	+	+	+	+
Stachys sylvatica		+	+	+	+	+	+
Vicia sepium		+	+	+	+	+	+
Cirsium arvense		+	+	+	+	+	+
Melandrium rubrum		+	+	+	+	+	+
Weidezeiger							
Prenanthes purpurea		+	r	1	1r122	21	+
Veronica chamaedrys		+	+	+	+	+	+
Hypericum maculatum		+	+	+	+	+	+
Oxytropis		+	+	+	+	+	+
Anthoxanthum odoratum		+	+	+	+	+	+
Tussilago farfara		+	+	+	+	+	+
Prunella vulgaris		+	+	+	+	+	+
Alchemilla vulgaris		+	+	+	+	+	+
Rhytidiadelphus squarrosus		+	+	+	+	+	+
Verb. Char.:							
Helleborus niger		1	1	+		1111	11
Petasites albus		+	+	+	+	+	+
Polystichum lobatum		+	+	+	+	+	+
Ulmus glabra		+	+	+	+	+	+
Aruncus dioicus		+	+	+	+	+	+
Taxus baccata		+	+	+	+	+	+
Euphorbia dulcis		+	+	+	+	+	+

2223 05 3567777 267 6666 00111334457778 0000000000001114567888
4886 50 5690255 192 1127 33006089941256 1112222222261179647234
9684 63 9011112 462 7808 67067572310693 3570123467900004604520

[illegible]

<i>Picea abies</i>	2233	32	1223332	+1	11+	+ 33316435344433	64442333363364332324+5
<i>Homogyne alpina</i>	1+	+2	1+1	1+	+1	11++2+	++ 11 1+1 1+2+
<i>Pyrola uniflora</i>			r				
<i>Lycopodium annotinum</i>							
<i>Peltigera leucophebia</i>						+1	1
<i>Coraliorhiza trifida</i>	r						
<i>Monotropa hypopitys</i>			r	+r			
<i>Plagiothecium undulatum</i>							
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>							
<i>Ptilium crista-castrensis</i>							
<i>Barbilophozia lycopodioides</i>							
<i>Pyrola secunda</i>							+
<i>Juniperus sibirica</i>							
<i>Pyrola rotundifolia</i>							

[illegible]

	M	N	O	P	Q	R	S
AUFNAHMENUMMER	2223	05	3567777	267	6666	00111334457778	0000000000001114567888
	4886	50	5690255	192	1127	33006089941256	1112222222261179647236
	9684	63	9011112	462	7808	67067572310693	3570123467900004604520
Saxifraga rotundifolia			+	r			1 1
Crepis paludosa							r 1
Aconitum napellus		r	+				
Agrostis dioanta					1		+ 1
Holcina arundinacea							
Galeopsis speciosa							
Laserpitium latifolium			+	+			
Luzula campestris aeq.						+	r
Campanula rotundifolia							+
Viola hirta							
Chrysanthemum leucanthemum						+	
Coeloclossum viride							
Trifolium repens							
Arabis ciliata						+	
Lathyrus pratensis			+				
Poa pratensis							+
Carex sempervirens							+
Holcus lanatus							+
Cerastium fontanum s.l.							
Valeriana montana							
Arabis alpina		1	+				
Achillea millefolium							
Linum catharticum					+		
Salix appendiculata			+				r
Siene vulgaris							
Potentilla aurea		+				+	
Thymus pulegioides							+
Verbascum thapsus							
Bromus benekenii				+	+		
Verbascum nigrum							
Gentiana ciliata							
Valeriana montana							
Lamium maculatum							
Stellaria graminea							
Parnassia palustris							
Lonicera nigra				+		+	
Trollius europaeus							
Veratrum album							
Valeriana saxatilis						r	+
Melampyrum pratense							
Senecio abrotanifolius							
Agrostis alpina		+					
Cirsium vulgare							+
Festuca ovina							
Gymnadenia conopsea							
Rhinanthus glacialis							
Potentilla reptans							
Arabis hirsuta							
Petasites paradoxus							
Alchemilla hoppeana		r					
Gentiana verna							
Scilla perennis			I				
Thesium pyrenaicum							r
Thesium alpinum							r
Heracleum sphondylium elegans						r	
Carex flava		+					
Valeriana officinalis aeq.			r				
Galeopsis tetrahit				+			
Convallaria majalis						r	
Gymnadenia odoratissima							*
Cirsium olgaceum							
Centaurea jacea							+
Heracleum sphondylium							*
Holcina caerulea							
Heracleum laevigatum (sp.)							
Trifolium medium							
Plantago maior							
Sambucus racemosa							
Teucrium chamaedrys							
Polygonatum odoratum							
Vicia cracca							
Mentha longifolia							
Polygonum viviparum							
Cynosurus cristatus							
Rhododendron hirsutum							
Gnaphalium sylvaticum							
Euphrasia rostkoviana							
Festuca pratensis							
Leucorchis alba							
Poa alpina							
Rumex scutatus							
Luzula multiflora							
Geum rivale							
Ranunculus alpestris							
Carex firma							
Polygala alpestris							
Ranunculus plataniifolius							
Cystopteris montana		2					
Rumex alpestris			+				
Botrychium lunaria					r		
Orobanche sp.						r	
Rumex obtusifolius						*	+
Galeopsis sp.							*
Brachypodium rupestre							
Valeriana dioica							1
Salix glabra							*
Peucedanum ostruthium							
Polygodium vulgare							
Astragalus glycyphyllos							
Sambucus nigra							
Sedum album							
Cardamine amara							
Agropyron repens							
Hypericum perforatum							
Rumex acetosa							
Orobanche cf. carvophyllacea							
Orchis ustulata							
Epilobium angustifolium							
Orobanche gracilis							
Sandvisorba minor							
Obrys insectifera							
Avena pubescens							
Alnus viridis							
Salix elaeagnos							
Salix waldsteiniana							
Betula pendula							

	M	N	D	P	Q	R	S
AUFNAHMENUMMER	2223 05 3567777 267 6666 00111334457778 0000000000001114567888	4886 50 5690255 192 1127 33006089941256 1112222222261179647234	9684 63 9011112 462 7808 67067572310693 3570123467900004604520				
sonstige Thallophyten:							
Hylocomium splendens	+++	1	+2++	21	+2+	+ 1	111 11++2131+ 2 12 ++11111 111122+ 1
Plagiochila asplenoides	+11+	2	211+	1+	+	11	+11+1+11 +1 + 1+11+12 111 12+
Dicranum scoparium	1	1	+1++1+	+	+	1	1+1 + +2+1 +1++1 ++ + + +
Rhyidiadelphus triquetrus	+ 1	+	+	+	+	1+ 1	211++ ++2+ 2 1+112++1+1++ +
Thuidium tamariscinum	+	+	++	++	1+	1+	+ + +12
Plagiomnium rostratum	+ 1	+	+	++	+	+	1 1 +
Plagiozium schreberi							+ + 1 +
Cirriophyllum piliferum							+ + 1 +
Rhizomnium punctatum	1+	1	1	1	++		1
Plagiomnium affine s.str.							+1+ 11
Cladonia sp.						1	
Plagiomnium cuspidatum	+				+		
Peltigera praetextata					+		
Rhodobryum roseum					1		
Conocephalum conicum	+2	1	+	+		1	
Bryum capillare agg.							
Brachythecium rutabulum (sp.)							
Bryum sp.	1	+			+		
Brachythecium salebrosum (sp.)							
Peltigera sp.						+	
Brachythecium sp.							
Cladonia cf. furcata	+						
Barbilobozia barbata						++	
Calypogeia trichomanis					+		
Neckera crispa					rr		
Glebarostoma trichophyllum							
Campyllum halleri	+						
Dicranodontium denudatum		+					
Scapania sp.						1	
Chiloscyphus pallescens	+						
Bryum caespiticium (sp.)							
Entodon concinnus							
Campyllum stellatum							
Mnium marginatum (sp.)							
Fissidens taxifolius							
Metzgeria conopsea							
Cirriophyllum tenuinerve							
Collema sp.							
Pseudoleskea incurvata	+						
Hookeria lucens							
Bazzania tricenata							
Hypnum sauteri							
Pseudoleskeella catenulata							
Encalypta streptocarpa							
Brachythecium velutinum (sp.)							
Preissia quadrata							
Climacium dendroideis							
Solorina saccata							
Frullania tamarisci							
Brotherella lorentziana							
Leucobryum clausum							
Brachythecium rivulare							
Cratoneuron filicinum							
Bryum argenteum							
Rhacomitrium canescens							
Marchantia polymorpha							
Metzgeria pubescens							
Plagiothecium sp.							
Bryum pseudotriquetrum							
Hypnum lacunosum							
Pellia endiviaefolia							
Pohlia cruda							
Lepidozia reptans							
Lritomaria exsecta							
cf. Brachythecium reflexum							
Mnium stellare							
Lophozia ventricosa							
Amblystegium juratzkanum							
Thuidium philiberti							
Homalothecium lutescens							
Campyllum chrysophyllum							
Homalothecium sericeum							
Calliergonella cuspidata							
Thuidium delicatulum							

AUFNAHMENUMMER	2223 05 3567777 267 6666 00111334457778 0000000000001114567888	4886 50 5690255 192 1127 33006089941256 1112222222261179647234	9684 63 9011112 462 7808 67067572310693 3570123467900004604520
----------------	--	--	--

NATIONALPARK BERCHTESGADEN - TABELLE 1: WEISSEGGEN-HAINLATTICH-TANNEN-BUCHENWALD
(2. Fortsetzung)

T	Reine Ausbildung, rein, beweidet
U	Reine Ausbildung, mit Moehringia, Schlaeflur
V	Reine Ausbildung, rein, Schlaeflur
X	Reine Ausbildung, rein, Schlaeflur, beweidet
X	Astrantia-Ausbildung
Y	Reine Lotus-Ausbildung, beweidet
Z	Reine Lotus-Ausbildung
AA	Lotus-Ausbildung mit Hippocrepis

	T	U	V	M	XY	Z	AA
AUFNAHMENUMMER	0111225 3667016 4686808	0645 9050 9715	00333557 23014346 53870904	0233 9042 7516	5 115 2 129 2 591	111156 011400 826388	5556 8998 8566
AUFNAHMEMONAT	JJJJJJA UUUUUUU NLLLLLL	JMJJ UAAU NLLL	JJAASJJO UUUUUUUK NNGGLLT	JSS UUEE NLP	J JJA L UUU N NUL	JJJJJJA UUUUUUU NNNNLL	AAAS UUUE 6666
AUFNAHMEFLAECH (QM)	2212211 0000050 0000000	1121 0005000 0000000	22214233 00050000 00000000	142 0 0	2 111 0 000 0 000	111221 000000 000000	1111 0050 0000
MEERESHOEHE (10 M)	11 11 1 8009118 4256385	1 1 1 1929 4442	111 1 98223881 64201368	0832 88620	8 786 0 362	777786 631021	6666 2112
EXPOSITION (GRAD)	211 802 991 0000000	323 8371 0000	3222112 3275436 00500000	21 1 8961 0000	1 33 0 348 0 000	222 7971 ----	222 7971 ----
HANGNEIGUNG (GRAD)	223 33 0055005	3541 0005	12322223 50055550	4331 0000	1 2 5 505	2213 555500	0000
ARTENZAHL	5865765 4156641	8789 1152	55768777 35405981	6667 2993	6 959 4 556	644546 485571	4563 5508
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	1414115 0000000	12 5+00	7811 2 0050 0+	2 0	3 3 0 0	2122 +0000	1 0
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)	4 11 0 00	+ ++ 0 1	1 1 0 0	0 0		162 0005	1 0
DECKUNG DER (1.) STRAUCHSCHICHT (%)	+++ 5 0	2 51 +	2 13 ++0+00	11 7 00 0	1 1 0 1 +01	121 7 000550	2121 0500
DECKUNG DER 2. STRAUCHSCHICHT (%)							
DECKUNG DER 1. KRAUTSCHICHT (%)							
DECKUNG DER (2.) KRAUTSCHICHT (%)	5979772 0000000	3437 0000	66709909 00000000	3995 0000	9 879 0 000	888887 000000	9999 0000
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	1111236 0500000	1323 0000	32111212 05005000	42 2 0+0 0	3 132 0 000	1113 3 0000+0	223 +000

Baumarten

[illegible]

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
AUFNAHMENUMMER	0111225	0445	0033557	0233	5	115	111156	5556
	3667016	9050	23014346	9046	2	129	011400	8998
	4686808	9715	53870904	7516	2	591	826388	8566
Fraxinus excelsior								
Fraxinus excelsior								
Fraxinus excelsior								
Fraxinus excelsior								
Abies alba								
Abies alba								
Abies alba								
Abies alba								
Ulmus glabra								
Ulmus glabra								
Laxus baccata								
Laxus baccata								
Tilia platyphyllos								
Acer platanoides								
Betula pendula								
Straucharten								
Daphne mezereum								
Rosa pendulina								
Rosa pendulina								
Rubus idaeus								
Clematis alpina								
Lonicera xylosteum								
Lonicera xylosteum								
Frangula alnus								
Frangula alnus								
Corylus avellana								
Corylus avellana								
Lonicera alpicana								
Lonicera alpicana								
Crataegus monogyna								
Crataegus monogyna								
Rubus fruticosus								
Berberis vulgaris								
Berberis vulgaris								
Salix appendiculata								
Salix appendiculata								
Amelanchier ovalis								
Amelanchier ovalis								
Clematis vitalba								
Lonicera nigra								
Rosa canina								
Solanum dulcamara								
Sambucus racemosa								
(cf) Cotoneaster integerrimus								
Viburnum opulus								
Salix glabra								
Hedera helix								
Sambucus nigra								
Juniperus sibirica								
Alnus viridis								
Salix elaeagnos								
Salix waldsteiniana								
Ass.Char.:								
Elvms europaeus								
Lonicera alpicana								
Diff.Subass.:								
Mercurialis perennis								
Adenostyles glabra								
Viola riviniana + reichenb.								
Salvia glutinosa								
Brachypodium sylvaticum								
Sanicula europaea								
Maianthemum bifolium								
Plagiomnium undulatum								
Eurhynchium striatum								
Listera ovata								
Origanum vulgare								
Calamintha clinopodium								
Neottia nictus-avis								
Bazzania trilobata								
Calamagrostis varia								
Ranunculus nemorosus								
Melica nutans								
Sesleria varia								
Gymnocarpium robertianum								
Melampyrum sylvaticum								
Aster bellidifolius								
Veronica urticifolia								
Valeriana tripteris								
Larix decidua								
Knautia dipascifolia								
Carex alba								
Euphorbia amygdaloides								
Carex flacca								
Polygala chamaebuxus								
Euphorbia cyparissias								
Sorbus aria								
Diff.Ausb.:								
Thelypteris limbosperma								
Tristoma quinqueidentata								
Sphagnum (cf) nemoreum								
Blechnum spicant								
Galium rotundifolium								
Pteridium aquilinum s.str.								
Calamagrostis villosa								
Viola biflora								
Dentaria enneaphyllos								
Carex ferruginea								
Duschampsia caespitosa								
Luzula sylvatica s.l.								
Soldanella alpina								
Adenostyles alliariae								
Geranium sylvaticum								

	T	U	V	M	X	Y	Z	AA
AUFNAHMENUMMER	0111225	0445	0033557	0233	5	115	111156	5556
	3667016	9050	23014346	9046	2	129	011400	8998
	4686808	9715	55870904	7516	2	591	826588	8566
<i>Eumycarpus drvopteris</i>	r	+++	+		+	+		r
<i>Luzula pilosa</i>	r	++		+	+	+		
<i>Luzula luzulina</i>				+	+			
<i>Polytrichum formosum</i>								
<i>Rhytidiadelphus loreus</i>	+ 1		+				2	
<i>Scleropodium purum</i>			+	+		+ 1	++	++2
<i>Lophocolea bidentata</i>					2			+
<i>Trichocolea tomentella</i>								
<i>Fagus sylvatica</i>	1	++	++		+	+	++	2 1+11
<i>Rubus saxatilis</i>	+	+	+				+	++++
<i>Hepatica nobilis</i>		++		1+		+		++
<i>Franula alnus</i>				+			++	+
<i>Astrantia maior</i>					1			
<i>Stachys officinalis</i>					+			
<i>Carex pallescens</i>								
<i>Lotus corniculatus</i>	++++		++	1	+1	+1	++++	1111
<i>Phyteuma orbiculare</i>			++		1	+1	1111	++++
<i>Epipactis atrorubens</i>	+	++	r	+	r	r	++++	+
<i>Trifolium pratense</i>	+	+		+	++	+	+	1122
<i>Plantago lanceolata</i>				++	+	+	+	++1
<i>Totfieldia calyculata</i>					1	r	+	1+1
<i>Thymus polytrichus (sp.)</i>		+	+		+	+	+	+
<i>Leontodon hispidus</i>			+		11	+	+	222
<i>Briza media</i>	+			+	+	1	+	++11
<i>Platanthera bifolia</i>						1	++++	
<i>Erica herbacea</i>		r						1 3+12
<i>Selaginella selaginoides</i>								1
<i>Plantago media</i>						+		++
<i>Euphrasia picta</i>		+				1	+	222E
<i>Prunella grandiflora</i>								+
<i>Hippocrepis comosa</i>								1
<i>Carlina acaulis</i>								1+
<i>Pimpinella saxifraga</i>								1
<i>Succisa pratensis</i>								11
Blockschuttbesiedler								
Kormophyten:								
<i>Campanula cochleariifolia</i>	+	1+	+1	+	1		1	
<i>Moehringia mucosa</i>		1111	++	1+	++			
<i>Huperzia selago</i>	+	r	+					
<i>Asplenium viride</i>	+		+					
<i>Polystichum lonchitis</i>		+	++	rr				
<i>Clematis alpina</i>								
<i>Asplenium trichomanes</i>			++	+				
<i>Asplenium ruta-muraria</i>			++	+				
Thallophyten:								
<i>Ctenidium molluscum</i>	1+2	4222	11	+	+	+	1	+
<i>Tortella tortuosa</i>	+1+1+1	1221	1	+	1	++	+	+
<i>Fissidens cristatus</i>				+	+			
<i>Schistidium apocarpum</i>		1+11	+		++		+	+
<i>Hypnum cupressiforme</i>		+++						
<i>Rhynchostegium murale</i>		+			+	+		
<i>Mnium thomsonii</i>	+	1						
<i>Scapania aspera</i>			+					
<i>Cladonia pyxidata (sp.)</i>								
<i>Trentepohlia aurea</i>		1				+		
<i>Scapania aequiloba</i>		++				+		
<i>Isoetecium alopecuroides</i>								
Schlaupflanzen								
<i>Senecio fuchsii</i>	11++	1+11	12223111	2132	1			
<i>Hyssopus muralis</i>	+	+	21+	11+	1	+	+	
<i>Epilobium montanum</i>	++	+	rr1	1+	++	+	+	
<i>Eupatorium cannabinum</i>	+	+	++	2	+	1r	+	+
<i>Geranium robertianum</i>	+	+	++	+	1r	+		
<i>Rubus idaeus</i>	+	+	1+	++	+	r32		
<i>Poa nemoralis</i>	+	1	1	++		+		
<i>Urtica dioica</i>		+	2		1	1+	+	
<i>Festuca gigantea</i>			1	11+	1+	+		
<i>Poa trivialis</i>			+	+	+	1		
<i>Moehringia trinervia</i>			++	+	+	+		
<i>Scrophularia nodosa</i>	+		+	+	+	+		
<i>Atropa belladonna</i>			1	+	+	+		
<i>Stellaria media</i>	1		+	2	1	+		
<i>Stachys sylvatica</i>								
<i>Vicia sepium</i>	r			1	r		r	
<i>Cirsium arvense</i>			+	1	+	+		+
<i>Melandrium rubrum</i>			+	+	+			
Weidezeiger								
<i>Prenanthes purpurea</i>		+	1r	1	+	+	+	
<i>Veronica chamaedrys</i>	+	+++1+	1+++	r	++2+++	121	2	
<i>Hypericum maculatum</i>	+	+++1+	+	+	+	2	+	
<i>Dactylis glomerata</i>	+	+		+	++++	2	1	111
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	+	+		+	++	+	1	++1
<i>Tussilago farfara</i>				+	1	1	+	
<i>Prunella vulgaris</i>	1	+	+++	+		+	+	+
<i>Alchemilla vulgaris</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	+	1+	2		+	2	3	222 1
Verb.Char.:								
<i>Helleborus niger</i>			r+1	1	r	+	+	1+11
<i>Petasites albus</i>			+	2	r			
<i>Polystichum lobatum</i>	+							
<i>Ulmus glabra</i>			+	+				+
<i>Aruncus dioicus</i>			r					
<i>Ilex baccata</i>								
<i>Euphorbia dulcis</i>								

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
AUFNAHMENUMMER	0111225	0445	00333557	0233	5	115	111156	5556
	3667016	9050	23014346	9046	3	129	011400	8998
	4686808	9715	53870904	7516	2	591	826388	8566
Ord. u. Klass.Char.:								
Aposperis foetida	21+12	2	+1	221++22+	1+1	1	12	121111 ++
Acer pseudoplatanus	+	++1	+2	r+++++	r+2	+	+	++111+ ++
Daphne mezereum	r+	+	+	+++	++	+	r+	++
Polygonatum verticillatum	++	+	+	+	+	+	+	+
Lamium galeobdolon	1+	++	+	+	+	+	+	+
Carex digitata	1+	+	+	+	+	+	+	+
Phytolacca spicata			++	++	+	+	1	
Paris quadrifolia	r	r	r++r+	++	+		r	
Carex sylvatica	++r	1++	++1	1+++	++1	++		
Proximus excoisior	r	1	r	++1	++	++	++	
Drvopteris filix-mas	+	+	++	++1	++	++	++	
Campanula trachelium	+	r	++	++1	+	1		+
Aconitum vulpura	+	1+	++	++	+			
Cephalanthera rubra (sp.)								
Lilium martagon								
Epipactis helleborine				+				rr +
Lonicera xylosteum	r							
Corvulus avellana							r+	1 ++
Actaea spicata			r					
Anemone nemorosa							++	
Cephalanthera longifolia								
Crataegus monogyna			+				+	
Berberis villosa								1
Circaea intermedia				1				
Aegopodium podagraria				1				
Malaxis monophyllos	r					r		
Amelanchier ovalis								
Clematis vitalba								
Galium urbanum			+					
Galium odoratum								
Asarum europaeum								
Thalictrum aquilegifolium	1							
Hypericum montanum			+					+
Rosa canina								
Cypripedium calceolus								
Carex montana						+		
Atrichum undulatum						+		
Lilia platyphyllos								
Stellaria nemorum								
Chrysosplenium alternifolium								
Acer platanoides								
(cf) Cotoneaster integ.								
Viburnum opulus								
Cardamine impatiens		+						
Impatiens noli-tangere			+					
Charakterarten der Klasse								
Vaccinio-Piceetia								
Picea abies	3313113	1112	4522+223	21+3	3	311	222223	2212
Homogyne alpina	++1+2	r	++	+	+	++1	1	+
Pyrola uniflora		+						
Lycopodium annotinum							1	
Polypodium leucophaea								
Corallorhiza trifida								
Monotropa hypopitys								
Plagioglossum undulatum	r	+	r					
Vaccinium vitis-idaea							1	
Ptilium crista-castrensis								+
Berberis sibirica								
Pyrola secunda								
Juniperus sibirica			r					
Pyrola cf rotundifolia								+
sonstige Kormophyten:								
Oxalis acetosella	1++12+1	121	21++111	++1	1	+	++	++
Fragaria vesca	1++1+1	1111	12+2111	++21	++	++	11	+
Hieracium sylvaticum	r++11+	++	++	++	++	++	++	++
Solidago virgaurea	++	1	++	++	++	++	++	++
Campanula scheuchzeri	r++1+	++	++	++	++	++	++	++
Lysimachia nemorum	111+1++	++	++	++	++	++	++	++
Ajuga reptans	++	++	++	++	++	++	++	++
Galium album	++	++	++	++	++	++	++	++
Gentiana asclepiadea	++	++	++	++	++	++	++	++
Athyrum filix-temina	11	++	++	++	++	++	++	++
Chaerophyllum hirsutum	11	++	++	++	++	++	++	++
Sorbus aucuparia	++	++	++	++	++	++	++	++
Potentilla erecta	++	++	++	++	++	++	++	++
Ranunculus montanus	++	++	++	++	++	++	++	++
Pimpinella maior	++	++	++	++	++	++	++	++
Vaccinium myrtillus	++	++	++	++	++	++	++	++
Galium anisophyllum	++	++	++	++	++	++	++	++
Carduus defloratus	++	++	++	++	++	++	++	++
Festuca rubra	1111	++	++	++	++	++	++	++
Rosa pendulina	++	++	++	++	++	++	++	++
Dactylorhiza maculata	++	++	++	++	++	++	++	++
Aquilegia strata	++	++	++	++	++	++	++	++
Agrostis stolonifera	++	++	++	++	++	++	++	++
Buphthalmum salicifolium	++	++	++	++	++	++	++	++
Carex ornithopoda	++	++	++	++	++	++	++	++
Agrostis tenuis	++	++	++	++	++	++	++	++
Veronica officinalis	++	++	++	++	++	++	++	++
Primula elatior	++	++	++	++	++	++	++	++
Myosotis sylvatica	++	++	++	++	++	++	++	++
Abies alba	++	++	++	++	++	++	++	++
Cirsium palustre	++	++	++	++	++	++	++	++
Polypodium amarellum	++	++	++	++	++	++	++	++
Calamintha alpina	++	++	++	++	++	++	++	++
Taraxacum officinale	++	++	++	++	++	++	++	++
Scabiosa columbaria	++	++	++	++	++	++	++	++
Drvopteris austriaca s.str.	++	++	++	++	++	++	++	++
Cystopteris fragilis	++	++	++	++	++	++	++	++
Ranunculus acris	++	++	++	++	++	++	++	++
Thelypteris pheopteris	++	++	++	++	++	++	++	++
Cardamine flexuosa	++	++	++	++	++	++	++	++
Carex brachystachys	++	++	++	++	++	++	++	++
Vincetoxicum hirundinaria	++	++	++	++	++	++	++	++
Hieracium austriacum	++	++	++	++	++	++	++	++
Stachys alopecurus	++	++	++	++	++	++	++	++
Centaurea montana	++	++	++	++	++	++	++	++
Anemone sylvatica	++	++	++	++	++	++	++	++
Ranunculus repens	++	++	++	++	++	++	++	++

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
AUFNAHMENUMMER	0111225	0445	00333557	0233	5	115	111156	5556
	3667016	9050	23014346	9046	3	129	011400	8998
	4686808	9715	53870904	7516	2	591	826388	8566
Saxifraga rotundifolia			+					
Crepis paludosa							+	
Aconitum napellus		+						
Acrostis aloncha	3		+	+	1			+
Molinia arundinacea								1+
Galeopsis speciosa			+11	+				
Isoripitium latifolium								
Luzula campestris aq.				+1				
Campanula rotundifolia	+ r							
Viola hirta			+1				+	r+
Chrysanthemum leucanthemum		+				1	+	r+
Coleoglossum viride	a		r					
Trifolium repens								
Arabis ciliata		++				+		1+
Lathyrus pratensis		+		1	+			
Poa pratensis						1		
Carex sempervirens				1				
Holcus lanatus								+
Cerastium fontanum s.l.		++						1
Valeriana montana								
Arabis alpina			+					
Achillea millefolium				+				
Linum catharticum						+		+
Salix appendiculata							+	
Silene vulgaris								
Potentilla aurea								
Thymus pulegioides								1 1
Verbascum thapsus		+	r+					
Bromus benekenii								
Verbascum nigrum			1					
Gentiana ciliata				+				
Valeriana montana								
Lamium maculatum	r		1					
Stellaria graminea				+	1			
Parnassia palustris							+	1
Lonicera nigra								
Trollius europaeus								
Veratrum album								
Valeriana saxatilis				+				
Melampyrum pratense								
Senecio abrotanifolius								1
Acrostis alpina								
Cirsium vulgare								
Festuca ovina								1
Gymnadenia conopsea								
Rhinanthus glacialis							+	r2
Potentilla reptans					2	+1+		
Arabis hirsuta								
Petasites paradoxus				+				
Alchemilla hoppeana							2	
Gentiana verna								
Bellis perennis								
Thesium pyrenaicum								
Thesium alpinum								
Heracleum sphondylium elegans								
Carex flava						+		
Valeriana officinalis aq.								
Galeopsis tetrahit			1					
Convallaria majalis								1
Gymnadenia odoratissima	r							
Cirsium oleraceum			+					
Centauria jacea								
Heracleum sphondylium						+		
Molinia caerulea							1	2
Heracleum laevigatum (sp.)								
Trifolium medium	r 1						+	+
Plantago maior		+						
Sambucus racemosa								
Leucium chamaedrys								
Polygonatum odoratum								
Vicia cracca								
Mentha longifolia				1				
Polygnum viviparum						r+		
Cynosurus cristatus								
Rhododendron hirsutum								1
Onopeltium sylvaticum								
Euphrasia rostkoviana								
Festuca pratensis								
Leucorchis albida								
Poa alpina								
Rumex scutatus								
Luzula multiflora								
Geum rivale								
Ranunculus alpestris								
Carex firma								
Polygala alpestris								
Ranunculus platanifolius								
Cystopteris montana								
Rumex alpestris								
Botrychium lunaria								
Orobancha sp.								
Rumex obtusifolius								
Galeopsis sp.								
Brachypodium rupestre								
Valeriana dioica								
Salix diabra								
Peucedanum ostruthium								
Polygnum vulgare								
Astragalus olivophyllos								
Sambucus nigra								
Sedum album								
Cardamine amara								
Agropyron repens								
Hypericum perforatum								
Rumex acetosa								
Orobancha cf. caryophyllacea								
Orchis ustulata								
Epilobium angustifolium								
Orobancha gracilis								
Sanguisorba minor								
Uphrys insectifera								
Avena pubescens								
Alnus viridis								
Salix elaeagnos								
Salix waldsteiniana								1
Betula pendula								+

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
AUFNAHMENUMMER	0111225	0445	00333557	0233	5	115	111156	5556
	3667016	9050	23014346	9046	3	129	011400	8998
	4686808	9715	53870904	7516	2	591	826388	8566
sonstige Thallophyten:								
Hylocomium splendens	12+121	+1+2	+1	+ 2 1	1		+1+2+3	111
Plagiochila asplenoides	1	2 + 1	11	+ 1 1			++	
Dicranum scoparium	+1	+	++	+ 1 1	+		+1	
Rhytidiadelphus triquetrus	+111	2	+	+ 1 2	2 2	+	+1 1 1	1+
Thuidium tamariscinum	++21	1		+	1		+	1+
Plagiomnium rostratum		2	+1	2+				+
Pleurozium schreberi		1			1		+ 2 1	22+
Cirriophyllum piliferum	++	1		11	+ 1 1		+	
Rhizomnium punctatum								
Plagiomnium affine s.str.				+ 1				2
Cladonia sp.								
Plagiomnium cuspidatum								
Peltigera praetextata	2		r					
Rhodobryum roseum								
Conocephalum conicum	+							
Bryum capillare agg.			+1+					
Brachythecium rutabulum (sp.)				1				
Bryum sp.				+				
Brachythecium salebrosum (sp.)		+			2	+		
Peltigera sp.								
Brachythecium sp.				1				
Cladonia cf. furcata								+
Barbilophozia barbata								
Calypogeia trichomanis								
Neckera crispa								
Blepharostoma trichophyllum								
Campylium halleri	+							
Dicranodontium denudatum								
Scapania sp.								
Chiloscyphus pallescens								+
Bryum caespiticium (sp.)								
Entodon concinnus							+	
Campylium stellatum								
Hypnum marginatum (sp.)	+						+	
Fissidens taxifolius								
Metzgeria coniculata								
Cirriophyllum tenuinerve								
Collema sp.								
Pseudoleskea incurvata								
Hockeria lucens								
Bazzania tricusnata								
Hypnum sauteri	+							
Pseudoleskeella caterulata								
Encalypta streptocarpa								
Brachythecium velutinum (sp.)								
Preissia quadrata								
Climacium dendroideum								
Solorina saccata						2		+
Frullania tamariscii								
Brotherella lorentziana								
Leucobryum glaucum								
Brachythecium rivulare								
Cratoneuron filicinum								
Bryum argenteum								
Racomitrium canescens								
Harchantia polymorpha								
Metzgeria pubescens								
Plagiothecium sp.								
Bryum pseudotriquetrum								
Hypnum lacunosum								
Pellia endiviaefolia								
Pellia cruda								
Lepidozia reptans								
Tritomania exsecta								
cf. Brachythecium reflexum	+							
Hypnum stellare	+							
Lophozia ventricosa								
Amblystegium juratzkanum								
Plagiomnium elatum								
Thuidium philibertii								
Homalothecium lutescens								
Campylium chrysophyllum								
Homalothecium sericeum								
Calliergonella cuspidata								
Thuidium delicatulum							1	1

AUFNAHMENUMMER	0111225	0445	00333557	0233	5	115	111156	5556
	3667016	9050	23014346	9046	3	129	011400	8998
	4686808	9715	53870904	7516	2	591	826388	8566

HAINSIMSEN-HAINLATTICH-TANNEN-UCHENWALD (Aposerido-Fagetum luzuletosum luzulinæ)
NECKERA-HAINLATTICH-TANNEN-UCHENWALD (Aposerido-Fagetum neckeretosum crispæ)

[illegible]

[illegible]

AUFNAHMENUMMER		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		111334788888	117788	4558	4455	44	000018	0	04	0000	0000058	088
		249052224455	290234	1003	1904	22	778922	1	45	0009	7699975	944
		495947744979	398841	7023	5016	89	679470	2	45	3575	5612620	035
Ranunculus montanus	41	30.6										
Tussilago farfara	42	27.6	1	++								
Sedum album	43	27.6										
Abies alba	44	19.4	+ + + 1	r r	11	21	32	+	112	2	+	+
Primula elatior	45	18.7										
Paraxylus flacca	46	18.7	r + +	+++	r	+	+	+	+	+	+	+
Epipactis atrorubens	47	16.9										
Dactylorhiza maculata	48	10.4										
Vestrum album	49	10.4										
Saxifraga rotundifolia	50	9.0										
Plantago lanceolata	51	8.5										
Myosotis sylvatica	52	8.5										
Carduus defloratus	53	7.7										
Soldanella alpina	54	6.6										
Salix appendiculata	55	4.4										
Cirsium oleraceum	56	4.4										
Aquilegia atrata	57	4.4										
Carex ornithopoda	58	4.4										
Centaurea montana	59	4.4										
Trifolium repens	60	3.7										
Betula pendula	61	3.7										
Achillea millefolium	62	3.7										
Aconitum napellus	63	3.7										
Cynosurus cristatus	64	3.0										
Chrysanthemum leucanthemum	65	3.0										
Potentilla aurea	66	3.0										
Galeopsis speciosa	67	3.0										
Salix caprea	68	3.0										
Bromus erectus	69	3.0										
Rumex obtusifolius	70	3.0										
Poa pratensis	71	3.0										
Poa annua	72	3.0										
Thymus polytrichus (sp.)	73	3.0										
Geranium silvaticum	74	3.0										
Taraxacum officinale	75	3.0										
Cicerbita alpina	76	3.0										
Luzula campestris agg.	77	3.0										
Agrostis gigantea	78	3.0										
Potentilla reptans	79	3.0										
Carex leporina	80	3.0										
Arabis ciliata	81	3.0										
Calamintha alpina	82	3.0										
Angelica sylvestris	83	3.0										
Galeopsis sp.	84	3.0										
Geschnia flexuosa	85	3.0										
Geum rivale	86	3.0										
Urtica drameana	87	3.0										
Rumex crispus	88	3.0										
Mentha longifolia	89	3.0										
Atropa belladonna	90	3.0										
Plantago media	91	3.0										
Coeloclossum viride	92	3.0										
Rumex acetosa	93	3.0										
Poa alpina	94	3.0										
Sambucus nigra	95	3.0										
Tofieldia calyculata	96	3.0										
Carex ferruginea	97	3.0										
Senecio abrotanifolius	98	3.0										
Astrantia maior	99	3.0										
Valeriana saxatilis	100	3.0										
Valeriana montana	101	3.0										
Agrostis alpina	102	3.0										
Ranunculus plataniifolius	103	3.0										
Eupatorium salicifolium	104	3.0										
Campanula rotundifolia	105	3.0										
Calycocorsus stipitata	106	3.0										
Carex pilulifera	107	3.0										
Heracleum sphondylium elegans	108	3.0										
Galeopsis tetrahit	109	3.0										
Alnus glutinosa	110	3.0										
Astragalus olivophyllus	111	3.0										
Gentiana ciliata	112	3.0										
Rhinanthus glacialis	113	3.0										
Trifolium medium	114	3.0										
Heracleum sphondylium	115	3.0										
Hypericum hirsutum	116	3.0										
Valeriana officinalis agg.	117	3.0										
Carex muricata	118	3.0										
Salix sp.	119	3.0										
Carex flava	120	3.0										
Cirsium vulgare	121	3.0										
Linum catharticum	122	3.0										
Euphrasia picta	123	3.0										
Orobanchè cf carvophyllacea	124	3.0										
Gymnadenia conopsea	125	3.0										
Orchis ustulata	126	3.0										
Euphrasia rostkoviana	127	3.0										
Platanthera bifolia	128	3.0										
Veronica beccabunga	129	3.0										
Epilobium alpestre	130	3.0										
Senecio alpinus	131	3.0										
Lamium maculatum	132	3.0										
Crucifera laevipes	133	3.0										
Antirrhilus vulneararia	134	3.0										
Trifolium badium	135	3.0										
Centaurea jacea	136	3.0										
Nardus stricta	137	3.0										
Equisetum arvense	138	3.0										
Poa annua	139	3.0										
Cystopteris montana	140	3.0										
Polygala amarella	141	3.0										
Phyteuma orbiculare	142	3.0										
Vincetoxicum haurundinaria	143	3.0										
Alchemilla hoppeana	144	3.0										
Heliosperma quadridentatum	145	3.0										
Scabiosa columbaria	146	3.0										
Sedum alpestris	147	3.0										
Erigeron polymorphus	148	3.0										
Arabis alpina	149	3.0										
Verbascum thapsus	150	3.0										
Erica herbacea	151	3.0										
Agrostis rupestris	152	3.0										
Phyllitis scolopendrium	153	3.0										
Dryopteris (cf) carthusiana	154	3.0										

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
AUFNAHMENUMMER		111334788888	117788	4558	4455	44	000018	0	04	0000	0000058	088
		249052224455	290234	1003	1904	22	778922	1	45	0009	7899975	944
		495947744979	398841	7023	5016	89	679470	2	45	3575	5612620	035
sonstige Thallophyten:												
Plagiochila asplenioides	107	79.9	11+	11	2	+1						
Dicranum scoparium	104	77.6										
Hylocomium splendens	103	76.9										
Rhytidadelphus triquetrus	71	53.0										
Thuidium tamariscinum	69	51.5										
Rhizomnium cuspidatum	33	20.9										
Plagiomnium rostratum	34	25.4										
Cirriophyllum piliferum	33	20.9										
Pleurozium schreberei	23	17.9										
Plagiomnium affine s.str.	23	17.9										
Peltigera sp.	23	17.9										
Rhynchostegium murale	15	11.2										
Plagiomnium cuspidatum	15	11.2										
Cladonia cf furcata	14	10.4										
Cladonia sp.	14	10.4										
Bryum capillare agg.	8	6.0										
Barbilophozia barbata	8	6.0										
Campylopus stellatus	8	6.0										
Tritomaria quinquecostata	8	6.0										
Scapania sp.	7	5.2										
Brachythecium salebrosum (sp.)	7	5.2										
Rhodocorym rubicundum (sp.)	7	5.2										
Brachythecium denticulatum/sp.	6	4.4										
Brachythecium sp.	6	4.4										
Cirriophyllum tenuinerve	6	4.4										
Pellia endiviaefolia	6	4.4										
Scleropodium purum	6	4.4										
Trichocolea tomentella	6	4.4										
Campylopus halleri	6	4.4										
Brachythecium velutinum (sp.)	6	4.4										
Calypogeia trichomanis	6	4.4										
Collema sp.	6	4.4										
Pseudoleskeella catenulata	6	4.4										
Leucobryum glaucum	6	4.4										
cf Brachythecium glareosum	6	4.4										
Hookeria lucens	6	4.4										
Brotherella lorentziana	6	4.4										
Fissidens taxifolius	6	4.4										
Lepidozia reptans	6	4.4										
Metzgeria pubescens	6	4.4										
Mnium marginatum (sp.)	6	4.4										
Bartramia halleriana	6	4.4										
Preissia quadrata	6	4.4										
Bazzania tricenata	6	4.4										
Metzgeria furcata	6	4.4										
Calypogeia mesiana	6	4.4										
Mylia taylori	6	4.4										
Barbilophozia sp. (hatcheri)	6	4.4										
Ptychodium placitum	6	4.4										
Calliergonella cuspidata	6	4.4										
Bryum caespitosum (sp.)	6	4.4										
Sanionia uncinata	6	4.4										
Mnium spinosum	6	4.4										
Lophozia ventricosa	6	4.4										
Dichodontium pellucidum	6	4.4										
Lophocolea heterophylla	6	4.4										
Chiloscyphus pallescens	6	4.4										
Frullania tamarisci	6	4.4										
Orthotrichum rufescens	6	4.4										
Plagiopus oederi	6	4.4										
Homalothecium lutescens	6	4.4										
Ditrichum flexicaule	6	4.4										
Tritomaria exsecta	6	4.4										
Radula complanata (sp.)	6	4.4										
Boletium calcarata	6	4.4										
Tetraphis pellucida	6	4.4										
Solorina saccata	6	4.4										
Lophozia bicuspidata	6	4.4										
Plagiotrichum laetum	6	4.4										
Orthotrichum sp.	6	4.4										
Hylocomium ovrenaicum	6	4.4										
Hypnum callichroum	6	4.4										
Pseudoleskea incurvata	6	4.4										
Eurhynchium swartzii (sp.)	6	4.4										
Bryum cf pallescens	6	4.4										
Oreopogon cladus sp.	6	4.4										
(cf) Leocolea bantriensis	6	4.4										
Cratoneuron decipiens	6	4.4										
Isopogon muellerianum/sp.	6	4.4										
Plagiotrichum curvifolium	6	4.4										
Ricciella sp.	6	4.4										
Mnium stellare	6	4.4										
Novellia curvifolia	6	4.4										
Homomallium incurvatum	6	4.4										
Hypnum sauteri	6	4.4										
Leucodon sciurioides	6	4.4										
Bryum flaccidum	6	4.4										
Bryum sp.	6	4.4										
Sphenolobus minutus	6	4.4										
Cladonia gracilis macroceras	6	4.4										
Plagiotrichum sp.	6	4.4										
Bryum argenteum	6	4.4										
Scheuchzeria gigantea	6	4.4										
Hymenostylium recurvirostre	6	4.4										
Jungermannia leiantha	6	4.4										
Sharpiella seligera	6	4.4										

AUFNAHMENUMMER		111334788888	117788	4558	4455	44	000018	0	04	0000	0000058	088
		249052224455	290234	1003	1904	22	778922	1	45	0009	7899975	944
		495947744979	398841	7023	5016	89	679470	2	45	3575	5612620	035

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN

TABELLE 2: LABKRAUT-BUCHEN-TANNENMALD (Calio-Abietetum)

HAINSIMSEN-HAINLATTICH-TANNEN-BUCHENMALD (Aposerido-Fagetum luzuletosum luzulinae)

NECKERA-HAINLATTICH-TANNEN-BUCHENMALD (Aposerido-Fagetum neckeretosum crispae)

(1. Fortsetzung)

Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, Reine Ausbildung
Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, Reine Ausbildung mit Moehringia
Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, Reine Ausbildung mit Moehringia, Schlagflur
Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, Reine Galium rotundifolium-Ausbildung mit Moehringia
Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, Reine Galium rotundifolium-Ausbildung
Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, Galium rotundifolium-Ausbildung mit Calamagrostis varia
Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, Galium rotundifolium-Ausbildung mit Calamagrostis varia und Moehringia

	L	M	N	O	P	Q	R
AUFNAHMENUMMER	000003358 003445912 149238631	0000003344 0077777546 2623483292	5 4 5	01111288 52224023 21258025	11 22 68	11111112 11477770 1142337	1113 1943 3676
AUFNAHMEMONAT	J J J J J S M J A U U U U U E A U U N N N N N I L G	J J J J J J A S J J U U U U U U U E U U N N N N N L G P L L	J U N	J J J J J J A S U U U U U U U E N N N N N L G P	J J U U N N	J J J J U U U U L L L L	J J J A U U U U L L L G
AUFNAHMEFLAECHE (QM)	343221412 000000050 000000000	3322232221 0000000005 0000000000	3 0 0	222222222 000000000 000000000	21 0 0	4 224 0 000 0 0 000	2 2224 0 0000 0 0000
MEERESHOEHE (10 M)	1 11 909009887 903029653	111111111 9000101020 9156754905	9 0 0	07788878 02332552 000000000	88 46 0	7 710 4 009 0 000	8 7882 4 6229 2 5000
EXPOSITION (GRAD)	322 11 24182228 -500000000	85 4 3 323 431 1 0000000000	1 0 0	032 80 000000000	2 3 96 3 000000000	13 2 0 6 0 000	2 3 2 5 5000
HANGNEIGUNG (GRAD)	22 2313 005800535	111 111232 5008055007	2 8	111212 2 505000050	33 1 00 5	131 3 505 5	1111 5505
ARTENZAHL	546445347 361831930	6455665857 3858478088	5 5	87755475 11068611	54 68	7675455 9902876	7667 2052
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	77588 877 00000 000	7766677576 0000000050	5 0	76678778 55550000	67 7 00 5	743 500 500	7676 0050
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)	1 0 0	11 1 1 500+0555	1 0	055+ 1 0	1 5 0	3 0 0	1+0 0
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	++ 7 2 0+0+ 0	1 1 0++5+0	1 0	++5+ ++ ++ 0	++ 5 + 1 0	++ 0 0	+++ 0
DECKUNG DER 1. KRAUTSCHICHT (%)							
DECKUNG DER (2.) KRAUTSCHICHT (%)	565533227 000000500	4422233514 0050005050	4 0	25565463 50050000	47 00	4677758 00000000	3734 0000
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	373534235 000000000	5447543714 0000005000	3 0	35521272 00000000	31 00	3333245 00000000	3334 0000

Baumarten

Picea abies	55355 515	5544444454	4	44455445	44	555333	4454
Picea abies	1 4	11+2112	1+++ 1	2	33	1+	1+
Picea abies		1 + 1 2					
Picea abies							
Acer pseudoplatanus		++		1	+		
Acer pseudoplatanus		+	1+		+		
Acer pseudoplatanus							
Acer pseudoplatanus	r +11+r	r++ 1++++	+111	++ 1+	112 rr	1++	
Sorbus aucuparia		+					
Sorbus aucuparia	1+1r	r	+	r+++ + rr	++	r +	+
Sorbus aucuparia							
Fagus sylvatica		++					
Fagus sylvatica	r	r		++ ++		r +	r++
Fagus sylvatica							

	L	M	N	O	P	Q	R
AUFNAHMENUMMER	000003358	0000003344	5	01111288	11	1111112	1113
	003445912	0077772546	4	52229023	22	1147770	1993
	149238631	2623483292	4	21258025	68	1142337	3676
Fraxinus excelsior							
Fraxinus excelsior							
Fraxinus excelsior							
Fraxinus excelsior							
Larix decidua							
Larix decidua							
Larix decidua							
Larix decidua							
Abies alba							
Abies alba							
Abies alba							
Abies alba							
Sorbus aria							
Sorbus aria							
Betula pendula							
Betula pendula							
Ulmus glabra							
Ulmus glabra							
Ulmus glabra							
Alnus incana							
Alnus incana							
Acer platanoides							
Acer platanoides							
Taxus baccata							
Lilia platyphyllos							
Alnus glutinosa							
Straucharten							
Daphne mezereum							
Rubus idaeus							
Lonicera nigra							
Lonicera nigra							
Rosa pendulina							
Rosa pendulina							
Clematis alpina							
Clematis alpina							
Lonicera alpigena							
Lonicera alpigena							
Lonicera xylosteum							
Corvulus avellana							
Corvulus avellana							
Rubus fruticosus							
Sambucus racemosa							
Sambucus racemosa							
Salix appendiculata							
Salix appendiculata							
Ribes alpina							
Salix caprea							
Salix caprea							
Clematis vitalba							
Rosa cf. rubiginosa							
Solanum dulcamara							
Sambucus nigra							
Rhamnus cathartica							
Crataegus monogyna							
Rosa canina							
Salix sp.							
Berberis vulgaris							
Lonicera caerulea							
Viburnum opulus							
Ass.Char.:							
Galio-Abietetum							
siehe Diff.Ausb.							
Aposperido-Fagetum							
Elvmus europaeus							
Diff.Subass.:							
Adenostyles glabra							
Salvia glutinosa							
Viola riviniana + reichenb.							
Sanicula europaea							
Plagiodonium undulatum							
Maianthemum bifolium							
Brachypodium sylvaticum							
Mercurialis perennis							
Eurhynchium striatum							
Calamintha clinopodium							
Listera ovata							
Oriqane vulgare							
Bazzania trilobata							
Polytrichum formosum							
Gymnocarpium dryopteris							
Viola biflora							
Dryopteris austriaca s.str.							
Luzula luzulina							
Carex sylvatica							
Rhynchosia phaeospora							
Thelypteris pheospora							
Luzula pilosa							
Anemone nemorosa							
Atrichum undulatum							
Veronica officinalis							
Cardamine flexuosa							
Diff.Ass.:							
Thelypteris limbosperma							
Blechnum spicant							
Sphagnum (cf) nemoreum							

wichtige Blockschuttbesiedler

	L	M	N	O	P	Q	R
AUFNAHMENUMMER	000003358	0000003344	5	01111288	11	11111112	1113
	003445112	007777546	5	2222290	22	1147770	1993
	149238631	2623483292	4	21258025	68	1142337	3676

Weidezeiger

Cirsium palustre	r	+	r	+	+	+	+
Prunella vulgaris	12	1	+	+	+	+	+
Acrostis scolorifera	+	+	2	+	+	+	+
Deschampsia caespitosa	+	+	+	+	+	+	+
Rhynchospora squarrosa	+	+	+	+	+	+	+
Alchemilla vulgaris	+	+	+	+	+	+	+
Dactylis glomerata	+	+	+	+	+	+	+
Ranunculus acris	+	+	+	+	+	+	+
Bellis perennis	+	+	+	+	+	+	+
Hypericum maculatum	+	+	+	+	+	+	+
Potentilla erecta	+	+	+	+	+	+	+
Galium anisophyllum	+	+	+	+	+	+	+
Festuca rubra	+	+	+	+	+	+	+
Pimpinella major	+	+	+	+	+	+	+
Anthoxanthum odoratum	+	+	+	+	+	+	+
Leontodon hispidus	+	+	+	+	+	+	+
Trifolium pratense	+	+	+	+	+	+	+
Plantago major	+	+	+	+	+	+	+
Lotus corniculatus	+	+	+	+	+	+	+

Verb.Char.:

Prenanthes purpurea	r	+	+	+	+	+	+
Aruncus dioicus	+	+	+	+	+	+	+
Helleborus niger	+	+	+	+	+	+	+
Ulmus glabra	+	+	+	+	+	+	+
Luzula luzuloides	+	+	+	+	+	+	+
Taxus baccata	+	+	+	+	+	+	+
Festuca altissima	+	+	+	+	+	+	+

Ord. u. Klass.Char.:

Acer pseudoplatanus	r	+	+	+	+	+	+
Aposotis fideia	+	+	+	+	+	+	+
Paris quadrifolia	+	+	+	+	+	+	+
Dryopteris filix-mas	+	+	+	+	+	+	+
Daphne mezereum	+	+	+	+	+	+	+
Lamium galeobdolon	+	+	+	+	+	+	+
Carex digitata	+	+	+	+	+	+	+
Polygonatum verticillatum	+	+	+	+	+	+	+
Phyteuma spicatum	+	+	+	+	+	+	+
Epilobium montanum	+	+	+	+	+	+	+
Fraxinus excelsior	+	+	+	+	+	+	+
Actaea spicata	+	+	+	+	+	+	+
Corvulus avellana	+	+	+	+	+	+	+
Circaea intermedia	+	+	+	+	+	+	+
Impatiens noli-tangere	+	+	+	+	+	+	+
Moschardia trinervia	+	+	+	+	+	+	+
Ribes alpinum	+	+	+	+	+	+	+
Ascopodium podagracea	+	+	+	+	+	+	+
Cephalanthus rubra (sp.)	+	+	+	+	+	+	+
Galium odoratum	+	+	+	+	+	+	+
Galium urbanum	+	+	+	+	+	+	+
Ainus incana	+	+	+	+	+	+	+
Clematis vitalba	+	+	+	+	+	+	+
Acer platanoides	+	+	+	+	+	+	+
Agropyron caninum	+	+	+	+	+	+	+
Malaxis monophyllos	+	+	+	+	+	+	+
Streptopus amplexifolius	+	+	+	+	+	+	+
Lilium martagon	+	+	+	+	+	+	+
Symphytum tuberosum nodosum	+	+	+	+	+	+	+
Rosa cf. rubiginosa	+	+	+	+	+	+	+
Tilia platyphyllos	+	+	+	+	+	+	+
Circaea lutetiana	+	+	+	+	+	+	+
Asarum europaeum	+	+	+	+	+	+	+
Rhamnus cathartica	+	+	+	+	+	+	+
Thalictrum aquilegifolium	+	+	+	+	+	+	+
Crataegus monogyna	+	+	+	+	+	+	+
Milium effusum	+	+	+	+	+	+	+
Rosa canina	+	+	+	+	+	+	+
Berberis vulgaris	+	+	+	+	+	+	+
Veronica montana	+	+	+	+	+	+	+
Polygonatum multiflorum	+	+	+	+	+	+	+
Viburnum opulus	+	+	+	+	+	+	+

Charakterarten der Klasse

Vaccinio-Piceetea

Picea abies	553554515	55444444454	4	44455445	44	5	53331	4454
Homocypus alpina	+	+	+	+	+	+	+	+
Larix decidua	+	+	+	+	+	+	+	+
Luzula sylvatica s.l.	+	+	+	+	+	+	+	+
Plagiothecium undulatum	+	+	+	+	+	+	+	+
Corallorhiza trifida	+	+	+	+	+	+	+	+
Pyrola secunda	+	+	+	+	+	+	+	+
Vaccinium vitis-idaea	+	+	+	+	+	+	+	+
Pyrola uniflora	+	+	+	+	+	+	+	+
Calluna vulgaris	+	+	+	+	+	+	+	+
Barbilotia lycopodioides	+	+	+	+	+	+	+	+
Hylacomium umbratum	+	+	+	+	+	+	+	+
Lonicera caerulea	+	+	+	+	+	+	+	+

sonstige Kormophyten:

Oxalis acetosella	32233+223	3323222223	2	23222322	32	231212	3122
Athyrium filix-femina	+	+	+	+	+	+	+
Senecio fuchsii	+	+	+	+	+	+	+
Fraxaria viridis	+	+	+	+	+	+	+
Hieracium sylvaticum	+	+	+	+	+	+	+
Mycelis muralis	+	+	+	+	+	+	+
Lysimachia nemorum	+	+	+	+	+	+	+
Solidago virgaurea	+	+	+	+	+	+	+
Chaerophyllum hirsutum	+	+	+	+	+	+	+
Sorbus aucuparia	+	+	+	+	+	+	+
Ajuga reptans	+	+	+	+	+	+	+
Campanula scheuchzeri	+	+	+	+	+	+	+
Veronica chamaedrys	+	+	+	+	+	+	+
Galium album	+	+	+	+	+	+	+
Vaccinium myrtillus	+	+	+	+	+	+	+
Gentiana asclepiadea	+	+	+	+	+	+	+

	L	M	N	O	P	Q	R
AUFNAHMENUMMER	000003358	0000003344	5	01111288	11	1111112	1113
	003445912	0077772546	4	52229023	22	1147770	1993
	149238631	2623483292	4	21258025	68	1142337	3676
Ranunculus montanus	++	+ 1+ + +				+ + +	+++
Russilago farfara	+ + +	+ + + +	++ 1			+ + +	+
Adenostyles alliariae	+ + + r	+r1+r1r				+ +	
Abies alba				r			
Primula elatior		r		+ + + + +	+ +	+ + + +	1
Carex flacca				r			
Epipactis atrorubens	+	r		r+r		+r+	
Dactylorhiza maculata				r			
Veratrum album	+	r+r					r
Saxifraga rotundifolia		rr	+				
Plantago lanceolata				+			
Myosotis sylvatica	r						
Carduus defloratus							
Soldanella alpina							
Salix appendiculata							
Cirsium oleraceum						++r	+
Aquilegia atrata							+
Carex ornithopoda							
Centaurea montana							r
Trifolium repens							
Betula pendula		2					
Achillea millefolium							
Aconitum napellus							
Cynosurus cristatus							
Chrysanthemum leucanthemum							
Potentilla aurea							
Galeopsis speciosa					+		
Salix caprea							
Bromus benekenii		+		+			
Rumex obtusifolius							
Poa pratensis				+			
Poa subina				+			
Thymus polytrichus (sp.)							
Geranium sylvaticum				r			
Teraxacum officinale				+			
Cicerbita alpina							
Luzula campestris agg.							
Agrostis gigantea	1						
Potentilla reptans	+			+			
Carex leporina							
Arabis ciliata							
Calamintha alpina							
Angelica sylvestris							
Galeopsis sp.					r		
Deschampsia flexuosa							
Geum rivale							
Stellaria graminea							
Rumex alpestris							
Mentha longifolia	+						
Atropa belladonna							1
Plantago media							
Coeloclossum viride							
Rumex acetosa							
Poa alpina							
Sambucus nigra						1	
Tofieldia calyculata							r
Carex ferruginea							1
Senecio abrotanifolius							
Astrantia maior							
Valeriana saxatilis							
Valeriana montana							
Agrostis alpina							
Ranunculus platanifolius							
Euphthalmum salicifolium							
Campanula rotundifolia							
Calycocorsus stipitata							
Carex pilulifera							
Heracleum sphondylium elegans							
Galeopsis tetrahit							
Ainus glutinosa							
Astragalus glycyphyllos							
Gentiana ciliata							
Rhinanthus glacialis							
Trifolium medium							
Heracleum sphondylium							
Hypericum hirsutum							
Valeriana officinalis agg.							
Carex muricata							
Salix sp.							
Carex flava							
Cirsium vulgare							
Linum catharticum							
Euphrasia picta							
Orobancha cf. carvophyllacea							
Gymnadenia conopsea							
Orchis ustulata							
Euphrasia rostkoviiana							
Platanthera bifolia							
Veronica beccabunga							
Epilobium alpestre							
Senecio alpinus							
Lamium maculatum							
Cruciatia laevipes							
Anthraxis vulneraria							
Trifolium badium							
Centaurea jacea							
Nardus stricta							
Equisetum arvense							
Poa annua				+			
Cystopteris montana							
Polycaea amarella							
Phyteuma orbiculare							
Vincetoxicum hirsutaria							
Alchemilla hoppeana							
Heliosperma quadridentatum							
Scabiosa columbaria							
Stachys alopecurus							
Erigeron polymorphus							
Arabis alpina							
Verbascum thapsus							
Erica herbacea							
Agrostis rupestris							
Phyllitis scolopendrium							
Dryopteris (cf) carthusiana							

	L	M	N	O	P	Q	R
000003358	0000003344	5	01111288	11	1111112	1113	
003445912	007772546	4	52229023	22	1147770	1993	
149238631	2623483292	4	21258025	68	1142337	3676	

AUFNAHMENUMMER

sonstige Thallophyten:

Plagiocliala asplenoides	111+2+2	1112222212	1+2	+2	++	1221	11	+1++
Dicranum scoparium	1+2	1221	1+2	++	1+	1+1	11	1+1
Hyalocornium splendens	2+ +1+	13212221+1	11+	1+1	+	1	2122	11+3
Rhizidiadelphus tricetrus	++2++	+1	1	++	++	1+	1	++
Thuidium tamariscinum	2+22	1	11+	2	++	121	+	+
Rhizomnium punctatum	++	2	1+	+	++	1	+	+
Plagiomnium rostratum	++	2	1+	+	++	1	+	+
Cirriophyllum piliferum	++	2	1+	+	++	1	+	+
Pleurozium schreberi	++	2	1+	+	++	1	+	+
Plagiomnium affine s.str.	+	21	1	+	1	1	+	+
Peltigera sp.	+	21	1	+	1	1	+	+
Rhynchostegium murale	+	1	2221	+	+	+	+	++
Plagiomnium cuspidatum	+ 1	+	++	+	+	+	+	++
Cladonia cf furcata								++
Cladonia sp.								++
Brvum capillare agg.								++
Barbilophozia barbata								++
Campyllum stellatum								++
Tritomaria quinqueidentata								++
Scapania sp.								++
Brachythecium salebrosum (sp.)								++
Rhodobryum roseum								++
Brachythecium rutabulum (sp.)								++
Plagiocliala denticulatum/sp.								++
Brachythecium sp.								++
Cirriophyllum tenuinerve								++
Pellia endiviaeolia								++
Scleropodium purum								++
Trichocolea tomentella								++
Campyllum halleri								++
Brachythecium velutinum (sp.)								++
Calypogeia trichomanis								++
Collema sp.								++
Pseudoleskeella catenulata								++
Leucobryum glaucum								++
cf Brachythecium glareosum								++
Hookeria lucens								++
Brotherella lorentziana								++
Fissidens taxifolius								++
Lepidozia reptans								++
Metzgeria pubescens								++
Mnium marginatum (sp.)								++
Bartonia halleriana								++
Preissia quadrata								++
Bazzania tricenata								++
Metzgeria furcata								++
Calypogeia neesiana								++
Mylia taylori								++
Barbilophozia sp. (hatcheri)								++
Ptychodium plicatum								++
Calliergonella cuspidata								++
Brvum caespiticium (sp.)								++
Santonis uncinata								++
Mnium spinosum								++
Lophozia ventricosa								++
Dichodontium pallidum								++
Lophocolea heterophylla								++
Chiloscyphus pallescens								++
Frullania tamarisci								++
Orthothecium rufescens								++
Plagiopus oederi								++
Homalothecium lutescens								++
Ditrichum flexicaule								++
Tritomaria exsecta								++
Radula complanata (sp.)								++
Cololejeunea calcaria								++
Tetraphis pellucida								++
Solorina saccata								++
Cephalozia bicuspidata								++
Plagiocliala laetum								++
Orthotrichum sp.								++
Hyalocornium pyrenaicum								++
Hypnum callichroum								++
Pseudoleskea incurvata								++
Eurhynchium swartzii (sp.)								++
Brvum cf pallidum								++
Drepanocladus sp.								++
(cf) Leucocolea bantriensis								++
Cratoneuron decipiens								++
Isotervium muellerianum/sp.								++
Plagiocliala curvifolium								++
Ricciella sp.								++
Mnium stellare								++
Nowellia curvifolia								++
Homomallium incurvatum								++
Hypnum sauteri								++
Leucodon sciurioides								++
Brvum flaccidum								++
Brvum sp.								++
Sphenolobus minutus								++
Cladonia gracilis macroceras								++
Plagiocliala sp.								++
Brvum argenteum								++
Gehebia gigantea								++
Hymenostylium recurvirostre								++
Juncermannia leiantha								++
Sharpia seligera								++

AUFNAHMENUMMER

000003358	0000003344	5	01111288	11	1111112	1113	
003445912	007772546	4	52229023	22	1147770	1993	
149238631	2623483292	4	21258025	68	1142337	3676	

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN

TABELLE 2: LABKRAUT-BUCHEN-TANNENWALD (Salio-Abietetum)

HAINSIMSEN-HAINLATTICH-TANNEN-BUCHENWALD (Aposerido-Fagetum luzuletosum luzulinæ)

NECKERA-HAINLATTICH-TANNEN-BUCHENWALD (Aposerido-Fagetum neckeretosum crispæ)

(2. Fortsetzung)

Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, Carex alba-Ausbildung
Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald, Reine Ausbildung

	S	T
AUFNAHMENUMMER	0122344455677788 3018115534244955 8587600377378136	0000112333444455566666778 1166131558135945722279297 01894855651121988456945921
AUFNAHMEMONAT	JJJJAAMJJJJASSASS UUUUJAUUUUUUEEUE NNLGGILLLLGPPCPP	JJJJJJSSOMJJJJAAAAASSSAO UUUUJAUUUUUUEEUE NNNNNNLPPITINLLGGGGGPPPGT
AUFNAHMEFLÄCHE (QM)	2111221322212122 0055000000050000 0000000000000000	2232112233324222233332222 00000500000000000000000000 00000000000000000000000000
MEERESHÖHE (10 M)	1111111 11111 1111 11111111 1 111 9222102289721200 8891654556005993	00017110000029296777788130 77426849588671244235718412
EXPOSITION (GRAD)	3 2232213122122 2769925821107938 0055000000000000	1331322 231 13213 5678190110298643597930843 500005005000000000000005500
HANGNEIGUNG (GRAD)	2354433333333544 5500302075055000	33246333424332633221163233 005005550700550505050503
ARTENZAHL	7666677596868766 9740745603884505	76865565554688486656546776 36404646794391660360855026
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	5572632186364476 0000000050000005	567754 6778668476987752643 000000505555000000005000000
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)	21 6112 1 2 1 11 12 1 1 1 1 12 3 0055000 510+0 0+ 000 00+0+1 51 0+505005050+	
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	1 0+5+5++++5++++1	1 11 0+++00++ ++5+105+0++ 5
DECKUNG DER 1. KRAUTSCHICHT (%)		
DECKUNG DER (2.) KRAUTSCHICHT (%)	2234624222543444 0000000000000000	322122362211113642 4151662 00500000000000000000000000
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	532222231233312 0000000505005000	32367822221332142236222447 00000500550000050000000000

Baumarten

Picea abies	B1	331432154 63344	365543	334534432+	+4412432
Picea abies	B2	21+4122 11+12 1	11 12 1+1 1 1 1	11	+12
Picea abies	S	1 + r	2 + +	1 + + + 22	1
Picea abies	K	1 + r	1 + + r	1 + + +	1 + +
Acer pseudoplatanus	B1	1 +	1 +	1 +	1 +
Acer pseudoplatanus	B2	1 +	1 +	1 +	1 +
Acer pseudoplatanus	S	1 +	1 +	1 +	1 +
Acer pseudoplatanus	K	1 +	1 +	1 +	1 +
Sorbus aucuparia	B1	1 +	1 +	1 +	1 +
Sorbus aucuparia	B2	1 +	1 +	1 +	1 +
Sorbus aucuparia	S	1 +	1 +	1 +	1 +
Sorbus aucuparia	K	1 +	1 +	1 +	1 +
Fagus sylvatica	B1	1 +	1 +	1 +	1 +
Fagus sylvatica	B2	1 +	1 +	1 +	1 +
Fagus sylvatica	S	1 +	1 +	1 +	1 +
Fagus sylvatica	K	1 +	1 +	1 +	1 +

2

†

AUFNAHMENLÖSER

0122344455677788 0000112333444455566666778
3018115536244955 1166131558135945722227929
8587400377378136 0189465545112198845694592

Diff. Ausb.:

Petasites albus
Galium rotundifolium
Neottia nictus-avis

1 11 1

Rubus fruticosus
Holcus lanatus
Cardamine trifolia
Lathyrus pratensis

+ F ++ +

Equisetum sylvaticum
Juncus effusus
Carex remota
Brachythecium rivulare
Carex pendula

Ranunculus repens
Lathraea squamaria
Ptilium crista-castrensis

Conocephalum conicum
Myosotis palustris
Urtica dioica
Chrysosplenium alternifolium
Lophocolea bidentata
Melandrium rubrum
Crepis paludosa
Stellaria nemorum
Caltha palustris
Cardamine amara

1 + 1 = 2

r + r = 2r

<i>Calamagrostis varia</i>	1123512212332233	1111 +2221+1 2121 2 31321
<i>Veronica filicifolia</i>	1111111111111111	1111111111111111
<i>Gymnocarpium robertianum</i>	1111111111111111	1111111111111111
<i>Malva nutans</i>	1111111111111111	1111111111111111
<i>Valeriana tripteris</i>	1111111111111111	1111111111111111
<i>Aster bellidifolium</i>	1111111111111111	1111111111111111
<i>Sesleria varia</i>	1111111111111111	1111111111111111
<i>Sorbus aria</i>	1111111111111111	1111111111111111
<i>Koeleria dipacifolia</i>	1111111111111111	1111111111111111

Ranunculus nemorosus		+1+	1	++1+	r		1+	+		+	1
Carex elba		1	1	1	221	21	r	+	r	+	1 11 ++1
Euphorbia amygdaloides											
Melampyrum sylvaticum		+	+	+	+						
Polygala chamaemajus					+1+					+	
Euphorbia cyparissias			+								

Diff. Subass.:

[illegible]

wichtige Blockschuttbesiedler

Kormophyten:

Moshringia muscosa	111+111+11+11	111111111+11+1	+ 1+ 112
Huperzia selago	111+111+11+11	r+r+r+r+r+r+r	+ + + + +
Asplenium viride	111+111+11+11	11+11+11+11	+ 1 + 1+1
Geranium robertianum	r+r+r+r+r+r+r	r+r+r+r+r+r+r	+ + + + +
Campanula cochlearifolia	11+212 211+	+ + + + + 21 r	+ + + + +
Pentstemon annuus	11 r + 1	+ 1+ 11 + 1	r + + + +
Polystichum lonchitis	r + r + r + r + r	r+r+r+r+r+r+r	+ + + + +

Thallophyten:

<i>Ctenidium molluscum</i>	2121122122123322	2222+2+22222+2+22122122221
<i>Forcella tortuosa</i>	+2221+222221111	1+12+1211+2212+12+1111111
<i>Fissidens cristatus</i>	1++11112111++	+1111++1+1+12121111111

Schlagpflanzen

	r	r + +	r	+ 1r		+	++
<i>Rubus idaeus</i>							
<i>Stachys sylvatica</i>							
<i>Eupatorium cannabinum</i>		++					
<i>Sorochularia nodosa</i>							+
<i>Acrostis tatarus</i>							
<i>Carex pallescens</i>							
<i>Festuca gigantea</i>							
<i>Vicia sepium</i>							
<i>Poa trivialis</i>							
<i>Cirsium arvense</i>							
<i>Silene media</i>							

S

T

AUFNAHMENUMMER

0122344455677788 0000112333444455566666778
301811533244955 1166131558135945722272927
8587600377378136 01894855651121988456945921

Weidezeiger

Cirsium palustre	+		++	
Prunella vulgaris		+		
Agrostis stolonifera				
Deschampsia caespitosa	+			+
Rhynchosia squarrosa				
Alchemilla vulgaris		r		
Dactylis glomerata				
Ranunculus acris				
Bellis perennis				
Hypericum maculatum	+	+	+	r++r
Potentilla erecta	+	+	+	
Galium anisophyllum	++	+1	+	++
Festuca rubra				++
Pimpinella major	+			
Anthoxanthum odoratum			r	
Leontodon hispidus				
Trifolium pratense				
Plantago major				
Lotus corniculatus				

Verb.Char.:

Prenanthes purpurea	r1+	+++	++	+1	+++	+21+	+
Aruncus dioicus		+					
Helleborus niger	1	+			2		
Ulmus glabra							
Luzula luzuloides							
Taxus baccata							
Festuca altissima							1

Ord. u. Klass.Char.:

Acer pseudoplatanus	+++	1	+++	+2++	2111++	+	1+2	+2+	+++2
Abies foetida	+2	+++	+		++	r	++		
Paris quadrifolia	1vrr	+	++	++	11++	+++	+++	+++	r
Dracopis filix-mas	r+1+	+	+++	+	+++	+1+	r++	r+1+	+++
Daphne mezereum	r++	+++	+++	+++	r++	r++	r++	r++	+
Lamium galeobdolon	+++	+++	+++	+++	1111	+++	+++	+++	11
Carex digitata	111	+++	111	+++	+++	+++	+++	+++	11
Polygonatum verticillatum	+++	+++	+	+++	++	++	+++	+++	1
Phytolacca spicata	+1+	+	1	+++	++	2	++		
Epilobium montanum	++				r	r	+		
Fraxinus excelsior					r	r	+		
Actaea spicata					r	r	+		
Corylus avellana									
Circaea intermedia									
Impatiens noli-tangere									
Hochstetteria trinervia									
Ribes alpinum									
Aegopodium podagraria									
Cephalanthus rubra (sp.)									
Galium odoratum									
Geum urbanum									
Alnus incana									
Clematis vitalba									
Acer platanoides									
Adropis caninum									
Malaxis monophyllos									
Streptopus amplexifolius									
Lilium maritimum									
Symphytum tuberosum nodosum									
Rosa cf. rubiginosa									
Lilium platyphyllum									
Circaea lutetiana									
Asarum europaeum									
Rhamnus cathartica									
Thalictrum aquilegifolium									
Crataegus monogyna									
Milium effusum									
Rosa canina									
Berberis vulgaris									
Veronica montana									
Polygonatum multiflorum									
Viburnum opulus									

Charakterarten der Klasse

Vaccinio-Piceetea

Picea abies	3344432154243344	3455432334534432+114412432
Homogyne alpina	+	+1++
Larix decidua	11	++
Luzula sylvatica s.l.	++	++
Plagiothecium undulatum	++	++
Corallorhiza trifida	rr	rr
Pyrula secunda	++	++
Vaccinium vitis-idaea	++	++
Pyrula uniflora	++	++
Calamagrostis villosa	++	++
Barbillophozia lycopodioides	++	++
Hylacomium umbratum	++	++
Lonicera caerulea	++	++

sonstige Kormophyten:

Oxalis acetosella	2111112	22112+11	21211111211221122222+1212
Athyrium filix-femina	+	+	+
Senecio fuchsii	+1r	1+	++
Fraxia vesca	+	++	++
Mieracium sylvaticum	+	++	++
Pyrolis muralis	+1+	+++	++
Lysimachia nemorum	+	++	++
Solidago virgaurea	+111+	+111+	111+
Chaerophyllum hirsutum	+	+	+
Sorbus aucuparia	++	++	++
Ajuga reptans	+	+	+
Campanula scheuchzeri	+1++	1++	1+
Veronica chamaedrys	+	+	+
Galium album	+	+	+
Vaccinium myrtillus	1	+	+
Gentiana asclepiadea	++	++	++

AUFNAHMENUMMER	S	T
	0122344455677788	0000112333444455566666778
	3018115534244955	1166131558135945722279297
	8587600377378156	01894855651121988456945921
Ranunculus montanus	++ + 21	r
Russiaco farfara	2	
Adenostyles alliariae	r	++
Abies alba	+	1 r ++ 2 1
Primula elatior	+	
Carex flecca		
Eupactis atrorubens	r +r+ ++	r+r + r
Dactylorhiza maculata	+	
Veratrum album		
Saxifraga rotundifolia	++r	+ r 1 +
Plantago lanceolata		
Mycosotis sylvatica	+	+
Carduus defloratus	+ ++ ++ 1	+
Soldanella alpina		
Salix appendiculata	+	+
Cirsium oleraceum		
Aquilegia atrata	1r	+
Carex ornithopoda	+	+
Centaurea montana	r +	+
Trifolium repens		
Betula pendula		+1
Achillea millefolium		
Aconitum napellus	r	+
Cynosurus cristatus		r +
Chrysanthemum leucanthemum		
Potentilla aurea		
Galeopsis speciosa		
Salix caprea		
Bromus benekenii		
Rumex obtusifolius		
Poa pratensis		
Poa supina		
Thymus polytrichus (sp.)		1
Geranium silvaticum	+	+
Taraxacum officinale		
Cicerbita alpina		
Luzula campestris aqq.		
Agrostis gigantea		
Potentilla reptans		
Carex leporina		
Arabis ciliata	r	
Calamintha alpina	++	2
Angelica sylvestris	++	
Galeopsis sp.		
Deschampsia flexuosa		
Geum rivale		
Stellaria graminea		
Rumex alpestris		
Mentha longifolia		
Atropa belladonna		
Plantago media		
Coeloglossum viride		
Rumex acetosa		
Poa alpina		
Sambucus nigra		
Tofieldia calyculata		
Carex ferruginea	+	
Senecio abrotanifolius	+	1
Astrantia maior	+	
Valeriana saxatilis	+	
Valeriana montana	+	
Agrostis alpina	+ 1	
Ranunculus platanifolius	+	
Euphrasia salicifolium		
Campanula rotundifolia		
Calycocorsus stipitata		
Carex pilulifera		
Hieracium sphondylium elegans		
Galeopsis tetrahit		
Alnus glutinosa		
Astragalus glycyphyllos		
Gentiana ciliata		
Rhinanthus albaialis		
Trifolium medium		
Hieracium sphondylium		
Hypericum hirsutum		
Valeriana officinalis aqq.		
Carex muricata		
Salix sp.		
Carex flava		
Cirsium vulgare		
Linum catharticum		
Euphrasia picta		
Orobancha cf. carvophyllacea		
Gymnadenia conopsea		
Orchis ustulata		
Euphrasia rosikoviana		
Platanthera bifolia		
Veronica beccabunga		
Epilobium alpestre		
Senecio alpinus		
Lamium maculatum		
Crucata laevipes		
Anthyllis vulneraria		
Trifolium badiu		
Centaurea jacea		
Nardus stricta		
Equisetum arvense		
Poa annua		
Cystopteris montana	1	
Polygala amarella	+	
Phyteuma orbiculare	+	
Vincetoxicum hirsutinaria	r	
Alchemilla hoppeana		
Heliosperma quadridentatum		
Scabiosa columbaria		
Echynops alpestris		
Erigeron polymorphus		
Arabis alpina		
Verbascum thapsus		
Erica herbacea		
Agrostis rupestris		
Phyllitis scolopendrium		
Dryopteris (cf) carthusiana		

S

T

AUFNAHMENUMMER

0122344455677788 000011233444455566666778
 3018115534244955 1166131558135945722279297
 8587600377378136 01894855651121988456945921

sonstige Thallophyten:

Plagioclila asplenoides 21 1 +1+12+++ 211221 111+2221+1213 2+11
 Diceranum scoparium 11 +1+ + + + 11+1 111211+1+ + + + + + + 11 +12
 Hylocomium splendens 1 11 11+1+32111 111221+1+1 +1 2+1111+12+2
 Rhytidiadelphus triquetrus + + + + 11 1+ 11 + + + +
 Thuidium tanetianum 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + 11+1+1 + +
 Rhizomium punctatum 1 + + + + 1 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Plagiomnium rostratum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Cirriophyllum tenuinerve + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Pleurozium schreberi + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Plagiomnium affine s.str. + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Peltigera sp. + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Rhynchosodium murale + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Plagiomnium cuspidatum 1 + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Cladonia cf furcata + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Cladonia sp. + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Bryum capillare agg. + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Barbilophozia barbata + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Campyllum stellatum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Tritomaria quinqueidentata + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Scapania sp. + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Brachythecium salebrosum (sp.) + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Rhodobryum roseum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Brachythecium rutabulum (sp.) + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Plagioteichium denticulatum/sp. + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Brachythecium sp. + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Cirriophyllum tenuinerve + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Pellia endivivaria + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Scleropodium purum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Frachocolea tomentella + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Campyllum helveticum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Brachythecium velutinum (sp.) + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Calypogeia trichomanis + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Collema sp. + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Pseudoleskeella catenulata + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Leucobryum clausum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 cf Brachythecium clareosum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Hookeria lucens + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Brothierella lorentziana + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Fissidens taxifolius + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Lepidozia reptans + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Metzgeria pubescens + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Mnium marginatum (sp.) + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Bartramia halleriana + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Preissia quadrata + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Bazzania trichrenata + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Metzgeria furcata + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Calypogeia neesiana + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Mylia taylori + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Barbilophozia sp. (hatcheri) + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Ptychodium plicatum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Calliergonella cuspidata + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Bryum caespiticium (sp.) + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Sanionia uncinata + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Mnium spinosum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Lophozia ventricosa + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Dichodontium pallidum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Lophocolea heterophylla + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Chiloscopus pallescens + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Frullania tamarisci + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Orthothecium rufescens + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Plagiopus oederi + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Homalothecium lutescens + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Ditrichum flexicaule + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Tritomaria exsecta + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Radula complanata (sp.) + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Cololejeunea calcarea + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Tetraphis pellucida + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Colurina saccata + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Cephalozia bicuspidata + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Plagioteichium laetum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Orthotrichum sp. + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Hylocomium pyrenaicum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Hypnum callichroum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Pseudoleskea incurvata + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Eurhynchium swartzii (sp.) + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Bryum cf pallescens + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Drepanocladus sp. + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 (cf) Leiocolea bantriensis + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Cratoneuron decipiens + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Isophragma muellerianum/sp. + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Plagioteichium curvifolium + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Ricciella sp. + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Mnium stellare + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Howelia curvifolia + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Homomallium incurvatum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Hypnum sauteri + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Leucodon sciuroides + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Bryum flaccidum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Bryum sp. + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Sphenobolus minutus + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Cladonia dracilis macroceras + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Plagioteichium sp. + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Bryum arcanum + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Gehebia gigantea + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Hymenostylium recurvirostre + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Juncermannia leiantha + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +
 Charpella seligeri + + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + +

AUFNAHMENUMMER

0122344455677788 000011233444455566666778
 3018115534244955 1166131558135945722279297
 8587600377378136 01894855651121988456945921

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN - TABELLE 3: REINER HAINLATTICH-TANNEN-BUCHENWALD

(Aposerido-Fagetum typicum)

A	Eschen-Ausbildung mit Impatiens und Moehringia
B	Eschen-Ausbildung mit Impatiens
C	Eschen-Ausbildung mit Impatiens, rein, Schlagflur
D	Eschen-Ausbildung mit Impatiens und Moehringia, Schlagflur

F	Reine	Eschen-Ausbildung	mit Vinca
G	Reine	Eschen-Ausbildung	mit Moehringia
H	Reine	Eschen-Ausbildung	mit Rhytidiadelphus triquetrus

	A	B	C	D	E	F	G	H
AUFNAHMENUMMER	56 74 51	55 77 04	5 8 2	568 745 742	55555556666666666666 67888991223777888188 99679235284279134908	56 88 02	5666666666666666 7044444455667 6923568923013	55556666 78883788 13456657
AUFNAHMEMONAT	AA UU GG	AA UU GG	AA UU GG	SSSSSSSASS EEEEEEUEE GGGEGGGGGPPPPP	SSSSSSSASS EEEEEEUEE GGGEGGGGGPPPPP	AF GF GP	AAAAAAAASSSSS UUUUUUUUUEEEE GGGGGGGGGGPPPP	AAAAAASS UUUUUEEE GGGGGPPP
AUFNAHMEFLAECH (QM)	24 00 00	23 00 00	122 00 00	22244424334421324232 00000000000050000000 00000000000000000000	12 42 00	2322222233133 000000000000500 0000000000000000	22331322 00000000 00000000	
MEERESHOEHE (10 M)	66 64 23	66 23 6	671 320	66666666778666666666 13222221876553332232	66 53	6667788997678 3260939422376 --	66667666 22229276 --	
EXPOSITION (GRAD)	11 120 00	9 9	112 9	1 2 0-----0-0000--0-0--	1 462 --	1 1 --	1111112111 8601320492933 00000000000000	959 000 --
HANGNEIGUNG (GRAD)	11 55	20 20	321 055	11 20000030505000500300	3333333333 000005003550552	1 32223333333333 000005003550552	32200000 32200000	
ARTENZAHL	46 34 37	33 8	534 496	34324335444323232544 784438063868763028	44 16	43544444544553 9969723051545	45443445 36537560	
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	88 55	68 05	+ 2 + 05	73999978975374889781 00000000000050500500	96 00	9987889931167 00000500000000	7787876 55000500	
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)		+ 55		3 1 1 1326 01 010+0000 0 +220	7 2 6 1 0+550020000 0	11 4982 0+550020000 0	1 1111 01 0050	
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)		+ 2 + 20	0 5 5+0	231 11 2 23 4 005 50510100+0 300	32 32 300 05+	+ 1 ++ 05+	1 113 50+11005	
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	65 00	75 00	9 999 0 000	76213 45111 50000500000111002005	24 656 00 2000505002005	61622 13 152 2000505002005	65113578 00555000	
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	50 20	4 01	2 21 0 05+	1 1 1 1 0+++025+0+++++++-+1	1221 0000115505001	1 23 0000115505001	37451731 00000050	

Baumarten

[illegible]

		A		B		C		D		E		F		G		H	
AUFNAHMENUMMER		56	55	5	568	55555555	66666666666666	56	56666666666666	5555566666							
		79	77	8	745	67888991	223777888188	88	7044444455667	78883788							
		51	04	2	742	99679235	284279134908	02	6923568923013	13456687							
Straucharten																	
	Daphne mezereum	45	52	9		+	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Corvulus avellana	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Corvulus avellana	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Rubus fruticosus	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Rosa pendulina	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Rosa pendulina	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Berberis vulgaris	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Berberis vulgaris	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Fraxinus alnus	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Fraxinus alnus	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Lonicera nigra	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Lonicera nigra	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Lonicera xylosteum	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Lonicera xylosteum	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Clematis vitalba	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Lonicera alpiqena	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Lonicera alpiqena	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Rubus idaeus	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Sambucus racemosa	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Sambucus racemosa	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Amelechier ovalis	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Rhamnus cathartica	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Solanum dulcamara	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Ribes alpinum	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Sambucus nigra	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Clematis alpina	25	15	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ass.Char.:																	
	Veronica urticifolia	38	44	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Lychnis europaea	38	44	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Lonicera alpiqena	38	44	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Diff.Subass.:																	
O,K	Sanicula europaea	67	78	8		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
O,K	Mercurialis perennis	67	78	8		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
O,K	Mercurialis perennis	67	78	8		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
O,K	Pladiomium undulatum	55	55	5		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
O,K	Maianthemum bifolium	55	55	5		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
O,K	Salvia glutinosa	46	54	1		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
O,K	Brachypodium sylvaticum	46	54	1		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
O,K	Eurhynchium striatum	46	54	1		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
O,K	Neptis nidus-avis	11	12	9		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Calamintha Clinopodium	11	12	9		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Listera ovata	11	12	9		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Bazzania trilobata	6	7	1													
Diff.Ausb.:																	
Y	Fagus sylvatica	70	82	4		55	35	+	11	+	43555425533442554	53	54	5254555335124	11211222		
O,K	Fraxinus excelsior	63	74	1		21	21	+	11	+	2111121211	1	322	12	2211111111	123+	12211222
O,K	Helleborus niger	49	57	6		12	12	+	2	+	1221121211	1	322	12	2211111111	123+	12211222
O,K	Hepatica nobilis	31	36	5		12	12	+	2	+	1221121211	1	322	12	2211111111	123+	12211222
O,K	Corvulus avellana	21	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Rubus fruticosus	21	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Rubus saxatilis	21	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Polygonatum multiflorum	14	16	5		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Aegopodium podagraria	13	15	3		2	2	+	1	+	2211	+	1	+	+	+	+
O,K	Impatiens noli-tangere	9	10	6		2	2	+	1	+	2211	+	1	+	+	+	+
O,K	Elaeagnus tetrahit	8	9	4		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Geum urbanum	8	9	4		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Urtica dioica	7	8	2		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Festuca gigantea	7	8	2		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Circaea lutetiana	4	4	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Vinca minor	2	2	4													
O,K	Picea abies	73	85	9		2+	1	112	11	114	+++	3	13	12	1+	+	+
O,K	Pladiocchia asplenoides	43	50	6		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Hylocomium splendens	28	32	9		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Pladiomium affine s.str.	28	32	9		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Rhytidolepis triquetrus	16	16	8		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Cirripodium piliferum	16	16	8		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Larix decidua	14	16	5		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Geranium robertianum	13	15	3		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Viola biflora	7	8	2		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Luzula luzulina	7	8	2		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Vaccinium myrtillus	38	44	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Blockschuttbesiedler																	
Kormophyten:																	
O,K	Adenostyles glabra	37	43	5		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Myricaria muralis	33	38	8		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Campanula trachelium	20	23	5		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Moehringia muscosa	11	12	9		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Asplenium viride	11	12	9		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Thallophyten:																	
O,K	Ctenidium molluscum	52	61	2		12	22	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Scissidens cristatus	40	47	1		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Tortella tortuosa	36	42	4		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Scissidium apocarpum	26	30	6		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Pladiomium rostratum	25	29	4		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Rhynchostegium laetius	18	21	3		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Hypnum cupressiforme	10	11	8		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Blockschuttmeidende Arten:																	
O,K	Homoqyne alpina	30	35	3		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Maianthemum bifolium	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O,K	Primula elatior	20	24	7		+	+	+	+	+	+	+					

	A	B	C	D	E	F	G	H
AUFNAHME-NUMMER	56	55	5	568	55555556666666666666	56	5666666666666666	555566666
	74	77	8	745	67888991223777888188	88	7044444455667	78883788
	51	04	2	742	99679235284279134908	02	6923568923013	13456657
Schlaapflanzen								
Senecio fuchsii	42	49.4	+1	2	232 +			
Eupatorium cannabinum	9	10.6	+	2	334 +	+++ +		
Epilobium montanum	7	8.2		+	+1 +		+	+
Rubus idaeus	7	8.2		+	+12			
Atropa belladonna	4	4.7		+	1			
Myosotis sylvatica	4	4.7						
Crophularia nodosa	3	3.5	+					
Stachys sylvatica	3	3.5		+				
Sambucus racemosa	2	2.4		1				
Heidezeiger								
Veronica chamaedrys	12	14.1	++	2	2		+	+
Stellaria media	6	4.7						
Ranunculus repens	3	3.5	+					
Poa annua	2	2.4	+	+				
Verb.Char.:								
Prenanthes purpurea	36	42.4		+1	++	++	1	+
Dentaria enneaphyllos	15	17.6					+	+
Polystichum lobatum	9	10.6			r	r		
Ulmus glabra	7	8.2	+	+	+	+	+	+
Petasites albus	7	8.2		1	+			
Galium rotundifolium	7	8.2		1				
Arunco dioicus	6	7.1			+		++	
Ord. u. Klass.Char.:								
Acer pseudoplatanus	76	89.4	++	11	1	2	231111241+21+ 12+3+3	12
Apopsis foetida	60	70.6	++	++	+	+	112111211 1 ++1+2+1	11
Polygonatum verticillatum	53	62.4	++	++	+	+	++	++
Paris quadrifolia	46	54.1	++	++	+	+	++	++
Daphne mezereum	45	52.9	++	++	+	+	++	++
Dryopteris filix-mas	40	40.0	++	++	+	+	++	++
Lamium galeobdolon	38	38.3	++	++	+	+	++	++
Carex diotata	32	25.9	++	++	+	+	++	++
Cephalanthera rubra (sp.)	29	29.7	++	++	+	+	++	++
Phytolacca spicata	28	29.7	++	++	+	+	++	++
Carex sylvatica	18	21.2	++	++	+	+	++	++
Gymnocarpium dryopteris	18	21.2	++	++	+	+	++	++
Melica nutans	12	20.0	++	++	+	+	++	++
Euphorbia amygdaloides	12	20.0	++	++	+	+	++	++
Actaea spicata	12	19.1	++	++	+	+	++	++
Lilium martagon	10	14.8	++	++	+	+	++	++
Epipactis helleborine	10	14.8	++	++	+	+	++	++
Aconitum vulparia	10	11.8	++	++	+	+	++	++
Berberis vulgaris	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Lonicera xylosteum	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Clematis vitalba	6	5.9	++	++	+	+	++	++
Anemone nemorosa	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Galium odoratum	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Astrichum undulatum	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Moehringia trinervia	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Cypripedium calceolus	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Asarum europaeum	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Alnus incana	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Glechoma hederacea	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Amelanchier ovalis	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Carex montana	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Rhamnus cathartica	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Hypericum montanum	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Ribes alpinum	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Lathraea squamaria	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Prunus avium	4	4.7	++	++	+	+	++	++
Acer platanoides	4	4.7	++	++	+	+	++	++
sonstige Kormophyten:								
Oxalis acetosella	78	91.8	12	2	2	21	211231 2+2+2221+2	+1
Athyrium filix-femina	78	91.8	12	2	2	21	211231 2+2+2221+2	+1
Adiantum septentrionale	59	64.7	11	++	+	+	11++ 11++ 11++	++
Carex alba	59	58.8	11	++	+	+	11++ 11++ 11++	++
Lysimachia nemorum	59	58.8	11	++	+	+	11++ 11++ 11++	++
Polydado virgurea	46	50.1	22	2	+	32	221+1+33++ 325 22	++
Sorbus aucuparia	46	50.1	22	2	+	32	221+1+33++ 325 22	++
Fraxinus vesca	44	44.7	++	++	+	+	++	++
Aspidistra filix	44	44.7	++	++	+	+	++	++
Calamagrostis varia	44	44.7	++	++	+	+	++	++
Hieracium sylvaticum	34	40.0	++	++	+	+	++	++
Chaerophyllum hirsutum	34	40.0	++	++	+	+	++	++
Ranunculus nemorosus	28	32.9	++	++	+	+	++	++
Dryopteris austriaca s.str.	28	32.9	++	++	+	+	++	++
Campanula medium	17	20.0	++	++	+	+	++	++
Gentiana asclepiadea	17	20.0	++	++	+	+	++	++
Abies alba	14	18.8	++	++	+	+	++	++
Galium album	14	18.8	++	++	+	+	++	++
Rosa pendulina	14	18.8	++	++	+	+	++	++
Epipactis atrorubens	13	15.1	++	++	+	+	++	++
Asplenium adnigrum	11	12.9	++	++	+	+	++	++
Valeriana tripteris	11	12.9	++	++	+	+	++	++
Gymnocarpium robertianum	10	11.8	++	++	+	+	++	++
Campanula trachelium	10	11.8	++	++	+	+	++	++
Carex flacca	7	8.2	++	++	+	+	++	++
Aquilegia atrata	7	8.2	++	++	+	+	++	++
Aconitum napellus	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Cardamine flexuosa	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Fraxinus alnus	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Anacetoxium hirsutinaria	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Veronica officinalis	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Tussilago farfara	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Polygonatum odoratum	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Anemone sylvatica	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Aster bellidifolius	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Bromus benekenii	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Potentilla erecta	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Soldanella alpina	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Lonicera nigra	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Polystichum lonchitis	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Asplenium trichomanes	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Huberia selago	6	7.1	++	++	+	+	++	++
Deschampsia caespitosa	6	7.1	++	++	+	+	++	++

A	B	C	D	E	F	G	H
56	55	5	568	55555556666666666666	56	5666666666666666	55556666
74	77	8	745	6788899122377888188	88	7044444455667	78883788
51	04	2	742	996792355284279134908	02	6923568923013	13456657
AUFNAHMENUMMER							
Crepis paludosa							
Pyrola (cf) minor					+	1	
Asplenium ruta-muraria					r		
Cardus defloratus							rr
Carex ornithopoda							
Campanula rotundifolia							
Dactylis glomerata							
Thelypteris limbosperma					+		
Taraxacum officinale					r		
Ranunculus montanus							
Polypala chamaebuxus					+		
Dryopteris (cf) carthusiana							
Aesculus hippocastanum							
Melampyrum sylvaticum							rr
Campanula cochlearifolia							
Oriopogon vulgare							
Corallorhiza trifida							
Monotropa hypopitys							
Polypodium vulgare							
Luzula sylvatica s.l.							
Pyrola cf rotundifolia							
Cirsium oleraceum					+		
Cirsium arvense							
Agrostis gigantea							
Poa nemoralis					+		
Phytoloma orbiculare							
Convallaria majalis							
Heracleum sphondylium							
Hypericum perforatum							
Lycopodium annotinum					+		
Polypala amarella							
Epipactis palustris							
Buphthalmum salicifolium							
Cirsium palustre							
Centaurea montana							
Laserpitium latifolium							
Aconitum napellus							
Agrostis tenuis							
Ranunculus acris							r
Trifolium pratense							+
Erica herbacea							+
Scabiosa columbaria							+
Euphrasia picta							2
Alchemilla vulgaris							
Geum rivale							
Geranium sylvaticum							
Hypericum maculatum							
Veratrum album							
Sambucus nigra							
Galeopsis speciosa							
Peridium aquilinum s.str.							
Thelypteris phaeopteris							
Vicia sepium							
Galium anisophyllum							
Blechnum spicant							
Equisetum sylvaticum							
Clematis alpina							
sonstige Thallophten:							
Thuidium tamariscinum	28	32	9	+	+	+	+
Dicranum scoparium	28	32	9	+	+	+	+
Rhizomnium punctatum	28	32	9	+	+	+	+
Polytrichum formosum	10	14	1	+			
Isoetes alopekoides	10	14	1	+			
Peltigera praetextata	10	14	1	+			
Trentepohlia aurea	10	14	1	+			
Peltigera sp.	10	14	1	+			
Plagioglossum cuspidatum	10	14	1	+			
Mnium thomsonii	10	14	1	+			
Rhizidiadelphus loreus	10	14	1	+			
Encalypta streptocarpa	10	14	1	+			
Cirriophyllum tenuinerve	10	14	1	+			
Scapania aspera	10	14	1	+			
cf Brachythecium populeum	10	14	1	+			
Cladonia sp.	10	14	1	+			
Rhododermis roseum	10	14	1	+			
Dicranodontium denudatum	10	14	1	+			
Homalothecium lutescens	10	14	1	+			
Scapania aequiloba	10	14	1	+			
cf Brachythecium glareosum	10	14	1	+			
Entodon concinnus	10	14	1	+			
Pseudoleckesia catenulata	10	14	1	+			
Scleropodium purum	10	14	1	+			
Blepharostoma trichophyllum	10	14	1	+			
Cladonia pyxidata (sp.)	10	14	1	+			
Fissidens taxifolius	10	14	1	+			
Brachythecium rutabulum (sp.)	10	14	1	+			
Collema sp.	10	14	1	+			
Conoccephalum conicum	10	14	1	+			
Brum capillare agg.	10	14	1	+			
Homomallium incurvatum	10	14	1	+			
Brachythecium velutinum (sp.)	10	14	1	+			
Plagioglossum undulatum	10	14	1	+			
Rhizidiadelphus squarrosus	10	14	1	+			
Neckera crispa	10	14	1	+			
Mnium marginatum (sp.)	10	14	1	+			
Lophocolea bidentata	10	14	1	+			
Brachythecium salebrosum (sp.)	10	14	1	+			
Brachythecium sp.	10	14	1	+			
Hookeria lucens	10	14	1	+			
Cladonia cf furcata	10	14	1	+			
Metzgeria conopsea	10	14	1	+			
Thuidium philibertii	10	14	1	+			
Calypogeia trichomanis	10	14	1	+			
Ptilium crista-castrensis	10	14	1	+			
Barbilophozia barbata	10	14	1	+			
Sharpiella seligeri	10	14	1	+			
Pleurozium schreberi	10	14	1	+			
Scapania sp.	10	14	1	+			
Metzgeria pubescens	10	14	1	+			
Plagioglossum sp.	10	14	1	+			
Pellia endiviasifolia	10	14	1	+			
Lepidozia reptans	10	14	1	+			
Tritomaria exsecta	10	14	1	+			
Plagioglossum laetum	10	14	1	+			

M. Storch 1983 NATIONALPARK BERCHTESGADEN
TABELLE 3: REINER HAINLATTICH-TANNEN-BUCHENWALD
(Fortsetzung)

I Fichten-Ausbildung mit Moehringia
J Fichten-Ausbildung, Schlaefli
K Reine Fichten-Ausbildung
L artenarme Buchen-Fazies, Vaccinium myrtillus-Fazies
N artenarme Buchen-Fazies, rein
N artenarme Buchen-Fazies mit Moehringia

	I	J	K	L	M	N
AUFNAHMENUMMER	011233334588 933023355423 301625934576	0 4 5	000011122267 448812400026 687890512375	666 333 578	07 82 54	7777 5666 0012
AUFNAHMEMONAT	JJJJAASSJJSS UUUUUEEUEEE NNNLGGPPLPPP	J U N	JJJJJJJJJJAO UUUUUUUUUUUU NNNNNNLLLLLGT	AAA UUU GGG	JS UE NP	S000 EKKK PTTT
AUFNAHMEFLAECHE (QM)	424224332323 500000000000 000000000000	1 5 0	222222244431 000000000000 000000000000	433 000 000	24 00 00	1443 0000 0000
MEERESHOEHE (10 M)	1 11111 088812302978 388833196086	0 0 9	11 119967788871 074491356440	1 778 590	79 08	111 9222 4533
EXPOSITION (GRAD)	2331 22 232 82424571817 000000005000	2 6 0	22 22675355 173 050000000005	3 54 000	32 16 00	3 22 2778 0000
HANGNEIGUNG (GRAD)	211222333113 050500005550	3 5	441231123113 002050500570	111 002	73 05	4233 0555
ARTENZAHL	623356664344 751643337824	4 1	323342512223 272789449784	322 384	22 50	4335 9088
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	688887775867 050000050000	4 0	817868798892 005300005000	675 050	98 05	3987 0000
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)		2 1 ++0+5	0 7 11 +5 005	0 0 0 050 0	1 1 0 0	205 0205
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	1 0	++ ++	1 11 0 005	6 0 5+5	1 1 0+ +	
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	2 24131283 0+5500500000	4 0	211 6 3 12 4 0005050+0010	3 4 050	1 1 51	1 1 5++5
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	512122141 41 000000505305		111 3121 115 * 005500005000	+++	+1	5255

Baumarten

Fagus sylvatica	1	1	++	2	353	55	2443
Fagus sylvatica					1		1
Fagus sylvatica					21		
Fagus sylvatica					1	++	
Picea abies	455554443544	3	51543545554		++		1313
Picea abies		1	15	21		+	3111
Picea abies	1	++2+1	21		2	+	1+
Picea abies		r r+r				r	r
Acer pseudoplatanus			3	1			2
Acer pseudoplatanus			1				
Acer pseudoplatanus							
Fraxinus excelsior		+++++ r		111212+r	2+2	1+	+++
Fraxinus excelsior				1			
Fraxinus excelsior		r r	r +1		+	r	r
Fraxinus excelsior							
Sorbus aucuparia							
Sorbus aucuparia							
Sorbus aucuparia		r +1	1+r				
Sorbus aria							
Sorbus aria							
Sorbus aria							
Abies alba			2				
Abies alba							
Abies alba							
Abies alba							
Larix decidua			1				
Larix decidua							
Ulmus glabra							
Ulmus glabra							
Ainus incana							
Ainus incana							
Ainus incana							
Aesculus hippocastanum							
Prunus avium							
Acer platanoides							

		I	J	K	L	M	N
AUFNAHMENUMMER		011233334588	0	000011122267	666	07	7777
		9330233355423	4	448812400026	333	82	5666
		301625934576	5	687890512375	578	54	0012
Straucharten							
Daphne mezereum		+r	r+++ +		r +	+	+
Corvulus avellana						+	+
Corvulus avellana				r		r	r
Rubus fruticosus						+	
Rosa pendulina		+					+
Rosa pendulina			+				
Berberis vulgaris							
Berberis vulgaris							
Franquia alnus							
Franquia alnus							
Lonicera nigra							
Lonicera nigra				r			
Lonicera xylosteum							+
Lonicera xylosteum							
Clematis vitalba							
Lonicera alpidena							
Lonicera alpidena							
Rubus idaeus		r					
Sambucus racemosa							
Sambucus racemosa				+			
Amelanchier ovalis							
Rhamnus cathartica							
Solanum dulcamara		+					
Ribes alpinum							
Sambucus nigra			r				
Clematis alpina							+
Ass.Char.:							
Veronica urticifolia		r++	++	+	+	1+	r+++
Elymus europaeus			+	+			
Lonicera alpidena			+				
Diff.Subass.:							
Sanicula europaea		+12+++r	111	2	+1+++r	111	+
Hercynialis sarrennis		+++312+	32		41+	+++1	
Viola riviniana + reichenb.		+++1	1+	11+	+++1	r+1	+
Plagiomnium undulatum		1	+	1	1	1+1	2
Malanthemum bifolium		+	+121+	r	+	+++r+	13
Salvia glutinosa		+	+	1+	+	+	1+
Brachypodium sylvaticum			1	+	21	3	1+
Eurhynchium striatum			1	+	1	+	3
Neottia nidus-avis		r	+	+	+	1+1	+3
Calamintha clinopodium						+	
Listera ovata		+	r	+	+	+	
Bazzania trilobata		+	+	+	+	1	1
Diff.Ausb.:							
Fagus sylvatica			+1		1r+++	+	2
Fraxinus excelsior		+r	r+1		1	+	+
Helleborus niger					+	+	+
Hepatica nobilis					1	+	+
Corvulus avellana					r		
Rubus fruticosus						+	
Rubus saxatilis						+	
Polygonatum multiflorum						r	
Aconopodium podagraria				+	r+rr		
Impatiens noli-tangere							
Galeopsis tetrahit						r	
Geum urbanum							
Urtica dioica				+			
Festuca gigantea							
Circaea lutetiana							
Vinca minor							
Picea abies				455554443544	3	555435455543	+++ 1+ 3313
Plagiocchia asplenoides		2++	1++11	1	+	+++ 3+1	+
Hylocomium splendens		2	21+2	+++	+	+	+
Plagiomnium affine s.str.						+	+
Rhynchosia delphus triquetrus		2				+	+
Cirriophyllum piliferum			1		++	++	
Larix decidua		1	r	1	+	1	rr
Geranium robertianum			+	11	+	+	+
Viola biflora		1	+	11	+	+	+
Luzula luzulina		+	++			+	+
Vaccinium myrtillus		+++r	r	1			
Blockschuttbesiedler						323	+
Kormophyten:							
Adenostyles glabra		1r++1	111+	+	+	1++	r
Mycelis muralis		+	1+	++2	+	+	+
Campanula trachelium						+	+
Hochrinda muscosa		1	+	+	1+		+
Asplenium viride		+	+	r++			+
Thallophyten:							
Oteridium molluscum		212222221122		++	1111	1	1
Fissidens cristatus		+	11	+	+	+	+
Tortella tortuosa		1++11	22+1	+	+	+	+
Schistidium apocarpum			11111				+
Plagiomnium rostratum		+	+	+			+
Rhynchostadium murale					1		+
Hypnum cupressiforme		++	+				1
Blockschuttmeidende Arten:							
Homogyne alpina		1+1	1	+	2		+
Knaulia dipsacifolia			rr				+
Primula elatior			r		+	1	

	I	J	K	L	M	N
011233334568 0 000011122267 666 07 7777						
933023335523 4 448812400026 333 82 5666						
301625934576 5 687890512375 578 54 0012						
AUFNAHMENUMMER						
Crepis paludosa						
Pyrola (cf) minor						
Asplenium ruta-muraria						
Cardus defloratus						
Carex ornithopoda	r	+				
Campanula rotundifolia			r			
Dactylis glomerata						
Thelypteris limbosperma				+		
Taraxacum officinale						
Ranunculus montanus			r			
Polygala chamaebuxus	r					
Dracopis (cf) carthusiana						
Aesculus hippocastanum						
Melampyrum sylvaticum						
Campanula cochlearifolia	1	+				
Origanum vulgare	+					
Corsallorhiza trifida		r				
Monotropa hypopitys		r				
Polypodium vulgare		r				
Luzula sylvatica s.l.			r			
Pyrola cf rotundifolia					++	
Cirsium oleraceum						
Cirsium arvense						
Agrostis gigantea						
Poa nemoralis						
Phytolacca orbiculare						
Convallaria majalis						
Heracleum sphondylium						
Hypericum perforatum						
Lycopodium annotinum						
Polygala amarella						
Epipactis palustris						
Buptharum salicifolium						
Cirsium palustre						
Centaurea montana						
Laserpitium latifolium						
Aconitum napellus						
Agrostis tenuis						
Ranunculus acris						
Trifolium pratense						
Erica herbacea						
Scabiosa columbaria						
Euphrasia picta	*					
Alchemilla vulgaris						
Geranium rivaie						
Geranium sylvaticum						
Hypericum maculatum						
Veratrum album						
Sambucus nigra						
Galeopsis speciosa						
Pteridium aquilinum s.str.						
Thelypteris pheopteris						
Vicia sepium						
Galium anisophyllum						
Blechnum spicant						
Equisetum sylvaticum						
Clematis alpina						+
sonstige Thallophyten:						
Thuidium tamariscinum	1	+	++	++	++	+
Dicranum scoparium	1	++	++	++	++	++
Rhizomnium punctatum	+	++	++	++	++	++
Polytrichum formosum	+	++	++	++	++	++
Isoetes macrospora	+	++	++	++	++	++
Peltigera praetextata	+	++	++	++	++	++
Trentepohlia aurea	+	++	++	++	++	++
Peltigera sp.	+	++	++	++	++	++
Placomnium cuspidatum	+	++	++	++	++	++
Mnium thomsonii	+	++	++	++	++	++
Rhizidiadelphus loreus	1	++	++	++	++	++
Rhizidiadelphus streptocarpus	1	++	++	++	++	++
Cirriophyllum tenuinerve	1	++	++	++	++	++
Scapania aspera	+	++	++	++	++	++
cf Brachythecium populeum	+	++	++	++	++	++
Cladonia sp.	++	++	++	++	++	++
Rhododendrum roseum						
Dicranodontium denudatum						
Homalothecium lutescens						
Scapania aequiloba						
cf Brachythecium glareosum						
Entodon concinnus						
Pseudosclerella catenulata						
Scleropodium purum						
Blasiorhynchus trichophyllum						
Cladonia pyxidata (sp.)						
Fissidens taxifolius						
Brachythecium rutabulum (sp.)						
Collema sp.						
Conocephalum conicum						
Brachythecium capillare acc.						
Homomallium incurvatum						
Brachythecium velutinum (sp.)						
Plagiothecium undulatum						
Rhizidiadelphus squarrosus	1					
Nothofagus crispa						
Mnium marginatum (sp.)						
Lophocolea bidentata						
Brachythecium salebrosum (sp.)						
Brachythecium sp.						
Hookeria lucens						
Cladonia cf furcata						
Metzgeria coniculata						
Thuidium philibertii						
Calypogeia trichomanis						
Ptilium crista-castrensis						
Barbilophozia barbata						
Sharpeella seligeri						
Pleurozium schreberi						
Scapania sp.						
Metzgeria pubescens						
Plagiothecium sp.						
Pellia endiviaefolia						
Lepidozia reptans						
Tritomaria exsecta						
Plagiothecium laetum						

			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
AUFNAHMENUMMER			444445	5	334	34	3337	4	44	4	4444444445	444	4444444	44	446	66	47
			00000	0	890	30	9997	7	38	3	344477894	478	334789	77	883	45	36
			01236	7	985	74	0395	8	22	3	424615572	163	785305	27	673	71	50
Sorbus aucuparia	B	2	4.3														
Sorbus aucuparia	S	18	17.4	+													
Sorbus aucuparia	K	13	39.1	+++	+	+	+	r									
Larix decidua	B2	12	28.3						++		++	++	1	r	+	+	+
Larix decidua	S	6	6.6			1					1312			1	+	+	+
Larix decidua	B1	4	13.0		+												+
Pinus sylvestris	S	4	8.7				1										
Pinus sylvestris	B2	2	8.2							21							
Pinus sylvestris	S	2	4.3							1							
Ulmus glabra	S	4	8.7	1	+		r										
Ulmus glabra	B1	1	2.2														+
Fraxinus excelsior	S	2	4.3														1
Fraxinus excelsior	S	2	4.3														1
Betula pendula	B	1	2.2														
Betula pendula	S	1	2.2						+								

Straucharten

[illegible]

A Aposerido-Fagetum
Ass.Char.:

<i>Lonicera alpigena</i>	3	6.5	+	+	+
<i>Elymus europaeus</i>	1	2.2			+

Differentialarten

K3	<i>Erica herbacea</i>	26	56.5	3	+3	1	++	2	22	1	2111+2++	1	r	r	1	2	2	31	
	<i>Hylocomium splendens</i>	20	43.5	2+	12	211	11	212+			+	1					2	++	+3
	<i>Plagiochila asplenoides</i>	19	45.1	2+	+1	2++		1	1+1										+3
K2	<i>Hemoxys alpa</i>	18	49.1	1+	+	1+	+	+	+	+	+								+2
	<i>Pleurozium schreberi</i>	16	50.8	23	12	1	21	22	112+										
	<i>Frangula alnus</i>	12	50.1	+1+	+	+	+	+	+	+	+								+
	<i>Luzula pilosa</i>	12	50.1	+	+	+	+	+	+	+	+								+
K2	<i>Ptilium crista-castrensis</i>	10	51.7	1+	++		2	++											
	<i>Viola biflora</i>	8	17.4								+								
	<i>Cheerophyllum hirsutum</i>	7	15.9	r	+	+													
K2	<i>Dactylorhiza maculata</i>	7	15.9	r	+			r											
K1	<i>Rhvtidiadelphus loreus</i>	7	15.2			2	21	1	2										+
	<i>Berberis vulgaris</i>	4	8.7				21	++											
K1	<i>Anagallis sylvestris</i>	9	19.6		11			r			+					r		+++	
	<i>Ulmus glabra</i>	5	10.9	1+															+
	<i>Abies alba</i>	21	45.7	1++	+		1+	3222			1	2				++	++	+	+1
K1	<i>Placomium undulatum</i>	11	23.9	+	1	+		1+2			+								+
K1	<i>Valeria glutinosa</i>	9	19.6				+	+			+	+							2+
	<i>Deschampsia caespitosa</i>	9	19.6	+	+		+	+			+						1		
	<i>Lophocolea bidentata</i>	8	17.4			1		1											
K1	<i>Aequopodium podagraria</i>	7	15.2		2		1	2r+1											
K1	<i>Hepatica nobilis</i>	23	50.0			1	1			++	+	1+1	1						+
	<i>Carex ferruginea</i>	22	47.8					2	11	++	+	1+1	2	3					+
	<i>Dentaria enneaphyllos</i>	19	43.1							1	++	1	1	2	3				+
K1	<i>Prenanthes purpurea</i>	19	41.3							1	++	1	1	2	3				+
	<i>Carduus defloratus</i>	18	39.1			+				1	++	1	1	2	3				+
	<i>Euphyllanthum salicifolium</i>	18	39.1							1	++	1	1	2	3				+
	<i>Tortella tortuosa</i>	18	39.1							1	++	1	1	2	3				+
	<i>Fissidens cristatus</i>	17	37.0							1	++	1	1	2	3				+
	<i>Hieracium austriacum</i>	16	35.0							1	++	1	1	2	3				+
K3	<i>Gnaphalium molluscum</i>	14	32.9					r	+	1	2								+
	<i>Epipactis atrorubens</i>	14	30.4			r	+			r	+	r	+	r	+	r	+		+
	<i>Scabiosa columbaria</i>	13	28.3			+				r	+	1	+	+	1				+
	<i>Laserpitium latifolium</i>	12	26.1							+	+	1	+	+	1				+
	<i>Lamium galeobdolon</i>	12	26.1							+	+	1	+	+	1				+
	<i>Rosa pendulina</i>	10	23.7							+	1	+	+	+	+	+	+		+
	<i>Valeriana saxatilis</i>	10	21.7							+	1	+	+	+	+	+	+		+
K3	<i>Rubus saxatilis</i>	10	21.7									2++							+
K1	<i>Aquilegia atrata</i>	9	19.6							+	+	+	+	+	+	+	+		+
	<i>Centaurea montana</i>	8	17.4							+	+	+	+	+	+	+	+		+
K1	<i>Lilium maritacm</i>	8	17.4							+	+	+	+	+	+	+	+		+
	<i>Amelanchier ovalis</i>	7	15.2							+	+	+	+	+	+	+	+		+
	<i>Aconitum napellus</i>	7	15.2							+	+	+	+	+	+	+	+		+
K2	<i>Pinus mugo</i>	6	13.0							11	1	++	+	1				+	+
	<i>Scleropodium purum</i>	9	19.6			+		+	+	++	++	+							1
	<i>Pinus sylvestris</i>	9	19.6			+		+	1	++	++	+							+
	<i>Briza media</i>	4	8.7			+	+	1			21	+							+
	<i>Pteridium aquilinum s.str.</i>	4	8.7							1	2								11
	<i>Gymnocarpium robertianum</i>	15	32.6					r	+	+	+	+	1	1	111	r	+	+	++
	<i>Asplenium viride</i>	6	13.0							+	+	+				+	+		r
	<i>Silene vulgaris</i>	10	10.9							+	+	+				+	11		
	<i>Campanula cochleariifolia</i>	5	2.2			+													+
K1	<i>Geranium robertianum</i>	1	2.2																+

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
AUFNAHMENUMMER				44445	5	336	36	3337	4	44	4	444444445	444	444444	44	446	66	47
				00000	0	890	90	9992	7	8	3	34447788	478	334739	77	883	2	34
				01236	7	985	74	0395	8	22	3	4246115572	163	785305	27	673	71	50
Fagus sylvatica	36	78.3		1211+	+	1	+	++	+	+1	2	1++23+3+1	22	555545	45	2	11	
Mycelium murale	11	23.9											+	+++++1	+		1+	
Rhizomium punctatum	18	17.4												+++++	++	+		
Phytoma spicatum	11	15.2												r++11	++		+	
Polystichum lobatum	7	8.7												+	r++			
Thelypteris limbosperma	3	6.5															21	
Blechnum spicant	2	4.3								+							1	1
Molinia arundinacea	9	19.6								+	+					454	35	24
Vaccinium vitis-idaea	9	19.6	11			+	1	+		+								++
Calluna vulgaris	2	4.3																1+
Lycopodium annotinum	2	4.3	2							+								1+
Differentialarten des Meisseogen-HTBM zum Vergleich:																		
Viola riviniana + reichenb.	26	60.9		r++11	1	+++	r+	+	+	+	+++	+			++	+	1+	+
Maianthemum bifolium	26	56.5		222+2	+	2+1	12	2221	+	+	+	1	+	+	+	1	+	+
Listera ovata	106	39.7		+	+	+	r	+	+	+	r				r	r		
Geotria ridus-avis	106	21.7				r		+	+	+	+	+						
Sanicula europaea	1	4																
Eurhynchium striatum	1	4																
Brachypodium sylvaticum	1	4																
Origanum vulgare	16	13.5		++	+	5	2	1+	2+23				1					1
Bazzania trilobata	1	6				1		+										
Adiantum glaberrimum	2	6																
Mercurialis perennis	24	22.2							r	+	1	1++11+21	221	22+22+	2+	11	+2	1
Calamagrostis varia	47	89.1		++	11	+	+23	1	+21	2	45	1	465341523	332	2123+	2+	12	21
Melica nutans	41	80.4		++23	11	1	11	111	+	+	+	11+11	21	+	r++11	1	+	+
Sesleria varia	35	78.3		22	12	1	122	33	2333	2	2	3	2+1+1+12	+12	+	+	+	2
Ranunculus nemorosus	306	24.0		++	+	+	11	++	1+1	+	+	+	11	+	+	+	+	+
Melampyrum sylvaticum	21	10.0		1+1	+	1	1	++	++				1	+				
Aster bellidifolius	21	9.7				r	+	++	1+				1	+	1	+	+	+
Valeriana tripteris	21	9.7							1	+			++	2	++	11	+	+
Antix decidua	15	10.0							1	+			1312	1	1+	+	+	+
Knauria dipsacifolia	15	23.6					1						++	++	r	+	+	+
Veronica urticifolia	11	23.9						r					+	++	++		1	+
Carex alba	31	67.4		11312	1	1+1	11	2122	1	2	3	2	1+	+	+	1	+	2
Polygala chamaebuxus	28	58.7		+	+	+	++	11	+	+	+	+	11	+	+		+	+
Galica	28	58.7		+	+	+	++	11	+	+	+	+	11	+	+		+	+
Sorbus aria	26	58.7		+	+	+	++	11	+	+	+	+	11	+	+		+	+
Euphorbia cyparissias	18	39.1		+	+	+	++	11	+	+	+	+	11	+	+		+	+
Euphorbia amygdaloides	2	4.3					+	+					1					
Heidezeiger																		
Rhytidadelphus squarrosus	7	15.2		3	1			1	++	3								
Alchemilla vulgaris	7	15.2					r		+									
Anthoxanthum odoratum	1	11				+		11	++									
Dactylis glomerata	1	11				+		11	++									
Trifolium pratense	1	11				+		11	++									
Veronica chamaedrys	1	11				+		11	++									
Prunella vulgaris	1	11				+		11	++									
Hypericum maculatum	1	11				+		11	++									
Achillea millefolium	1	11				+		11	++									
Ranunculus acris	1	11				+		11	++									
Plantago lanceolata	1	11				+		11	++									
Schlapppflanzen																		
Senecio fuchsii	12	26.1				+			r	+		1	+	+	+	r	+	+
Salamintha clinopodium	12	26.1				+						1	+	+	+	r	+	+
Rubus idaeus	12	26.1				+						1	+	+	+	r	+	+
Eupatorium cannabinum	12	26.1				+						1	+	+	+	r	+	+
Charakterarten der Klassen																		
Quercus-Faetea																		
Aposeris foetida	41	89.1		11211	+	211	22	2221	1	11	+	+12+1+11+	11+	1+4+12+	11	++		
Acer pseudoplatanus	41	89.1		11211	+	211	22	2221	1	11	+	+12+1+11+	11+	1+4+12+	11	++		
Daphne mezereum	300	65.5		r+1	+	1+	+	++	+	rr	+	r+1+1+1+	+	2+	+1+11	1+	+	+
Polygonatum verticillatum	15	15								+	+	++	++	++	++	++		++
Carex dioica	11	23.2				+	+	++	1	+	+	++	++	++	++	++		1
Paris quadrifolia	1	4				+						+	+	+	+	++		
Anemone nemorosa	11	23.2				+	2+					+	+	+	+	++		
Dryopteris filix-mas	1	4								r					r			
Carex sylvatica	1	4								r					r			
Gymnocarpium dryopteris	1	4								r					r			
Prunus dioica	1	4								r					r			
Thalictrum aquilegifolium	1	4								r					r			
Fraxinus excelsior	1	4								r					r			
Crataegus monogyna	1	4								r					r			
Cephalanthera longifolia	1	4								r					r			
Malaxis monophyllos	1	4								r					r			
Epilobium montanum	1	4								r					r			
Aritichum undulatum	1	4								r					r			
Campanula trachelium	1	4								r					r			
Festuca gigantea	1	4								r					r			
Helieborus niger	1	4								r					r			
Vaccinio-Piceetea																		
Picea abies	41	89.1		42324	1	423	24	3223	+	11	2	1211	2+2	r++	2++1	+	+12	+11
Pyrola cf. rotundifolia	1	4				+		2	r									
Picramnia europaea	1	4																
Listera cordata	1	4																
Barbilophozia lycopodioides	1	4																
Puzosia sylvatica s.l.	1	4																
Clematis alpina	1	4																
Corallorhiza trifida	1	4																
Huperzia selago	1	4																
Erico-Pinetea																		
Rhododendron hirsutum	5	10.9											r1	+				++
Gymnadenia odoratissima	5	10.9											+	+				++

44445	5	334	34	3337	4	44	4	444444445	444	444444	44	446	66	47
00000	0	890	90	9997	7	38	3	344477894	478	334789	77	883	45	34
01236	7	985	74	0395	8	22	3	424615572	163	785305	27	673	71	50

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
AUFNAHMENUMMER	44445	5	334	34	3337	4	44	4	444444445	444	444444	44	446	66	47
	00000	0	890	90	9997	7	38	3	344477894	478	334789	77	883	45	34
	01236	7	985	74	0395	8	22	3	424615572	163	785305	27	673	71	50
Orthothecium rufescens	1														
Brvum sp.	1														
Scapania aequiloba	1														
Leiocolea muelleri	1														
Solorina saccata	1														
Scapania aspera	1														
Isoeternum cf. pulchellum	1														
Fissidens bryoides	1														
Isothecium alopecuroides	1														
Riccardia multifida	1														
Brachythecium salebrosum (sp.)	1														
Dicranodontium denudatum	1														
Calypogeia trichomanis	1														
Tritomaria quinqueidentata	1														
Sphagnum (cf) nemoreum	1														

AUFNAHMENUMMER	44445	5	334	34	3337	4	44	4	444444445	444	444444	44	446	66	47
	00000	0	890	90	9997	7	38	3	344477894	478	334789	77	883	45	34
	01236	7	985	74	0395	8	22	3	424615572	163	785305	27	673	71	50

E	Erica-Ausbildung	mit	Vaccinium vitis-idaea	
E	Erica-Ausbildung	mit	Selaginella	
E	Erica-Ausbildung	mit	Selaginella, bspewid	
E	Erica-Ausbildung	mit	Ornithium hovearum	
R	Reine Ausbildung, verarmt			
R	Reine Ausbildung			
R	Reine Ausbildung	mit	Stachys alopecurus	
R	Reine Ausbildung	mit	Lucia lusitana	
R	Reine Ausbildung	mit	Calamagrostis villosa	
R	Reine Ausbildung	mit	Calamagrostis villosa,	Schlagflur
R	Reine Ausbildung	mit	Calamagrostis villosa,	Schlagflur

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
AUFNAHMENUMMER	122333444 411344969 212823866	7778 7990 6890	4555 6223 9231	44557 26127 47697	55 22 47	057777 946668 883679	2357778 5761180 6622734	3 7 3	233337 176881 350233	277 868 282	247 510 592	1223 6555 3341
AUFNAHMEMONAT	JJJJSSJJJ JJJJJJJJJ NLLGPPLLL	JAAA JJJJJJJJ LGGG	JJJJ JJJJJJJJ LLLL	JJJJJ JJJJJJJJ NLLT	JJ JJ NLLT	JJ000A JJJJJJJJ LGGG	JOASSAA KKKKKKKK LTTT	0 K L	JO000S KKKKKKKK LTTT	AOA JJJJJJJJ GTT	JJS JJJJJJJJ JJJJ	JJJJ JJJJJJJJ JJJJ
AUFNAHMEFLAECH (QM)	2212321 005000520 000000000	3 2211 0050 0000	1221 5000 0000	12111 00000 00000	11 52 00	124442 000000 000000	2323222 0000000 0000000	2 0 0	123312 500050 000000	211 080 000	212 000 0000	1111 0000 0000
MEERESHOEHE (10 M)	111111111 023343342 631417292	1111 5444 2669	1111 6555 2231	111111 555555 13175	11 55 57	111111 122253 264511	111111 4413333 2045785	1 4 0	111111 342123 203889	111 234 774	111 433 322	1111 3444 4542
EXPOSITION (GRAD)	2 223 1 364780 000000055	1 1211 8082 0000	2121 9789 0000	21 21 55 56 00-00	33 00 05	23222 680788 055550	22 32 701 589 000-00	1 3 0 0 0	3 333 25154 000500	232 310 500	222 426 0005	1111 3444 0000
HANGNEIGUNG (GRAD)	333231453 000505055	3342 5550	3122 0005	21 22 55050	22 22 55	233421 055075	33 222 0550055	0 0 0	312242 555000	432 000	313 055	2223 5000
ARTENZAHL	865456455 075194434	7666 6657	5556 6276	56564 92264	65 66	445547 265466	5776677 7541060	8 2	577546 513097	656 615	567 1333	5556 0000
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	7586722 5000500	5361 0000	1123 0000	2 21 + 0 0	0 0	367886 005550	5766676 0005000	0 0	576617 000000	341 005	11 11	5623 0000
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)	1 + 0 + 0	312 + 000	+++		+ 0	555+	+ 0	+ 5	1 + 555	1 001	1 1	1 05+0
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	4 0	++ + 1+	++++	1 0 5+	1 1	+ 0+ 0	+++		+ + +++	1 0 5+	11 05	5+05
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	343263622 505050505	2637 0000	1223 0555	24767 00000	57 00	621 15 005550	5332346 0500000	0 0	921552 055505	777 000	048 000	8978 0000
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	243122212 000500000	2331 0005	1333 0000	22231 00000	23 00	121113 000550	2233346 0500000	2 0	133363 000000	365 001	21 + 5	0 + 0

[illegible]

13	11.6	+	r+	+	+	+	r	r		+
19	8.0	+	r	+	rr+	+				
6	5.4			+					r	+

Ord. u. Klass.Char.:

[illegible]

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
AUFGABENNUMMER		122333444	7778	4555	44557	55	057777	2357778	3	233337	277	247	1223			
		4413447	7990	6251	7990	62	946668	5761190	7	78888	868	510	6555			
		212823866	6890	9251	47617	47	883679	6622754	7	350233	282	592	3341			
K2	Begeleiter aus der Klasse															
	Vaccinio-Piceetea															
	Picea abies	106	94.6	357544	2+	3342	1+23	+2 21	1+	344554	4444444	4	344424	322	+2	4+23
	Homogyne alpina	100	89.3	+11111	+	1112	+212	11+	+	11+211	2	12+221	12	1	+	4+22
	Larix decidua	69	58.9	1	2		+111	1+	+	11		1	+	+	1	+
	Helianthemum sylvaticum	69	58.9													
	Lyopodium annotinum	15	13.4													
	Barbilotophia lyopodioides	13	11.6													
	Conicaria casulosa	2	1.6													
	Corallorhiza trifida	2	1.6													
	Bazzania trilobata	4	4.4													
	Pteris aquilina	4	4.4													
	Blechnum spicant	4	4.4													
	Hylocomium umbratum	4	4.4													
	Pinus mugo	4	4.4													
	Pinus cembra	4	4.4													
	Plagiothecium undulatum	4	4.4													
	Ptilium crista-castrensis	4	4.4													
	Juniperus sibirica	4	4.4													
	Listera cordata	4	4.4													
	sonstige Kormophyten:															
	Campanula scheuchzeri	96	85.7	+11+1+	+	11+	+211	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Aster bellidioides	90	80.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Solidago virgaurea	88	78.6	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Chaerophyllum diarsutum	82	72.3	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Ranunculus nemorosus	82	72.3	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Oxalis acetosella	80	71.4	+22212	+	1+	+1+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Valeriana varia	80	71.4	+22212	+	1+	+1+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Hieracium sylvaticum	80	71.4	+22212	+	1+	+1+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Vaccinium myrtillus	75	67.0	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Valeriana varia	75	67.0	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Athyrium filix-femina	70	62.0	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Ranunculus montanus	70	62.0	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Helianthemum sylvaticum	70	62.0	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Ajuga reptans	65	55.7	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Knaulia dipsacifolia	60	55.0	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Sorbus aucuparia	60	55.0	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Veronica chamaedrys	60	55.0	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Deschampsia caespitosa	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Lysimachia nemorosus	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Centaurea ascoptidea	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Sesleria varia	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Rosa pendulina	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Thelypteris liliifolia	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Gymnocarpium robertianum	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Agrostis stolonifera	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Helianthemum rubrum	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Galium album	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Rubus saxatilis	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Dactylorhiza maculata	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Silene vulgaris	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Centaurea montana	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Thelypteris pheopteris	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Carex flacca	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Cicerbita alpina	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Valeriana montana	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Sorbus chamaemespilus	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Rumex alpestris	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Primula elatior	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Aconitum napellus	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Ranunculus platentifolius	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Poa alpina	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Agrostis tenuis	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Aquilegia atrata	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Heliosperma quadridentatum	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Scabiosa columbiana	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Abies alba	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Festuca ovina	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Achillea millefolium	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Poa hybrida	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Polygala alpestris	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Arabis pumila	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Parnassia palustris	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Salix appendiculata	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Crucianula vulgaris	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Poa pratensis	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Euphrasia picta	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Sedum album	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Leucorchis alba	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Veronica fruticans	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Teraxacum officinale	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Polygala amarella	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Dactylis glomerata	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Sagina saginoides	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Cystopteris montana	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Biscutella laevigata	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Carex brachystachys	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Valeriana saxatilis	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Heracleum sphondylium elegans	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Anemone sylvestris	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Arabis ciliata	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Juncus trifidus ssp. hostii	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Heracleum villosum	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Scirpus palustris	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Euphorbia cyparissias	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Helianthemum nummularium	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Carex alba	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Pimpinella maior	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Polygala vulgaris	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Laserpitium latifolium	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Sorbus aria	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+	+	11+11+	+	+	+	+
	Arabis alpina	46	46.4	+1+1+	+	11+	+111	11111	1	11+						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
AUFNAHMENUMMER	122333444	7778	4555	44557	55	057777	2357778	3	233337	277	247	1223
	411344969	7990	6223	26127	22	946668	5761180	7	178881	868	510	6555
	212823866	6890	9231	47697	47	883679	6622734	7	350233	282	592	3341
<i>Setula pendula</i>	1	0.9										
<i>Eupatorium cannabinum</i>	1	0.9										
<i>Epipactis atrorubens</i>	1	0.9										
<i>Calluna vulgaris</i>	1	0.9										
<i>Hieracium sp.</i>	1	0.9										
<i>Petasites paradoxus</i>	1	0.9										
<i>Agrostis rupestris</i>	1	0.9										
<i>Carex capillaris</i>	1	0.9										
<i>Epilobium alsinifolium</i>	1	0.9										
<i>Carex pilulifera</i>	1	0.9										
<i>Galammarostis epigeios</i>	1	0.9										
<i>Potentilla brauneana</i>	1	0.9										
<i>Stellaria media</i>	1	0.9										
<i>Festuca rupicaprina</i>	1	0.9										
<i>Dracopis villarii</i>	1	0.9										
<i>Luzula campestris</i> aq.	1	0.9										
<i>Cotrychium lunaria</i>	1	0.9										
<i>Achillea atrata</i>	1	0.9										
<i>Cirsium spinosissimum</i>	1	0.9										
<i>Thesium pyrenaicum</i>	1	0.9										
<i>Alnus viridis</i>	1	0.9										
<i>Bartsia alpina</i>	1	0.9										
<i>Gymnadenia conopsea</i>	1	0.9										
<i>Trifolium repens</i>	1	0.9										
<i>Briza media</i>	1	0.9										
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	1	0.9										
<i>Primula auricula</i>	1	0.9										
<i>Crepis pyrenaica</i>	1	0.9										
<i>Hieracium bifidum</i> (sp.)	1	0.9										
<i>cf. Chrysanthemum vulgare</i>	1	0.9										
<i>Orobancha sp.</i>	1	0.9										
<i>Epilobium alpestre</i>	1	0.9										
<i>Carduus personata</i>	1	0.9										
<i>Linum catharticum</i>	1	0.9										
<i>Plantago maior</i>	1	0.9										
<i>Atropa belladonna</i>	1	0.9										
<i>Equisetum arvense</i>	1	0.9										
<i>Lathyrus pratensis</i>	1	0.9										
<i>Cardaminopsis arenosa</i>	1	0.9										
<i>Hyssopus palustris</i>	1	0.9										
<i>Mentha longifolia</i>	1	0.9										
<i>Carex paniculata</i>	1	0.9										
<i>Bromus benckensis</i>	1	0.9										
sonstige Thallophyten:												
<i>Plagioclila asplenoides</i>	84	75.0	+1++1++	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Dicranum saccatum</i>	76.6	58.9	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Hylocomium splendens</i>	48.2	1	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Rhizidium punctatum</i>	23.3	25.0	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cladonia sp.</i>	23.3	20.5	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Thuidium tamariscinum</i>	21	18.8	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Brachythecium sp.</i>	20	17.9	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Brachythecium salebrosum</i> (sp.)	13	11.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Hylocomium pyrenaicum</i>	12	10.7	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pellia endiviaefolia</i>	11	9.8	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pellidra praetextata</i>	11	9.8	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Saxania sp.</i>	11	9.8	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Brachythecium velutinum</i> (sp.)	11	9.8	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cladonia cf. furcata</i>	11	9.8	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pleurozium schreberi</i>	10	8.9	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Calypogeia trichomanis</i>	10	8.9	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Peltigera sp.</i>	8	7.1	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Sanionia uncinata</i>	8	7.1	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Bryum capillare</i> aq.	7	6.3	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Ptychodium plicatum</i>	7	6.3	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Tritomania quinquecostata</i>	6	5.4	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Brachythecium rutabulum</i> (sp.)	6	5.4	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Collema sp.</i>	6	5.4	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Blaspharostoma trichophyllum</i>	6	5.4	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Rhodobryum roseum</i>	6	5.4	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Tayloria serrata</i>	6	5.4	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Plagioclonium affine</i> s.str.	4	4.5	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Encalypta streptocarpa</i>	4	4.5	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Dicranodontium denudatum</i>	4	4.5	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Peltigera laeophlebia</i>	4	4.5	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Plagioclonium denticulatum</i> /sp.	4	4.5	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Chiloscyphus pallescens</i>	4	4.5	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Bryum sp.</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Sarbilophozia sp.</i> (hatcheri)	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Mnium marginatum</i> (sp.)	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>cf. Brachythecium glareosum</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Dicranum flexicaule</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Saxania tricusata</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Plagioclonium cuspidatum</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Tetradia pellucida</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Leioclisis muelleri</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Racomitrium canescens</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Radula complanata</i> (sp.)	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Dichodontium pellucidum</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cetraria islandica</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Marchantia polymorpha</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Bryum caespiticium</i> (sp.)	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>cf. Brachythecium reflexum</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cirriophyllum reichenbachianum</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cratoneuron commutatum</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Bryum pseudotriquetrum</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pholia wahlenbergii</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cladonia cf. digitata</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Solorina saccata</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Orthothecium rufescens</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Campylopus schwarzi</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cratoneuron filicinum</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Meesia uliginosa</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cratoneuron commut. sulcatum</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Heterozia pubescens</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Hypnum cupressiforme</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Tritomania exsecta</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Isotrichum alopecuroides</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Neckera crispa</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Mylia taylori</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Juncermannia leiantha</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Lepidozia reptans</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Hyarophyllum luridum</i>	3	3.6	+1++1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
AUFNAHMENUMMER	122333444	7778	4555	44557	55	057777	2357778	3	233337	277	247	1223
	411344969	7990	6223	26127	22	946668	5761180	7	178881	868	510	6555
	212823866	6890	9231	47697	47	883679	6622734	7	350233	282	592	3341
<i>Eurhynchium cf. praelongum</i>	1	0.9						1				
<i>Lophozia vantrivosa</i>	1	0.9										
<i>cf. Brachythecium reflexum</i>	1	0.9									+	
<i>Tortula norvegica</i>	1	0.9										+
<i>Rhizomnium magnifolium</i>	1	0.9										
<i>Neckera complanata</i>	1	0.9										
<i>Cladonia gracilis macroceras</i>	1	0.9										
<i>Cirriophyllum tenuinerve</i>	1	0.9										
<i>Bryum flaccidum</i>	1	0.9										
<i>Plagiothecium sp.</i>	1	0.9										
<i>Mezgeria coniugata</i>	1	0.9										
<i>Mnium stellare</i>	1	0.9										
<i>Lophocolea bidentata</i>	1	0.9										
<i>Brachythecium rivulare</i>	1	0.9										
<i>Scapania cuspiduligera</i>	1	0.9										
AUFNAHMENUMMER	122333444	7778	4555	44557	55	057777	2357778	3	233337	277	247	1223
	411344969	7990	6223	26127	22	946668	5761180	7	178881	868	510	6555
	212823866	6890	9231	47697	47	883679	6622734	7	350233	282	592	3341

(Fortsetzung)

M Reine Ausbildung, rein, beweidet

N	Reine Saxifraga rotundifolia-Ausbildung mit Rhododendron
	Reine Saxifraga rotundifolia-Ausbildung, beweidet
	Reine Saxifraga rotundifolia-Ausbildung, beweidet, Schlaflflur
	Saxifraga rotundifolia-Ausbildung mit Calycocorus
	Saxifraga rotundifolia-Ausbildung mit Stachys nemorosus, beweidet
	Saxifraga rotundifolia-Ausbildung mit Stachys alopecurus
	Reine Saxifraga rotundifolia-Ausbildung
	Reine Saxifraga rotundifolia-Ausbildung, beweidet, Schlaflflur
	Saxifraga rotundifolia-Ausbildung mit Stellaria nemorus
	Saxifraga rotundifolia-Ausbildung mit Stellaria nemorus, Schlaflflur

				M	N	O	P	Q	R	S		T		U	V	W							
AUFNAHMENUMMER				23344	3	122227	222	2222223	22333	3	7	12222222233355777778		1477	223	2346							
				51144	2	9222488	224	9999990	23277	0	8	8222446884771788990		7601	267	5329							
				28978	1	024840	567	2345890	91048	7	7	70170460391358667456		8594	850	7759							
AUFNAHMEMONAT				JAAJJ	A	JJJJAA	JJJ	AAAAAAA	JJASO	J	JJJJJJJJASSSJAAAAA	JSS	JJS	JAS									
				UUUUU	U	UUUUUU	UUU	UUUUUUU	UUUEK	F	UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU	UUUE	UUU	UUU									
				LGNNG	G	LLLLGG	LLL	GGGGGGG	LLGPT	P	LLLLLLLLGGPPPLGGGGGG	LLP	LLP	LLP	LGNN								
AUFNAHMEFLAECH (QM)				11112	2	21321	122	3322232	21222	1	1121112121323212122	2321	12	1222									
				50500	0	050055	000	0000000	05000	0	55005500500000000000	0000	550	5000									
				00000	0	000000	000	0000000	00000	0	00000000000000000000	0000	000	0000									
MEERESHOEHE (10 M)				11111	1	111111	111	1111111	11111	1	11111111111111111111	1111	111	111	11	11							
				44433	6	444344	444	5666655	46554	8	344444443344445443343	3424	444	4392									
				52708	0	269912	550	7145974	21403	8	8242240684292418044	0590	221	0183									
EXPOSITION (GRAD)				2523	6	3	11	3433442	2	11	2	1232	33	32	323	3	333						
				00000	0	000050	000	0050500	00000	0	16553535	33	57	27	82	323	3						
											5055000000000000000000	1222	555	000	0000								
HANGNEIGUNG (GRAD)				12322	0	333132	22	2333332	24233	3	2332132333332233331	1000	223	24	22								
				05555	0	755550	305	5007005	00550	3	055555555505555500000	5500	535	0055									
ARTENZAHL				67766	7	656565	987	5746963	88678	7	7557875555767769777	7876	467	3698									
				91581	7	580511	468	8579319	28571	3	2893967380722970168	4360	969	8901									
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)				23112		13421	1	121	121	34354	3	4444236211563447426	5	012	000	+0 0							
				00000	+	+00000	0	5	050	505	00000	0	00000000000000000000										
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)				550	2	1	05	5	+	5	5050	2	1 11	5	+	+	1 0+	5++	+0 1				
													0 0500										
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)				<11		5	5++1	1	50+	+0.1	0555	2	0++	+	+05+	5++++	++	++	8	02	1	0	+01
				+500+																			
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)				96768	7	898779	998	9090001	68847	6	37787668897431444587	5895	896	000	9675								
				00500	0	000500	000	0000000	00000	5	005000000000005000000	0000	000	000	0050								
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)				1224	2	211131	112	2222125	61114	2	422133223232332343	2150	624	0515									
				0050+	0	500000	000	5000000	00050	0	000000000000050500000	0000	050	005	005								

Baumarten

[illegible]

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W			
AUFNAHMENUMMER	23344	3	122227	222	2222223	22333	7	122222222333577778	1477	223	2346			
	51144	2	922488	226	9999990	22377	0	8222446884771788990	7601	247	5229			
	28978	1	024840	567	2345890	91048	7	7017046039135867456	8594	850	7759			
Straucharten														
Daphne mezereum	++	r	+	++r	+	r+11++	1+	+	+	+1+r	r++r	++	+	+
Rosa pendulina														
Rosa pendulina							1	+	+	+	1+	++	+	+
Clematis alpina				+			++	+	r	+	+	++		
Sorbus chamaemespilus														
Sorbus chamaemespilus			++		++									
Rubus idaeus														
Lonicera alpidena				11								+2		+
Lonicera alpidena														+
Lonicera nigra							1			+				
Lonicera nigra										+				
Salix appendiculata														
Salix appendiculata				+										r
Lonicera caerulea														
Lonicera caerulea									++					
Ribes alpina				+						+				
Juniperus sibirica							+							
Linus viridis														
Ass.Char.:														
Veronica urticifolia	+	+			1		+	1	+	+	++++++11	+	+	+
Lonicera alpidena								1			++			
Differentialarten														
Luzula sylvatica s.l.	2++	+	1	121222	12+	1222111	21+11	2	222+22+12121	+122	2	+	r+1	+
Geranium sylvaticum	+++++	+	1	+++++1	+21	+1+111+	+3++	+	r+11111+1+++++	+1+11	+	+	+11	+
Hypericum maculatum	+++++			+11112	111	211111+	11+2		++1+r11+1+1+1	+11		2+	r12	+
Soldanella alpina	2221+			211112	+++	+11142	2		++22211+2212+	11	1		+11	+
Carex ferruginea	52213	1	544	22	11+	3242321			22++1	1321+			+11	+
Pseudoskieska incurvata	1		2			1+1	2		+		+++	+	+1	+
Agrostis alpina				+										
Viola biflora	11111	1	111211	111	+	++112	11121	2	1222112+1	121221222	21		221	1211
Drvopteris austriaca s.str.						++			2+1+	++++		+1	11+	r
Adenostyles alliariae	1111+	2	2++321	213	32+	2+	3+111	2	311432312	112211222	2+	2	452	+
Saxifraga rotundifolia						+1+111	111	1	1+211231111+1+11+	2	++	222	112	+
Gentiana saxophyllus	r+	1	+11	+		+1+1	++	1	14+111+1+1+1+1+1				+1	r
Crepis paludosa				111	12	+	r1+11+	1	+	+1=1	11211	11+111		+1+
Aconitum vulparia							1+	1	+	1+	+1+2++	2+1	21	r+
Myosotis sylvatica							1+	+		+++			1	+
Geum rivale				++	+1+	221	+	1+	+	++r+	+	+1+	r	1+
Doronicum austriacum				+			r		2+					3
Mercurialis perennis	1					11	2	1	11	++	111	1+	22+2	+2
Adenostyles alabra		1				1					++	111		21+
Pianthentum bifolium											+1		++	
Pianthentum undulatum							+	+						+
Sanicula europaea				+										1++
Eurhynchium striatum														+
Brachypodium sylvaticum					2									1+
Viola riviniana + reichenb.									r				1	+
Erica herbacea														
Polygala chamaebuxus			1	+										
Senecio abrotanifolius						+			++					
Vaccinium vitis-idaea							+							
Selaginella selaginoides	++1++		+	+			1	1	+	+	+	r	r	+
Veronica aphylla							+							+
Preissia quadrata														
Pohlia cruda							+							
Veronica alpina														
Gentiana verna														
Gnaphalium hopenanum														
Salix reticulata														
Luzula luzulina	++	+			++		1	1+	+	++	+	+1+	1	+
Polytrichum formosum					++		+		++	+1	r	+1+	+	+
Gymnocarpium drovpteris		+			+				++	+1	r	+1+	+	+
Rhynchospora boreus	1	+	1	2	+				++	+1	r	+	+	++
Hypnum callichroum							+		22	+1	2	21		1
Luzula pilosa	+								++	+1	11	11+	1	+
Calamagrostis villosa					2	2	2		+					+
Rhododendron hirsutum			3				2+42	1						
Luzula glabrata	+	+				++1+	+			1	+	++		+2
Pucedanum ostruthium						r	+++							
Phytolama orbiculata	1	++				r	+++	1	+	+				
Calycocorsus stipitata				1	1	+	1	+	2					
Phleum alpinum	+			+1	+	1	+1+							
Conocephalum conicum	+	++	+	+	1	+	1+	1		+	+	+	+1	211
Cirriophyllum piliferum						1		2			+	+	+	+31+
Petasites albus										1	2		1	232
Stellaria nemorum				+				r		1				+
Chrysosplenium alternifolium														221
Caracea intermedia														2
Cardamine amara														1
Besonnungszeiger														
Carduus defloratus	11+		+		+		r	+1+1	1		r		+	++
Calamintha alpina	+11		+		+		+	1++	+				+	+
Stachys alopecurus			++	+1	1			12+12	1				+	+
Carex sempervirens								1	+					
Carlina acaulis	1							++						
Blockschutthesiedler														
Kormophyten:														
Asplenium viride	+++	1	r	+	+	r	1	+	++	+++1		+	+++++	+
Polystichum lonchitis	r	+	r	+			+	+	+	++	+	1	r++	+
Huperzia selago									++	+1+r	+	+1+	+	+
Moehringia muscosa	++	1							1	1	++	+	+++	+
Campanula cochlearifolia								r		+	r	+		+
Gystopteris fragilis														1+
Clematis alpina					+			++	+	r	+		++	

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
AUFNAHMENUMMER	23344	3	122227	222	2222223	22333	7	122222223335777778	1477	223	2346
	51144	2	922488	224	95559990	23277	0	82224466884771788990	7601	247	5329
	28978	1	024840	567	2345890	91048	7	7017046039135867456	8594	850	7759
Agrostis cf coarctata											
Asplenium trichomanes							+		+	+	
Asplenium ruta-muraria											r
Lonicera nigra								+			
Thallophyten:											
Ctenidium molluscum	2223+		+	11+	1	12	1	1	22	12	1
Tortellia tortuosa	112	+	+	+	11+	+	+	+	1	21	12
Schistidium apocarpum	112	+	+	+	11+	+	+	+	1	21	12
Fissidens cristatus	1+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mnium thomsonii	1+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Scapania aequiloba	1+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Rhynchostegium murale	1+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cladonia pyxidata (sp.)	1+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Trentepohlia aurea	1+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Campylium halleri	1+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Campylium stellatum	1+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Scapania aspera	1+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Barbilophozia barbata	1+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Schlaapflanzen											
Senecio fuchsii	+211	2	11	+	233	1	2	r+3r1	1	1	+1r
Fragaria vesca	+++	+	+	+	+++	+	+	+++	+	+	+
Epilobium montanum	+++	+	+	+	+++	+	+	+++	+	+	+
Poa nemoralis	+++	+	+	+	+++	+	+	+++	+	+	+
Mycelis muralis	+++	+	+	+	+++	+	+	+++	+	+	+
Cardamine flexuosa	+++	+	+	+	+++	+	+	+++	+	+	+
Rubus idaeus	+++	+	+	+	+++	+	+	+++	+	+	+
Urtica dioica	+++	+	+	+	+++	+	+	+++	+	+	+
Veronica officinalis	+++	+	+	+	+++	+	+	+++	+	+	+
Tussilago farfara	+++	+	+	+	+++	+	+	+++	+	+	+
Geranium robertianum	+++	+	+	+	+++	+	+	+++	+	+	+
Ranunculus repens	+++	+	+	+	+++	+	+	+++	+	+	+
Poa trivialis	+++	+	+	+	+++	+	+	+++	+	+	+
Galeopsis speciosa	+++	+	+	+	+++	+	+	+++	+	+	+
Weidezeiger											
Nardus stricta	+1										
Bellis perennis											
Carex flava	r										
Carex lepidocarpa											
Alchemilla vulgaris	111	1	r+1	1	2+	211	111	+12	+	+	+
Leontodon hispidus	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Poa alpina	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Polygonum viviparum	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Crepis aurea	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Lotus corniculatus	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Festuca rubra	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Veratrum album	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Trollius europaeus	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Potentilla erecta	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Anthoxanthum odoratum	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Coeloglossum viride	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Gentiana pannonica	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Potentilla aurea	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Heracleum austriacum	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Rhytidadelphus squarrosus	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Trifolium pratense	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Prunella vulgaris	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Tofieldia calyculata	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Alchemilla hoppeana	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Cerastium fontanum s.l.	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Thymus polytrichus (sp.)	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Plantago lanceolata	111	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+
Verb. Char.:											
Prenanthes purpurea	1	+									
Helleborus niger	1	+									
Polystichum lobatum	1	+									
Fagus sylvatica	1	+									
Aronia dioica	1	+									
Galium rotundifolium	1	+									
Ulmus glabra	1	+									
Ord. u. Klass.Char.:											
Aposaxis foetida	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Lamium galeobdolon	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Acer pseudoplatanus	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Phytolacca spicata	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Carex dioica	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Dryopteris filix-mas	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Polygonatum verticillatum	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Paris quadrifolia	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Melica nutans	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Lilium martagon	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Carex sylvatica	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Thalictrum aquilegifolium	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Listera ovata	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Atrichum undulatum	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Streptopus amplexifolius	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Salvia glutinosa	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Neottia nictus-avis	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Anemone nemorosa	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Alnus incana	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Euphorbia amygdaloides	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Ribes alpinum	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Actaea spicata	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Campanula trachelium	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Veronica montana	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Hypericum montanum	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Halaxis monophyllus	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Ranunculus lanuginosus	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Fraxinus excelsior	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Moehringia trinervia	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Festuca elatior	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Hepatica nobilis	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Asarum europaeum	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Impatiens noli-tangere	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11
Scrophularia nodosa	111	1	1	22	11	1	22	11	1	22	11

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
AUFNAHMENUMMER	23344	3	122227	222	2222223	22333	7	122222223335777778	1477	223	2346
	51144	2	922488	224	9999990	23277	0	8222446884771788990	7601	247	5529
	28978	1	024840	567	2345890	91048	7	7017046059135867456	8594	850	7759
Beleiter aus der Klasse											
Vaccinio-Piceetea											
Picea abies	23212		r2+321	221	+	+	+	32+33	2	333423422+343434324	421 322 +412
Homomyne alpina	11111	1	+1111	+	+	+	+	1111+	1	1111211	2 + 1 + 1
Larix decidua			+23	1	+	+	+	122222			
Melampyrum sylvaticum	1										
Coralorhiza innominata											
Berberis trifoliata											
Lonicera caerulea											
Corallorhiza trifida											
Bazzania trilobata											
Pyrola uniflora											
Blechnum spicant											
Hylocomium umbratum											
Pinus mugo											
Pinus cembra											
Plagiothecium undulatum											
Ptilium crista-castrensis											
Juniperus sibirica											
Listera cordata											
sonstige Kormophyten:											
Campanula scheuchzeri	+1+1	+	+++++	+++	+++++	+++	+	+11++11++1111++11	11	+++	+
Aster bellidioides	22122	+	11111	2+	11111	+	+	+122+11+11111	1	+	+
Solidago virgaurea			+++	+	+++	+	+	+1111++11++11	+	+	+
Chaerophyllum hirsutum	122+	1	11212	2+	2111222	+	21	r++12++12++11++11	+	+	+
Ranunculus nemorosus	1++	2	1+2	112	+2+1	1	+	1++111222	11+1	1	+
Oxalis acetosella			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Galium macrostis varia			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Hieracium sylvaticum			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Vaccinium myrtillus			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Valeriana tripteris			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Althvium filix-femina			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Ranunculus montanus			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Galium anisophyllum			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Anoda reptans			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Knapia dioicaefolia			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Sorbus aucuparia			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Veronica chamaedrys			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Deschampsia cespitosa			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Lysimachia nemorum			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Gentiana asclepiadea			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Sesleria varia			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Rosa pendulina			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Thelypteris limbosperma			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Gymnocarpium robertianum			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Agrostis stolonifera			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Melandrium rubrum			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Galium			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Rubus saxatilis			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Dactylorhiza maculata			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Silene vulgaris			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Centaurea montana			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Thelypteris phegopteris			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Carex flacca			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Cicerbita alpina			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Valeriana montana			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Sorbus chamaemespilus			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Rumex alpestris			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Primula elatior			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Aconitum napellus			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Ranunculus platanifolius			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Poa supina			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Agrostis tenuis			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Aquilegia atrata			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Heliosperma quadridentatum			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Scabiosa columbaria			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Abies alba			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Festuca ovina			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Achillea millefolium			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Poa hybrida			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Polygala alpestris			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Arabis pumila			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Parnassia palustris			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Salix appendiculata			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Origanum vulgare			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Poa pratensis			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Euphrasia picta			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Sedum album			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Leucorchis alba			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Veronica fruticans			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Taraxacum officinale			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Polygala amarella			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Dactylis glomerata			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Sagina saginoides			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Cystopteris montana			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Biscutella lasiocarpa			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Carex brachystachys			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Valeriana saxatilis			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Hieracium sphondylium elegans			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Anagallis sylvestris			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Arabis ciliata			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Juncus frigidus ssp. hostii			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Hieracium villosum			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Astrantia major			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Cirsium palustre			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Euphorbia cyperarissias			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Helianthemum nummularium			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Carex alba			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Pimpinella major			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Polypodium vulgare			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Laserpitium latifolium			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Sorbus aria			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Arabis alpina			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Carex firma			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Pedicularis recutita			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Calamintha clinopodium			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Cirsium oleraceum			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Lamium maculatum			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Gentiana aspera			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Carex pallescens			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Lycastrum mutellina			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Rhinanthus glacialis			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+
Carex ornithopoda			+	+	+	+	+	1++11++11++11	121	1	+

AUFNAHME-NUMMER	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W			
27344	3	122227	222	2222223	22333	7	122222222335777778	1477	223	2346				
51144	2	222488	222	9999990	22277	0	82224446884771788990	7601	267	5229				
28978	1	024840	567	2345890	91048	7	7017040639135867456	8594	850	7759				
Betula pendula														
Eupatorium cannabinum														
Epipactis atrorubens														
Calluna vulgaris														
Hieracium sp.														
Petasites paradoxus														
Adrostis rupestris														
Carex capillaris														
Epilobium alsinifolium														
Carex pilulifera														
Salamaerositis epigejos														
Potentilla brauneana														
Stellaria media														
Festuca rubicaprina	1													
Drvopteris villarii		1												
Luzula campestris agg.				+										
Botrychium lunaria					r									
Achillea atrata					+									
Cirsium spinosissimum					+									
Thesium pyrenaicum						r								
Alnus viridis							+							
Bartsia alpina							1							
Cynadenia conopsea							1							
Trifolium repens							+							
Briza media								+						
Ranunculus aconitifolius								1						
Primula auricula								+						
Crepis pyrenaica								1						
Hieracium bifidum (sp.)								+						
cf Chrysanthemum vulgare								1						
Orobanchae sp.								+						
Epilobium alpestre								r						
Carduus personata									+					
Linum catharticum										+				
Plantago major										+				
Atropa belladonna										+				
Equisetum arvense											+			
Lathyrus pratensis											+			
Cardaminopsis arenosa											+			
Hyoscyamus palustris											+			
Mentha longifolia											+			
Carex paniculata											+			
Bromus berekenii											+			
sonstige Thallophten:														
Plagiochila asplenoides		++++	+	+	11		+111++	1	1+		+1+211++1111+1+2+1	+1	311	+1+8
Hieracium scotum		++++	+	+	+		+	+	+		+	+	+	+
Hylocomium splendens		++++	+	+	1		+	+	+		+	+	+	+
Rhytidadiadelphus triquetrus		++++	+	+	1		+	+	+		+	+	+	+
Hylocomium punctatum		++++	+	+	1		+	+	+		+	+	+	+
Cladonia sp.		++++	+	+	+		+	+	+		+	+	+	+
Thuidium tamariscinum		++++	+	+	+		+	+	+		+	+	+	+
Brachythecium sp.	11	+	+		+++	1	+11		+		+	+	2	+
Plagiomnium rostratum		+	+		+		+	1	+		+	+	+	+
Brachythecium salebrosum (sp.)		+	+		1	++	2	+23			2	+	12	+
Hylocomium pyrenaicum	1	2			1	++	2	+23			2	+	12	+
Ulex europaeus		+	+		+		+	+			+	+	+	+
Peltigera praetextata		+	+		+		+	+			+	+	+	+
Capania sp.		+	+		+		+	+			+	+	+	+
Brachythecium velutinum (sp.)		+	+		+	2	+	1	+		+	+	+	+
Cladonia cf furcata		+	+		+	2	+	1	+		+	+	+	+
Pleurozium schreberi		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Calypogeia trichomanis		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Peltigera sp.		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Sanionia uncinata		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Bryum capillare agg.		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Ptychodium plicatum		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Tritomaria quincudentata		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Brachythecium rutabulum (sp.)		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Collema sp.		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Blepharostoma trichophyllum		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Rhodobryum roseum		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Tavoria serrata		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Plagiomnium affine s.str.		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Encalypta streptocarpa		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Microdonotium denudatum		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Peltigera leucophlebia		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Plagiothecium denticulatum/sp.		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Chiloscyphus pallescens		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Bryum sp.		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Barbilophozia sp. (hatcheri)		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Myrium marginatum (sp.)		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
cf Brachythecium glareosum		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Ditrichum flexicaule		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Bazzania trichomanis		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Plagiomnium cuspidatum		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Tetraphis pellucida		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Leucoclea muelleri		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Rhacomitrium canescens		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Rachia complanata (sp.)		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Dichodontium pellucidum		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Tetraphis islandica		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Marchantia polymorpha		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Bryum caespiticium (sp.)		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
cf Brachythecium reflexum		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Cirriophyllum reichenbachianum		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Cratoneuron commutatum		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Bryum pseudotriquetrum		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Pohlia wahlenbergii		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Cladonia cf digitata		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Solorina saccata		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Orthothecium rufescens		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Camptopogon schwarzii		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Cratoneuron filicinum		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Neesia uliginosa		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Cratoneuron commut. sulcatum		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Metzgeria pubescens		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Hydnium cupressiforme		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Tritomaria exsecta		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Isothecium alopecuroides		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Neckera crispata		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Mylia taylori		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Jundermannia leiantha		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Lepidozia reptans		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+
Hydrophyllum luridum		+	+		+	+	+	+			+	+	+	+

AUFNAHMENUMMER	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Eurhynchium cf. praelongum	23344	3	122227	222	2222223	22333	7	122222223335777778	1477	223	2346
Lophozia ventricosa	51144	2	922488	224	9999990	55277	0	8222446884771789990	7601	247	5329
cf. Brachythecium reflexum	28978	1	024840	567	2345890	91048	7	7017046039135867456	8594	850	7759
Tortula norvegica											
Rhizomnium magnifolium			+								
Heckera complanata					1						
Cladonia gracilis macroceras								1			
Cirriophyllum tenuinerve								+			
Brvum flaccidum											
Plagiothecium sp.											
Metzgeria coniuata											
Mnium stellare											
Lophocolea bidentata											
Brachythecium rivulare											
Scapania cuspiduligera											
											+
											1
AUFNAHMENUMMER	23344	3	122227	222	2222223	22333	7	122222223335777778	1477	223	2346
	51144	2	922488	224	9999990	55277	0	8222446884771789990	7601	247	5329
	28978	1	024840	567	2345890	91048	7	7017046039135867456	8594	850	7759

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN

TABELLE 6: AHORN-BUCHENWALD (Aceri-Fagetum)

Reine Luzula sylvatica-Ausbildung
Luzula sylvatica-Ausbildung mit Calamagrostis villosa
C Reine Ausbildung
D Sanicula-Ausbildung mit Stellaria nemorum
E Sanicula-Ausbildung mit Stellaria nemorum, beweidet
F Sanicula-Ausbildung mit Calamagrostis varia

	A	B	C	D	E	F
AUFNAHMENUMMER	111228 13 566050 77 745939 72	1111178 4567890 0909038	0111111 733455 1 149156 8	1 1566801 7825930		
AUFNAHMEMONAT	JJJJJA JS UUUUUJ UF LLLLLG LP	JJJJJAA UUUUUUU NLLLLGG	JJJJJJ UUUUUU NNNNL	J JJJAASA UUUUUU M NLLGGG		
AUFNAHMEFLÄCHE (QM)	1 1211 11 020050 50 050000 00	2111122 0555500 0000000	411221 1 055000 0 000000 0	1 1213111 0 0050000 0 0000000		
MEERESHOEHE (10 M)	111111 11 233342 23 131488 83	1111111 1223332 1471209	111111 1 011011 0 674789 7	1 1111111 0 0231132 7 8304796		
EXPOSITION (GRAD)	5 8442 3 0-0000 00	22 9875439 0550000 0	2 11 005000 0	3333 5 8470004 0050000		
HANGNEIGUNG (GRAD)	4 3363 23 000500 05	3332223 0505500 0	333233 005050 5	2233443 5 0005003		
ARTENZAHL	777778 76 351960 18	4555757 3979640	794866 755416 7	7 8877666 7253392		
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	721137 11 000500 00	1551216 0000000	866134 2 000500 0	2 8415328 0005000		
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)	1231 21 +0000+ 00	1 +5 0	1 0 00	1 000000		
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	121 0005+ 50	2 1 05+++ +	1 <21 0+500 0	2 13 505+++		
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	357467 89 000000 00	7467588 5000000	363484 7 000050 0	3333376 0005000		
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	233332 12 000005 00	3333472 0000000	4244 1 4 000050 0	3451311 0000550		

Baumarten

Picea abies	B1	23	79.3	221224	1 +	2+13	2 22	2 3+2213
Picea abies	B2	14	48.3	1+ +	11	+2	1	15312
Picea abies	S	20	69.0	21 1+ +	21	+2	1+1211	2 1+ +
Picea abies	S	7	26.1	+++				r +
Acer pseudoplatanus	B1	17	58.6	1+1 +	123 2	1	5 +++	+ 22 2
Acer pseudoplatanus	B2	9	31.0	+123+				+ 1
Acer pseudoplatanus	K	24	82.8	12				
Fagus sylvatica	B1	22	75.9	311 + +	1+ 133 1 2	43 33	11+ +1 +	21111 +
Fagus sylvatica	B2	16	20.7	31 + 2			++	32+41 2
Fagus sylvatica	K	12	41.4	++ +			1 + +	+ 2
Sorbus aucuparia	S	13	10.3	++ +			1 + +1	+ + +
Sorbus aucuparia	S	11	37.9	+++ +				
Fraxinus excelsior	B1	1	5.4		1			rr+ +
Fraxinus excelsior	S	5	17.6				+ +1	++
Fraxinus excelsior	S	1	20.7					
Larix decidua	B1	6	20.7	r 1 +2			++ +	+ 1
Larix decidua	S	1	3.4					
Larix decidua	K	1	3.4					
Abies alba	B1	1	3.4					
Abies alba	S	3	10.3				1 +	

Straucharten

Rubus idaeus		12	41.4	+r1 + +			1	++ ++
Lonicera alpeana	S	12	24.1	+r1 + +				r+
Lonicera alpeana	S	4	12.8					
Rosa pendulina	K	10	10.3	++ 1				r +
Rosa pendulina	K	3	10.3	++ +				
Daphne mezereum	S	27	27.6	++ +				++ r +
Lonicera nidra	S	10	10.3	++ 1				
Lonicera nidra	K	13	13.8					r +
Clematis alpina	K	4	4.9	+r +				
Ribes alpina	S	6	6.9					
Sambucus racemosa	S	1	3.4					
Salix appendiculata	K	1	3.4					
Salix appendiculata	K	1	3.4					

		A		B		C		D		E		F	
AUFNAHMENUMMER		111228	13	1111178	011111	1	1112275	745959	72	4567890	733455	1	1858801
Diff.Ass.:		745959	72	0909038	149156	8	7825930						
O.K	Acer pseudoplatanus	28	96.6	1123+1	2+	123++21	51++11	+					2112212
O.K	Polystichum lobatum	28	86.2	11+1+	+	133++	+						11+11+
V	Fagus sylvatica	25	86.2	331+	2+	133+1	+						32361 2
O.K	Cystopteris fragilis	23	79.3	r++1+		111+1	+1r++						+ 1111+
	Ranunculus lanuginosus	7	24.1			+11	+1						r 1
	Saxifraga rotundifolia	27	93.1	+1122	21	+121 22	11 221 1						1121221
	Mosotis sylvatica	27	86.2	+112+	+	23221+	1+1211						+11 1+
	Adenostyles albariae	23	82.8	12232	3+	12232	1						1+11 +
O.K	Dentaria enneaphyllos	23	79.3	+11+1	1	+11++	22+r+						+r+r+
O.K	Aconitum vulparia	12	41.4	1 +	+	+	+						++ +1
	Gem. rivale	9	31.0	1 +	+	+++	+						+
	Crepis paludosa	6	27.6	11 +1			+						1
	Doronicum austriacum	5	17.2			1							
O.K	Viola biflora	29	100.0	121122	+1	1121211	+1++22	2					1111221
	Gymnocarpium drovopteris	18	62.1	1+2+1+	+	+	+						1+1 r
	Drovpteris austriaca s.str.	12	41.4	r++	+	+	+						++ +
Diff.Ausb.:													
	Hypericum maculatum	21	72.4	+1+1+	+2	+ 1+	+++	1					r++ ++
	Geranium silvaticum	16	55.2	+1 +++	1+	+	+						++
	Luzula sylvatica s.l.	10	34.6	2+r22	2		r						+
	Polytrichum formosum	9	31.0	1+++			1						+
	Homogyne alpina	8	27.6	+1+11	++								
	Knautia dipacifolia	7	24.1	+1+1	+1								
	Vaccinium myrtillus	6	20.7	+21 1	++								
	Coeloclossum viride	4	13.8	+			+						
	Agrostis alpina	4	13.8	+									+
	Soldanella alpina	2	6.9	+									
	Calamagrostis varia	21	72.4	2112++	+2	+	++	++	+				+11212
V	Ranunculus nemorosus	15	51.7	+11++	+	++	1	+					r++
O.K	Veronica urticifolia	15	51.7	+rr++1									rr 1++
	Melica nutans	14	44.8	1 +		+	r	+					++++
	Aster bellidiastrium	13	44.8	1 +		+	r	+					++
	Gymnocarpium robertianum	12	41.4	1 +		+	r	+					12+
	Larix decidua	11	41.4	11 +		+							+1+
	Carex ferruginea	8	27.6	12	+2								+1+
	Sesleria varia	5	17.2	++ 1									++
	Calamagrostis villosa	2	6.9			14							
O.K	Stellaria nemorum	16	55.2	+	2	2321212	11 111 1						+2
O.K	Chrysosplenium alternifolium	13	44.8	+		1+rr1+	1 +						+
O.K	Impatiens noli-tangere	11	37.9	+		2++	1 +						+
	Urtica dioica	11	37.9	+		21r 1	+11 1						r+
O.K	Poa trivialis	9	31.0	+		+++	+						+
	Circaea intermedia	7	24.1	+		+1+	+						r++
O.K	Melandrium rubrum	6	20.7	+		+							+
O.K	Cirriophyllum piliferum	6	20.7	1		1+ +							r +
	Adoxa moschatellina	6	20.7	+		r +	r						+
	Cardamine amara	5	17.2	++2+									+
O.K	Mercurialis perennis	19	65.5	++ +	1+	+	11r111						+ 1112+3
O.K	Plagiomnium undulatum	13	44.8	+	1+	+	+						+ 1 +
O.K	Adenostyles glabra	9	31.0	+		+	11++	+					+ 221
O.K	Sanicula europaea	9	31.0	+		+	+12						1 +++
O.K	Selvia glutinosa	8	27.6	+		+	+11 2						+
O.K	Eurhynchium striatum	8	20.7	+		1	+						+
O.K	Listera ovata	7	17.2	r +									r
O.K	Origanum vulgare	7	17.2	+		+							+
O.K	Brachypodium silvaticum	7	17.2	+		+	11 +						2
	Viola riviniana + reichenb.	3	10.3	+			+						+
Blockschuttbesiedler													
Kormophyten:													
	Moerhousia muscosa	25	86.2	++111+	+	+++ 1 +	1+21+1	1					21112+
	Asplenium viride	20	69.0	++1++		++1 +	++r 1						1++++
	Polystichum lonchitis	17	58.6	++1+		+	+1 r						++++
	Campanula cochlearifolia	10	34.6	+	1 +		1 +						111
	Asplenium trichomanes	11	37.9	+		+	++r						1+++
	Lonicera nigra	10	30.7	+	1		+						r++
	Hypericella selado	9	20.7	+		+	+						r
	Clematis alpina	4	13.8	+	+								+
	Polypodium vulgare	4	13.8				++						++
Thallophyten:													
	Ctenidium molluscum	29	100.0	221222	1 =	1112212	2+3211	2					2332311
	Tortella tortuosa	24	82.8	1111+1	+	11 +1+1	1 +1+	1					11+11
	Rhynchostegium murale	15	51.7	+	11+	+1+1+	+						+11
	Mnium thomsoni	13	44.8	+	11+	+	+						11 +1
	Schistidium apocarpum	13	44.8	+	+	1	+						11 +1+
	Fissidens cristatus	12	41.4	+	+	+	1 +						2 +
	Scapania aequiloba	12	41.4	+	+	+	+						11+
	Pseudoleskea incurvata	10	27.6	+	11+	+	+						+
	Scapania aspera	4	13.8	11 +		+	+						+ 1
	Campylium halleri	3	10.3	+		+							+
	Trentepohlia aurea	3	10.3	+			1						+
Schlaapflanzen													
O.K	Senecio fuchsii	29	100.0	+12221	21	2222221	121222	2					+1+1+2+
	Epilobium montanum	25	86.2	++11+	+	+++++	++++r						r++11+
	Myosotis muralis	24	82.8	++1+	+	+++++	++++r						11+
O.K	Cardamine flexuosa	24	82.8	++1+	+	11111	1r1+						r+++
	Geranium robertianum	23	79.3	++1+	+	1+1+	+1211						11+12+
	Fraxina vesca	17	58.6	++1+	+	+++++	+						+
	Poa nemoralis	17	58.6	1++	+	+++++	+						+1+
	Rubus idaeus	12	41.4	+1+	+	+	+						++ ++
	Tussilago farfara	3	10.3	+			2						
Weidezeiger													
	Alchemilla vulgaris	7	24.1	r+		r +	r +	1					3
	Rhytidiadelphus squarrosus	7	17.2	+	2	r + 2+							+
	Leontodon hispidus	7	10.3	+			r						+
	Ranunculus repens	1	3.4			1 +							+
	Ranunculus acris	1	3.4										+
	Stellaria media	1	3.4										+
	Achillea millefolium	1	3.4										+
	Anthoxanthum odoratum	1	3.4										+

		A	B	C	D	E	F
111228 13 1111178 011111 1 1112278							
566120 77 4567890 733455 1 1568801							
745939 72 0909038 149156 8 7825930							
V	Verb.Char.:						
Petasites albus	14 48.3		2 Z1	1 22	+12	+1	+31
Prenanthes purpurea	10 39.2				+++		
Helleborus niger	1 3.4	+ r	+				
O,K	Ord. u. Klass.Char.:						
Lamium galeobdolon	27 93.1	+1+11	+	1+1+12	12111+	+211++2+	
Ornithoglossum filix-mas	27 93.1	+1+1	+	1	11+r	111+112	
Paris quadrifolia	21 72.4	+++ r+		+++	+++ r+	+++ r+	
Apospseris foetida	15 51.7	1r+11	+1	1+	1 r	1 +1+	
Fraxinus excelsior	12 41.4	r			+++	+++ r+	
Polygonastrum verticillatum	12 41.4					+++ r+	
Lonicera alpigena	11 37.9	+++		r	+	+	r+
Phytolacca spicata	10 24.5	+++		+			1r+
Daphne mezereum	8 20.7		+				++
Carex digitata	8 27.6	r		+			rr+
Carex sylvatica	6 20.7					1	
Thalictrum aquilegifolium	4 13.8	r r	+				
Actaea spicata	4 13.8					r	
Anemone nemorosa	4 13.8		1				+
Scrophularia nodosa	4 13.8			++			+
Lilium martagon	4 13.8			rr			+
Hepatica nobilis	10 3.3	1 +					
Streptopus amplexifolius	10 3.3				1		
Campanula trachelium	10 3.3	r	+				+
Aruncus dioicus	10 3.3						+
Ribes alpinum	6 6.9					++	r
Galium odoratum	6 6.9		1				
Atrichum undulatum	6 6.9			1			
Nothofragaria trinevria	6 6.9						
Neottia nidus-avis	6 6.9	r			+		r
Geum urbanum	6 6.9						
Aquopyron caninum	1 3.4						1
sonstige Kormophyten:							
Oxalis acetosella	29 100.0	111+11	++	++1+1+1	122111	1	1221121
Athyrium filix-femina	28 96.6	++1++2	1+	+++1+22	2 +211	1	111+111
Picea abies	22 75.6	221294	12	21 2+22	2+2211	5	3532213
Chaerophyllum hirsutum	22 75.6	++ 21	11	11+121	11 ++		++ 12
Lysimachia nemorum	20 69.0	+1+ 1	21	+11 +	+11 +		+ 1 12
Solidago virgaurea	19 65.2	+++ 1		++ r	1 ++		r++++1+
Campanula scheuchzeri	19 65.2	+++ 1		++ r	1 ++		r++++1+
Veronica chamaedrys	14 48.3		1	++	++	1 + 1	r +
Sorbus aucuparia	13 44.8	+++ +			++		r++
Ajuga reptans	13 44.8	+++ +			++	1	++
Valeriana tripteris	13 44.8	+1 1	++		++		++
Rosa pendulina	10 34.5	+1 1			++		r++
Galium album	8 27.6	+1 1			++		r++
Hieracium sylvaticum	8 27.6	+1 1			++		r++
Luzula luzulina	8 27.6	+1 1			++		r++
Arabis alpina	7 24.1	+ 2	1	11	1		+11
Thelypteris phegopteris	7 24.1	+ 1					+
Galium anisophyllum	7 24.1	+ 1					+
Rumex alpestris	7 24.1				1+		+
Cicerbita alpina	7 24.1				1		+
Poa pratensis	7 24.1				1		+
Gentiana asclepiadea	6 20.7	++	+				+
Ranunculus montanus	6 20.7	++	+				+
Gentiana montana	17 2.2	r	+		++		+
Rubus saxatilis	17 2.2	r	+				+
Abies alba	17 2.2	r	+			1	+
Aconitum napellus	4 13.8	r	+				+
Maianthemum bifolium	4 13.8	r	+				+
Poa alpina	4 13.8	r	+				+
Silene vulgaris	10 3.3						+
Ranunculus platentifolius	10 3.3				1		+
Lamium maculatum	10 3.3				1		+
Eupatorium cannabinum	10 3.3				1		+
Ranunculus aconitifolius	10 3.3				1		+
Arabis ciliata	6 6.9						+
Astrantia maior	6 6.9						+
Phytolacca orbiculata	6 6.9						+
Senecio abrotanifolius	6 6.9						+
Poa hybrida	6 6.9						+
Deschampsia caespitosa	6 6.9						+
Angelica sylvestris	6 6.9						+
Thelypteris limbosperma	6 6.9						+
Agrostis stolonifera	6 6.9						+
Festuca rubra	6 6.9						+
Veratrum album	6 6.9						+
Heracleum sphondylium elegans	6 6.9						+
Sambucus racemosa	6 6.9						+
Salix appendiculata	6 6.9						+
Vicia sepium	6 6.9						+
Carex brachystachys	6 6.9						+
Primula elatior	6 6.9						+
Calamintha alpina	1 3.4						+
Cirsium palustre	1 3.4						+
Loxia alpina	1 3.4						+
Trollius europaeus	1 3.4						+
Alchemilla hoppeana	1 3.4						+
Helianthemum sylvaticum	1 3.4						+
Pimpinella maior	1 3.4						+
Silene nutans	1 3.4						+
Festuca pratensis	1 3.4						+
Galeopsis speciosa	1 3.4						+
Taraxacum officinale	1 3.4						+
Poa supina	1 3.4						+
Rumex alpinus	1 3.4						+
Dactylorhiza maculata	1 3.4						+
Luzula pilosa	1 3.4						+
Sedum album	1 3.4						+
Pvrolia uniflora	1 3.4						+
Scabiosa columbaria	1 3.4						+
Coraliorhiza trifida	1 3.4						+
Carex alba	1 3.4						+
Cirsium oleraceum	1 3.4						+
Pvrolia cf rotundifolia	1 3.4						+

	A	B	C	D	E	F
AUFNAHMENUMMER	111228	13	1111178	011111	1	1112278
	566120	77	4567890	733455	1	1568801
	745939	72	0909038	149156	8	7825930
sonstige Thallophyten:						
Hylocomium splendens	22	75.9	+1111+	+1	1	+11+2+
Plagiochila asplenoides	22	72.4	+1+	+1	1++21	1 1++
Dicranum scoparium	22	68.0	+111+	+	++	1 1 1++
Rhizomium punctatum	18	62.1	+	++	1+	++
Conocephalum conicum	15	51.7	+	+	+1+1	1
Rhytidiadelphus triquetrus	13	44.8	+	1+	++	++
Thuidium tamariscinum	11	37.9	+	+	++	++
Brachythecium sp.	10	34.5	+	1	2312	1
Cladonia sp.	9	34.0	++	+	+	++
Placomium rostratum	9	24.1	++	++	+	++
Rhytidiadelphus loreus	7	17.2	+	+	++	+
Barbilophozia barbata	7	17.2	+	+	++	+
Ptychodium plicatum	7	17.2	+	+	++	+
Sanionia uncinata	7	17.2	+	+	++	+
Peltigera sp.	7	17.2	+	+	++	+
Brachythecium velutinum (sp.)	7	17.2	+	+	++	+
Plagiothecium denticulatum/sp.	7	17.2	+	+	++	+
Brachythecium salebrosum (sp.)	7	17.2	+	+	++	+
Brachythecium starkoi (sp.)	7	17.2	+	+	++	+
Scapania sp.	7	17.2	+	+	++	+
Peltigera leucophlebia	7	17.2	+	+	++	+
Tritomania quinqueidentata	7	17.2	+	+	++	+
Hypnum cupressiforme	7	17.2	+	+	++	+
cf Brachythecium clareosum	7	17.2	+	+	++	+
Cladonia pyxidata (sp.)	7	17.2	+	+	++	+
Dichodontium pellucidum	7	17.2	+	+	++	+
Calypogeia trichomanis	7	17.2	+	+	++	+
Hypnum callichroum	7	17.2	+	+	++	+
Brachythecium rutabulum (sp.)	7	17.2	+	+	++	+
Peltigera praetextata	7	17.2	+	+	++	+
Metzgeria furcata	7	17.2	+	+	++	+
Blepharostoma trichophyllum	7	17.2	+	+	++	+
Cirriophyllum tenuinerve	7	17.2	+	+	++	+
Pseudoleskeella catenulata	7	17.2	+	+	++	+
Bryum caespitium (sp.)	7	17.2	+	+	++	+
Mnium stellare	7	17.2	+	+	++	+
Chiloscyphus pallescens	7	17.2	+	+	++	+
Mnium marginatum (sp.)	7	17.2	+	+	++	+
Cephalozia bicuspidata	7	17.2	+	+	++	+
Pleurozium schreberi	7	17.2	+	+	++	+
Lophozia ventricosa	7	17.2	+	+	++	+
Pellia endiviasfolia	7	17.2	+	+	++	+
Campylium stellatum	7	17.2	+	+	++	+
Cirriophyllum reichenbachianum	7	17.2	+	+	++	+
Eurhynchium schleicheri	7	17.2	+	+	++	+
Placomium elatum	7	17.2	+	+	++	+
Bryum sp.	7	17.2	+	+	++	+
Ditrichum flexicaule	7	17.2	+	+	++	+
Encalypta streptocarpa	7	17.2	+	+	++	+
Fissidens taxifolius	7	17.2	+	+	++	+
Plagiothecium sp.	7	17.2	+	+	++	+

AUFNAHMENUMMER	111228	13	1111178	011111	1	1112278
	566120	77	4567890	733455	1	1568801
	745939	72	0909038	149156	8	7825930

C Waldgeissbart-Bergahornwald (Arunco-Aceretum)

D	Schluchtwald	i.allq.,	Reine Ausbildung
E	Schluchtwald	i.allq.,	Tannen-Ausbildung
F	Schluchtwald	i.allq.,	Galium odoratum-Ausbildung

G	Ahorn-Eschenwald	i.e.S.,	Reine Eschen-Ausbildung
H	Ahorn-Eschenwald	i.e.S.,	Eschen-Ausbildung, beweidet
I	Ahorn-Eschenwald	i.e.S.,	Reine Ausbildung
J	Ahorn-Eschenwald	i.e.S.,	Reine Ausbildung, beweidet

Baumarten[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AUFNAHME-NUMMER	68	555588	0000	466677778	44488	7777888	5568	3	1133578	1334478
	11	7888		5333336	22688	3333336	8995	3	4418751	1012748
	78	239519	9012	901204562	68301	5123782	1038	5	6854371	7163918
Sorbus aucuparia	B	4	7.7							
Sorbus aucuparia		6	7.7							
Sorbus aucuparia		6	7.7							
Alnus incana		1	12.4	+						
Alnus incana		1	12.4	+						
Alnus incana		1	12.4	+						
Alnus incana		1	12.4	+						
Sorbus aria		1	1.9							
Sorbus aria		1	1.9							
Acer platanoides		1	3.8							
Acer platanoides		1	3.8							
Acer platanoides		1	3.8							
Tilia platyphyllos		1	1.9							
Tilia platyphyllos		1	1.9							
Larix decidua		1	1.9							
Larix decidua		1	1.9							
Prunus baccata		1	1.9							
Prunus avium		1	1.9							
Straucharten										
Daphne mezereum		16	30.8							
Lonicera alpicena		16	19.2							
Lonicera alpicena		16	19.2							
Rubus idaeus		16	26.9							
Corvulus avellana		16	17.3							
Corvulus avellana		16	17.3							
Rosa pendulina		16	11.5							
Rosa pendulina		16	11.5							
Rubus fruticosus		16	15.6							
Lonicera nigra		16	9.6							
Lonicera nigra		16	9.6							
Lonicera xylosteum		16	3.8							
Lonicera xylosteum		16	3.8							
Salix appendiculata		16	1.9							
Salix appendiculata		16	1.9							
Viburnum opulus		16	1.9							
Viburnum opulus		16	1.9							
Sambucus racemosa		16	1.9							
Sambucus racemosa		16	1.9							
Clematis vitalba		16	1.9							
Humulus lupulus		16	1.9							
Hedera helix		16	1.9							
Ribes alpinum		16	1.9							
Rosa canina		16	1.9							
Sambucus nigra		16	1.9							
Berberis vulgaris		16	1.9							
Crataegus monogyna		16	1.9							
Fraxinus alnus		16	1.9							
Juniperus communis		16	1.9							
Differentialarten										
Acer pseudoplatanus	43	82.7	23	1+2534	1332	11+11+34+	++1+	1+121	+353	5
Fraxinus excelsior	30	57.7	33	1+1r 2	11+1	+++ +11	++	1+122	331	5
Aruncus dioicus	19	36.5		++r +	2312	+++ +12	1+			
Ulmus glabra	18	34.6	4+	4 +	121+	1 +	++			
Lonicera alpicena	15	28.8		+	+	++	++			
Anemone sylvestris	12	23.1	+	1 +	+	++	++			
Aconitum vulparia	19	36.5		++ 11+11+	211	+	1+			
Gemmaria trachelium	13	25.0		++ 21+	1	+	++			
Gymnocarpium robertianum	10	19.2		++ 1	+	+	++			
Corvulus avellana	10	19.2		++ 1	+	+	++			
Lilium martagon	9	17.5		2 1	++	+1 22				
Carex alba	8	15.4		2+	+1122					
Lunaria rediviva	8	15.4		+	1+	+				
Aconitum napellus	5	9.6		1 +r	1 1					
Phyllitis scolopendrium										
Petasites albus	27	51.9		1	1 11 4	222+	+3234	113 223	3	142 + 2 1
Fagus sylvatica	29	55.8		+	r 1	5334	3344	4444	1	+
Alnus spicata	18	34.6		+	1 +	11 11	++	++	1	+
Polystichum lobatum	18	34.6		+	1 +	11 11	++	++	1	+
Festuca altissima	15	9.6								
Primula elatior	16	30.8								
Aegopodium podagraria	16	23.1								
Epibium notatum	12	19.2								
Symphytum tuberosum nodosum	17	13.5								
Polygona multiflorum	10	9.6								
Acer platanoides	10	9.6								
Abies alba	13	25.0								
Centaurea montana	3	5.8								
Pyrola secunda										
Elymus europaeus	8	15.4								
Galium odoratum	7	13.5								
Bromus benekeii	7	13.5								
Chaerophyllum hirsutum	27	51.9								
Urtica dioica	22	42.3								
Brachythecium rutabulum (sp.)	10	36.5								
Epibium notatum	12	19.2								
Conocephalum conicum	17	32.7								
Saxifraga rotundifolia	15	28.8								
Calluna nemorum	10	19.2								
Circaea intermedia	10	19.2								
Mvosotis sylvatica	9	17.3								
Cystopteris fragilis	5	9.6								
Trichocloa tomentella	2									
Impatiens noli-tangere	24	46.2	2		2	+1r	1	+	+	
Chrysosplenium alternifolium	21	40.4			++	++				
Carex sylvatica	21	40.4			1	+				
Stachys sylvatica	19	36.5								
Cardamine flexuosa	17	32.7			1	+				
Carrhiphyllum piliferum	17	32.7			+	+				
Festuca gigantea	16	32.1			+	+				
Galium album	11	21.2			+	+				
Dactylorhiza maculata	11	21.2			+	+				
Geum urbanum	10	19.2			+	+				
Galeopsis speciosa	11	19.2			+	+				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AUFNAHMENUMMER	88	555588	0000	466677779	44488	7777888	5568	3	1133578	1334478
	11	555611	7888	533304441	25666	2333336	8995	9	4418753	4001974
	78	239519	9012	901204562	68501	3123782	1038	5	6854371	7163918
Cirsium oleraceum	10	19.2						1	1 1 1 1+	
Mentha longifolia		17.3						+	+	+ 1 1 3
Cirsium arvense	8	7.7						+	+	+ 1 1
Stellaria media								+	+	+
O,K Alnus incana	10	19.2		1				1	44 2 5	+ +3+
Blockschuttbesiedler										
Kormophyten:										
O,K Lamium galeobdolon	29	55.8	11	122221	+122	2 2+	+21+	1+11+1	+	1 2
O,K Prunella sp.	29	55.8		++	1+1	+++ 11+	+1+1	2+ 1+	+	
O,K Calamagrostis varia	29	50.0		+4+1	+	111333	22++	1+1+121	+	2
Polygonatum verticillatum	2265	48.1		++	11	+1r	+	+++++	r+r	
Solidago verbenacina	2265	48.1		++	1	1+1+	1	1+1+	+	
O,K Veronica urticifolia	2265	44.2		++	+	1+1+	+	+++++		
O,K Paris quadrifolia	17	32.7		++	+	1	+	+++++		
O,K Valeriana tripteris	17	32.7		++	+	1	+	+++++		
O,K Dentaria enneaphyllos	16	30.8		++	1111	+++11	+	1+r	+	
O,K Moehringia muscosa	15	28.6		++	1+	+	+	+	+	
O,K Phyteuma spicatum	10	26.9		++	11	+	+	1+1+	+	
Aster bellidioides	10	19.2		++	11	+	+	1+1+	+	
O,K Asplenium viride	10	19.2		++	11	+	+	1+1+	+	
Hieracium sylvaticum	6	17.2		++	+	+	+	1+1+	+	
Campanula cochlearifolia	6	11.5		++	+	+	+	1+1+	+	
O,K Polystichum lonchitis	6	11.5		rr	r					++
Lonicera nigra	5	9.6				1++	1			
Thallophyten:										
O,K Ctenidium molluscum	32	61.5	2	12+1	1	+	+	112221+22	2+2+	111212
O,K Fissidens cristatus	25	48.1		++	++	+	+	111+11	1+1	1+
Rhynchostegium murale	20	38.5		++	++	+	+	111+11	1+	1+
Bryozonium punctatum	19	36.6		++	++	+	+	111+11	1+	1+
O,K Tortella torquata	19	36.6		++	++	+	+	111+11	1+	1+
O,K Hylacomium splendens	16	30.8		++	++	+	+	111+11	1+	1+
Schistidium apocarpum	13	22.0		++	++	+	+	111+11	1+	1+
O,K Dicranum scoparium	10	19.2		++	++	+	+	111+11	1+	1+
O,K Scapania aspera	10	19.2		++	++	+	+	111+11	1+	1+
O,K Mnium thomsonii	10	19.2		++	++	+	+	111+11	1+	1+
O,K Scapania esculenta	10	19.2		++	++	+	+	111+11	1+	1+
O,K Metzgeria conopsea	6	11.5		++	++	+	+	111+11	1+	1+
O,K Campylium stellatum	6	11.5		++	++	+	+	111+11	1+	1+
O,K Isoetes macrospora	6	11.5		++	++	+	+	111+11	1+	1+
O,K Cirriophyllum tenuinerve	6	11.5		++	++	+	+	111+11	1+	1+
O,K Cladonia pyxidata (sp.)	6	11.5		++	++	+	+	111+11	1+	1+
O,K Pelicla praetextata	6	11.5		++	++	+	+	111+11	1+	1+
O,K Neckera crispa	6	11.5		++	++	+	+	111+11	1+	1+
Weidezeiger										
O,K Veronica chamaedrvs	17	32.7		+	r			+	1	1 r+ 1++
O,K Ranunculus repens	8	15.4								++1++
O,K Baccharis clonensis	8	15.4								++1++
O,K Agrostis stolonifera	8	15.4								++1++
O,K Melandrium rubrum	6	11.5								++1++
O,K Poa trivialis	6	11.5								++1++
O,K Deschampsia caespitosa	6	11.5								++1++
O,K Alchemilla vulgaris	6	11.5								++1++
O,K Lussidao farfara	6	11.5								++1++
O,K Rhytidadelphus squarrosus	6	11.5								++1++
O,K Prunella vulgaris	6	11.5								++1++
O,K Achillea millefolium	6	11.5								++1++
O,K Taraxacum officinale	6	11.5								++1++
V Verb.Char.:										
O,K Tilia platyphyllos	3	5.8	+	+	+					
Ord. u. Klass.Char.:										
O,K Plagiomnium undulatum	46	86.5	12	1212+1	++	1++++++	+11+1	+++11	112+	1 2321+21 211 261
O,K Salvia glabra	46	86.5		++	1221	1+1	1+1	112221	1+1	232 1+1 232
O,K Mercurialis perennis	335	67.3	2	11+13	1+1	112111122	1122	1122212	++2	
O,K Sanicula europaea	335	67.3		++	2r	112111122	211+2	2232+22	++	11 +++
O,K Dryopteris filix-mas	335	67.3		++	21	111	2111	2232+22	++	14++
O,K Brachypodium sylvaticum	268	55.1	1	1211+		11	22+	2 22+21	++	2 1123
O,K Geranium robertianum	268	55.1	1	1211+	1	1	1	2 22+21	++	2 111 12
O,K Euphrasium striatum	268	55.1	1	1211+	1	1	1	2 22+21	++	2 111 12
O,K Lysichiton obscurus	268	55.1	1	1211+	1	1	1	2 22+21	++	2 111 12
O,K Daphne mezereum	106	50.0		++	1	1111	1	1	1	++1++
O,K Helica nutans	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Gymnocarpium dryopteris	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Scrophularia nodosa	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Carex digitata	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Onoclea lylosteum	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Listera ovata	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Circaea lutetiana	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Epipactis helleborine	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Thalictrum aquilegifolium	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Anemone nemorosa	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Neottia nidus-avis	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Atrichum undulatum	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Moehringia trinervia	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Viburnum opulus	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Ranunculus lanuginosus	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Cypripedium calceolus	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Euphorbia amygdaloides	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Leucopium vernum	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Cephalanthera rubra (sp.)	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Clematis hederacea	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Clematis vitalba	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Corvallis cava	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Ribes alpinum	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Helleborus niger	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Taxus baccata	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Hypericum montanum	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Luzula luzuloides	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Galium rotundifolium	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Veronica montana	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Adoxa moschatellina	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Milium effusum	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Rosa canina	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Streptopus amplexifolius	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++
O,K Prunus avium	106	50.0		++	1	1	1	1	1	++1++

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AUFNAHMENUMMER	88	555588	0000	466677778	44488	7777888	5568	3	1133578	1334478
	11	555611	7888	533304441	25666	2333336	8995	9	4418753	4001974
	78	23519	9012	901204562	68501	5123782	1038	5	6854571	7163918
Berberis vulgaris	1	1	9							
Crataegus monogyna										
Cephalanthera longifolia	1	1	9							
Cardamine trifolia	1	1	9							
sonstige Kormophyten:										
Senecio fuchsii	43	82.7		1+++	11+2	+	1+1+	++11+1+	++2	1+3+1+
Picea abies	69	80.8		111+1	21+1	21+123	1	11+3+	++11+1+	331242
Oxalis acetosella	70	79.7		1	112+1	+	++21+1+1	11112	3	2
Lysimachia nemorosum	71	79.7		+	12+	1	+	11112	++2	1
Athyrum filix-femina	72	79.7		+	12+	1	+	11112	++2	1
Myricella muralis	73	79.7		1+++	1+++	++1	++1	++1	++1	++1
Adenostyles diandra	74	79.7		1+++	1+++	++1	++1	++1	++1	++1
Viola riviniana + reichenb.	75	79.7		1+	11+12	+	1+	11+1+	++1	++1
Fraxinea vesca	76	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Gentiana asclepiadea	77	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Viola biflora	78	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Eupatorium cannabinum	79	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Knautia dipscifolia	80	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Aluga reptans	81	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Sorbus aucuparia	82	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Rosa pendulina	83	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Sorbus aria	84	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Calamintha clinopodium	85	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Thymus palustris	86	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Origanum vulgare	87	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Ranunculus nemorosus	88	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Lamium maculatum	89	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Thelypteris pheopteris	90	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Cicerbita alpina	91	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Rubus saxatilis	92	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Dryopteris austriaca s.str.	93	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Carex flacca	94	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Luzula sylvatica s.l.	95	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Thelypteris limbosperma	96	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Heracleum sphondylium elegans	97	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Anthemum bifolium	98	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Sesleria varia	99	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Larix decidua	100	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Galeopsis tetrahit	101	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Poa supina	102	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Adenostyles alliariae	103	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Crepis paludosa	104	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Vaccinium myrtillus	105	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Geranium sylvaticum	106	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Heracleum sphondylium	107	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Vincetoxicum hirsutidaria	108	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Campanula scheuchzeri	109	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Salix appendiculata	110	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Buphthalmum salicifolium	111	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Carex brachystachys	112	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Cystopteris montana	113	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Arabis alpina	114	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Poa pratensis	115	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Astragalus major	116	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Poa nemoralis	117	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Hypericum maculatum	118	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Silene vulgaris	119	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Rumex obtusifolius	120	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Equisetum arvense	121	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Laserpitium latifolium	122	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Polypodium vulgare	123	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Ranunculus platentifolius	124	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Sambucus racemosa	125	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Poa annua	126	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Crucifera laevipes	127	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Potentilla reptans	128	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Cirsium palustre	129	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Geum rivale	130	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Veratrum album	131	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Vicia sepium	132	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Agrostis gigantea	133	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Lathyrus pratensis	134	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Cerastium fontanum s.l.	135	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Pimpinella major	136	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Arctium nemorosum	137	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Galium anisophyllum	138	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Valeriana saxatilis	139	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Festuca rubra	140	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Kernera saxatilis	141	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Carex ferruginea	142	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Carduus personata	143	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Epipactis atrorubens	144	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Heracleum austriacum	145	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Asplenium ruta-muraria	146	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Aquilegia atrata	147	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Stachys alpestris	148	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Carduus defloratus	149	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Erica herbacea	150	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Phyteuma orbiculare	151	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Molinia arundinacea	152	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Orobancha sp.	153	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Heliosperma quadridentatum	154	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Tofieldia caliculata	155	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Luzula luzulina	156	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Asplenium trichomanes	157	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Atropa belladonna	158	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Luzula pilosa	159	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Sambucus nigra	160	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Carex flava	161	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Fraxinea alnus	162	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Centaurea jacea	163	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Brachypodium pinnatum	164	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Trisetum flavescens	165	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Euphorbia cyvarissias	166	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Cardamine amara	167	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Stellaria cruminea	168	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Poa hybrida	169	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Ranunculus montanus	170	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Trifolium pratense	171	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Bellis perennis	172	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Carex hirta	173	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Arrhenatherum elatius	174	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Juniperus communis	175	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1
Arctium minus	176	79.7		+	1+	1+	1+	11+1+	++1	++1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AUFNAHMENUMMER	88	555588	0000	466677778	44488	7777888	5568	3	1133578	1334478
	11	555611	7888	533304441	25666	2333336	8995	9	4418753	4001974
	78	239519	9012	901204562	68301	3123782	1038	5	6854371	7163918
<i>Trollius europaeus</i>	1	1.9								+
<i>Rumex alpestris</i>	1	1.9								+
sonstige Thallophyten:										
<i>Placodium rostratum</i>	28	53.8	11	21	1+1	+	+++	+	11	1 2 ++1
<i>Placochila asplenoides</i>	28	53.8	2+1+	+	++	1111+1	+	121	1+1	1 2 ++
<i>Thuidium tamariscinum</i>	17	27.8	+	1	+	++	++1	+	+	+
<i>Chiloscyphus pallascens</i>	17	27.2	+	+	+	++	++1	+	+	+
<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	10	19.2	+	+	+	++	++	+	++	+
<i>Brachythecium salebrosum</i> (sp.)	8	11.4	++1	+	1	+	+	+	1	1
<i>Placodium affine</i> s. str.	6	11.5	+	+	+	+	+	21	+	2
<i>Eurhynchium swartzii</i> (sp.)	6	11.5	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Placodium cuspidatum</i>	6	9.6	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Fissidens taxifolius</i>	6	9.6	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Rhytidiadelphus loreus</i>	5	9.6	+	+	+	1	+	+	+	+
<i>Hypnum cupressiforme</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Encalypta streptocarpa</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Lophocolea bidentata</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Polypodium formosum</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pseudoleskea incurvata</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Bryum capillare</i> aq.	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
cf <i>Brachythecium populeum</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Hookeria lucens</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Calypogeia trichomanis</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Leiocolea muelleri</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Brachythecium velutinum</i> (sp.)	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Calliergonella cuspidata</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Scleropodium purum</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Brachythecium rivulare</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pohlia cruda</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Preissia quadrata</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Glepharostoma trichophyllum</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Bazzania trilobata</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Callia endiviasifolia</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Peltigera leucophaea</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Barbilophozia barbata</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
(cf) <i>Leiocolea bantriensis</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Barbula crocea</i> (sp.)	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Mnium marginatum</i> (sp.)	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cratoneuron decipiens</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Dichodontium pellucidum</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Dicranodontium denudatum</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Brotherella lorentziana</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cololeuteunea calcarea</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Leucobryum glaucum</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Campylium halleri</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Mnium stellare</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Plagiothecium sp.</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Trentepohlia aurea</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Riccardia multifida</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cratoneuron commutatum</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Bryum flaccidum</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Antitrichia cutipendula</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Climacium dendroides</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cratoneuron filicinum</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Hylacomium pyrenaicum</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Ptychodium pilatum</i>	4	7.7	+	+	+	+	+	+	+	+

AUFNAHMENUMMER	88	555588	0000	466677778	44488	7777888	5568	3	1133578	1334478
	11	555611	7888	533304441	25666	2333336	8995	9	4418753	4001974
	78	239519	9012	901204562	68301	3123782	1038	5	6854371	7163918

TABELLE 8: HASEL-FEISENBIRNEN-GESELLSCHAFT

Reine Ausbildung mit Moehringia
Reine Ausbildung mit Moehringia, Schlaeflur
Reine Ausbildung mit Moehringia, Schlaeflur
Reine Ausbildung, rein, Schlaeflur, beweidet

Epithalium-Ausbildung mit Aquilegia, rein, beweidet
Epithalium-Ausbildung mit Aquilegia
Epithalium-Ausbildung mit Aquilegia und Moehringia

Epithalium-Ausbildung mit Molinia und Moehringia
Epithalium-Ausbildung mit Molinia

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AUFNAHMENUMMER	0335667 8233685 3513494	33335666778 22336677551 47235261463	66 55 49	3 2 6	67 63 60	67 75 75	3 3 0	335667 223695 894875	6666 5567 0635	3 3 4
AUFNAHMEONAT	JAJJSS UUUUUE NGGLPPP	AAAAJSSSSS UUUUUEPPPP GGGGLPPPP	SS PP PP	O O P	PP PP P	SS PP P	AAJSSS UUUUUE GGGLPPP	SSSS PPPP PPPP	SSSS PPPP PPPP	U O G
AUFNAHMEFLAECH (QM)	2212122 0000000 0000000	22221222211 000050000005 000000000000	11 60 00	2 0 00	22 0 00	11 0 00	1 1 0	112211 00000000 00000000	2212 0000 0000	2 0 0
MEERESHÖHE (10 M)	9869668 7523922	97698878061 18227035566	67 50	8 0	91 20	70 85	6 0	778877 206244	9667 7897	6 5
EXPOSITION (GRAD)	42811 8090 05000-0	22221111333 98888272500 000005555000	11 02 00	2 2 00	22 47 38	3 13 50	3 11 00	321122 080028 0500000	11112 0210 00000	2 6 5
HANGNEIGUNG (GRAD)	44432 00000005	43333334436 05554700050	24 50	0 0	34 00	34 03	4 5	443363 854505	3324 5500	3 5
ARTENZAHL	6556357 1106845	65555555556 76503652227	56 76	4 5	56 48	25 24	6 0	546667 581633	3654 9273	4 0
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	32 7 1 0050 5	36 16 6522 00500 0000	3 0	2 0	5 5	3 0	1 0	5156 2 0005 0	122 000	
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)	55 1 0	121 0005	3 0	6 +	0 0	4 0	2 0			
DECKUNG DER (1.) STRAUCHSCHICHT (%)	326 33 000+505	1 98 2 317 0+50++01000	7 05	0 0	12 00	1 0	4 5	21 2 00+5+0	792 005 5	
DECKUNG DER 2. STRAUCHSCHICHT (%)			3 0							
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	4787993 05000000	42233962833 500000000050	67 00	8 05	88 05	97 05	6 05	566646 050000	8765 0000	8 0
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	43142 3 00000+0	12123221 42 000000000500	42 05	2 05	73 05	22 05	1 55	113333 550500	211 1500	< 0
Baumarten										
Fraxinus excelsior	B1	9	24-3	1	1	1	2	1	+4	2
Fraxinus excelsior	B2	36	16-2	1	1	1	2	1	+4	2
Fraxinus excelsior	K	81	16-2	1	1	1	2	1	+4	2
Fraxinus excelsior	B1	23	62-2	1	1	1	2	1	+4	2
Acer pseudoplatanus	B1	10	27-0	1	1	1	2	1	+4	2
Acer pseudoplatanus	B2	8	37-8	1	1	1	2	1	+4	2
Acer pseudoplatanus	K	14	64-9	1	1	1	2	1	+4	2
Acer pseudoplatanus	B1	24	64-9	1	1	1	2	1	+4	2
Picea abies	B1	17	45-9	1	1	1	2	1	+4	2
Picea abies	B2	4	10-8	1	1	1	2	1	+4	2
Picea abies	K	20	54-1	1	1	1	2	1	+4	2
Fagus sylvatica	B1	15	40-5	1	1	1	2	1	+4	2
Fagus sylvatica	B2	18	46-6	1	1	1	2	1	+4	2
Fagus sylvatica	K	16	46-6	1	1	1	2	1	+4	2
Larix decidua	B1	15	32-4	1	1	1	2	1	+4	2
Sorbus aria	B1	1	12-7	1	1	1	2	1	+4	2
Sorbus aria	B2	18	21-6	1	1	1	2	1	+4	2
Sorbus aria	K	10	24-4	1	1	1	2	1	+4	2
Sorbus aucuparia	B1	1	12-7	1	1	1	2	1	+4	2
Sorbus aucuparia	B2	1	12-7	1	1	1	2	1	+4	2
Tilia platyphyllos	B1	1	12-7	1	1	1	2	1	+4	2
Tilia platyphyllos	B2	1	12-7	1	1	1	2	1	+4	2
Tilia platyphyllos	K	1	12-7	1	1	1	2	1	+4	2
Alnus incana	B1	1	12-7	1	1	1	2	1	+4	2
Alnus incana	B2	1	12-7	1	1	1	2	1	+4	2
Alnus incana	K	1	12-7	1	1	1	2	1	+4	2

		A B C D E F G H I J									
AUFNAHMENUMMER		0335667	33334	5666778	666	67	67	335667	6666	666	666
		5513494	4723528	1463	49	640	750	894675	0635	4	4
Ulmus alabra	UKS	1	2.7								
Ulmus diabra	UKS	1	2.7								
Salix elaeagnos	UKS	1	2.7								
Abies alba	UKS	1	2.7								
Betula pubescens	UKS	1	2.7								
Straucharten											
Corvulus avellana	KS	28	75.7	1+3r	1	+ 54	+2+	31	2+	1	+
Corvulus avellana	KS	28	75.7	1	+	54	+2+	31	2+	1	+
Daphne mezereum	KS	26	56.2	1	+	+	r	+++	+	+	+
Clematis vitalba	KS	14	24.4	1	+	5	+	11	+	+	+
Clematis vitalba	KS	14	24.4	1	+	5	+	11	+	+	+
Lonicera xylosteum	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Lonicera xylosteum	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Rubus idaeus	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Rosa pendulina	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Rosa pendulina	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Salix appendiculata	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Salix appendiculata	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Frangula alnus	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Frangula alnus	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Sambucus racemosa	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Rubus fruticosus	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Lonicera caerulea	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Euronymus europaeus	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Euronymus europaeus	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Solanum dulcamara	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Viburnum lantana	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Viburnum opulus	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Berberis vulgaris	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Crataegus monogyna	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Lonicera alpigena	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Sorbus chamaemespilus	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Rosa (cf) micrantha	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Salix sp.	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Rhamnus cathartica	KS	10	10.8	1	+	+	r	+	+	+	+
Diff.Ges.:											
K	Eupatorium cannabinum	30	81.1	1+	1	2	+++	2++3+	2+	3	33
K	Corvulus avellana	30	81.1	1+	1	2	+++	2++3+	2+	3	33
K	Rubus saxatilis	19	28.4	1	+	1	+	54	+2+	31	2+
K	Hepatica nobilis	17	45.9	1	+	1	+	54	+2+	31	2+
K	Epipactis helleborine	15	40.0	1	+	1	+	54	+2+	31	2+
K	Hypericum montanum	15	40.0	1	+	1	+	54	+2+	31	2+
K	Vincetoxicum hirsutaria	14	37.8	1	+	1	+	54	+2+	31	2+
K	Clematis vitalba	14	37.8	1	+	1	+	54	+2+	31	2+
K	Laspidium latifolium	13	36.1	1	+	1	+	54	+2+	31	2+
K	Homalothecium lutescens	13	36.1	1	+	1	+	54	+2+	31	2+
K	Entodon concinnus	13	36.1	1	+	1	+	54	+2+	31	2+
K	Silene nutans	13	36.1	1	+	1	+	54	+2+	31	2+
O	Fraxinus excelsior	37	100.0	122	1+3	11	111	133	41	2	3
O	Campanula trachelium	37	100.0	122	1+3	11	111	133	41	2	3
O	Anemone sylvestris	37	100.0	122	1+3	11	111	133	41	2	3
O	Centaurea montana	37	100.0	122	1+3	11	111	133	41	2	3
O	Polystichum latifolium	37	100.0	122	1+3	11	111	133	41	2	3
O	Aconitum napellus	37	100.0	122	1+3	11	111	133	41	2	3
O	Aruncus dioicus	37	100.0	122	1+3	11	111	133	41	2	3
Diff.Ausb.:											
O	Euphorbia cyparissias	8	21.6	1	+	1	+	+	+	2	+
O	Melampyrum sylvaticum	8	21.6	1	+	1	+	+	+	2	+
O	Malanthemum bifolium	6	16.2	1	+	1	+	+	+	2	+
O	Rhodobryum roseum	4	10.8	1	+	1	+	+	+	2	+
O	Bupththalmum salicifolium	25	67.6	1	1	+	+	+	+	2	+
O	Scabiosa columbaria	13	35.1	1	1	+	+	+	+	2	+
O	Veronica urticifolia	21	56.8	1	1	+	+	+	+	2	+
O	Rhinanthus glacialis	10	27.0	1	1	+	+	+	+	2	+
O	Aquilegia vulgaris	10	27.0	1	1	+	+	+	+	2	+
O	Calamintha alpina	7	18.9	1	1	+	+	+	+	2	+
O	Petasites paradoxus	4	10.8	1	1	+	+	+	+	2	+
O	Molinia arundinacea	12	32.4	1	1	+	+	+	+	2	+
Blockschuttbesiedler											
Kormophyten:											
O	Moehringia muscosa	23	62.2	1	+	+	+	+	+	2	+
O	Asplenium trichomanes	10	27.0	1	+	+	+	+	+	2	+
O	Campanula cochlearifolia	10	27.0	1	+	+	+	+	+	2	+
O	Asplenium viride	7	18.9	1	+	+	+	+	+	2	+
O	Asplenium ruta-muraria	5	13.5	1	+	+	+	+	+	2	+
O	Polystichum lonchitis	4	10.8	1	+	+	+	+	+	2	+
Thallophyten:											
O	Tortella tortuosa	28	75.7	1	+	+	+	+	+	2	+
O	Ctenidium molluscum	27	73.0	1	+	+	+	+	+	2	+
O	Schistidium apocarpum	27	73.0	1	+	+	+	+	+	2	+
O	Fissidens cristatus	27	73.0	1	+	+	+	+	+	2	+
O	Rhynchostegium murale	11	29.7	1	+	+	+	+	+	2	+
O	Cladonia pyxidata (sp.)	10	27.0	1	+	+	+	+	+	2	+
O	Pseudoskeelia catarulata	10	27.0	1	+	+	+	+	+	2	+
O	Cirriophyllum tenuinerve	2	5.4	1	+	+	+	+	+	2	+
Schlaupflanzen											
K	Geranium robertianum	12	32.4	1	+	+	+	+	+	2	+
K	Epilobium montanum	10	27.0	1	+	+	+	+	+	2	+
K	Rubus idaeus	10	27.0	1	+	+	+	+	+	2	+
K	Galeopsis tetrahit	6	16.2	1	+	+	+	+	+	2	+
K	Poa nemoralis	6	16.2	1	+	+	+	+	+	2	+
K	Urtica dioica	6	16.2	1	+	+	+	+	+	2	+
K	Sambucus racemosa	6	16.2	1	+	+	+	+	+	2	+
K	Galeopsis speciosa	6	16.2	1	+	+	+	+	+	2	+
K	Petasites albus	6	16.2	1	+	+	+	+	+	2	+
K	Vicia sepium	6	16.2	1	+	+	+	+	+	2	+
K	Solanum dulcamara	6	16.2	1	+	+	+	+	+	2	+
K	Tellaria media	6	16.2	1	+	+	+	+	+	2	+
K	Scrophularia nodosa	6	16.2	1	+	+	+	+	+	2	+
K	Myosotis sylvatica	1	2.7	1	+	+	+	+	+	2	+

AUFNAHMENUMMER	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
0335667	33335666778	66	63	67	67	33	335667	6666	3	
8233685	22333667351	55	2	93	63	33	223695	5567	3	
3513494	47235261463	49	6	40	75	0	894875	0635	4	
Sorbus aucuparia	4	10.8	1	+					+	
Potentilla erecta	4	10.8	1	+					++	
Lotus corniculatus	4	10.8				+	1			
Thymus polytrichus (sp.)	4	10.8						1	1	+
Dracopis austriaca s.str.	4	10.8								
Hieracium sphondylium	4	10.8								
Campanula scheuchzeri	4	10.8								
Silene vulgaris	4	10.8								
Epipactis palustris	4	10.8								
Convallaria majalis	4	10.8								
Carex sempervirens	4	10.8								
Polygala chamaebuxus	4	10.8								
Gentiana ciliata	4	10.8								
Erica herbacea	4	10.8								
Toioidia calyculata	4	10.8								
Lonicera caerulea	4	10.8								
Thelypteris pheopteris	4	10.8								
Luzula pilosa	4	10.8								
Chorophyllum hirsutum	4	10.8								
Medicago lupulina	4	10.8								
Rumex scutatus	4	10.8								
Gymadenia conopsea	4	10.8								
Viola hirta	4	10.8								
Prunella grandiflora	4	10.8								
Hypericum perforatum	4	10.8								
Arabis pumila	4	10.8								
Orobancha sp.	4	10.8								
Cystopteris fragilis	4	10.8								
Valeriana officinalis aq.	4	10.8								
Viola biflora	4	10.8								
Chrysanthemum leucanthemum	4	10.8								
Galium anisophyllum	4	10.8								
Valeriana montana	4	10.8								
Helianthemum nummularium	4	10.8								
Polygala amarella	4	10.8								
Anthericum ramosum	4	10.8								
Primula elatior	4	10.8								
Cirsium ciliatum	4	10.8								
Ranunculus montanus	4	10.8								
Hypericium selago	4	10.8								
Lycopodium annotinum	4	10.8								
Pvrola uniflora	4	10.8								
Luzula luzulina	4	10.8								
Salix elaeagnos	4	10.8								
Euphrasia picta	4	10.8								
Thelypteris limbosperma	4	10.8								
Carex brachystachys	4	10.8								
Polypodium vulgare	4	10.8								
Vaccinium myrtillus	4	10.8								
Abies alba	4	10.8								
Pteridium aquilinum s.str.	4	10.8								
Betula pubescens	4	10.8								
Astragalus glycyphyllos	4	10.8								
Epilobium angustifolium	4	10.8								
Torilis japonica	4	10.8								
Acoris tenuis	4	10.8								
Bromus benekenii	4	10.8								
Geranium sylvaticum	4	10.8								
Hieracium sphondylium elegans	4	10.8								
Scabiosa lucida	4	10.8								
Cardamine flexuosa	4	10.8								
Trifolium medium	4	10.8								
Vicia cracca	4	10.8								
Cerastium fontanum s.l.	4	10.8								
Linum catharticum	4	10.8								
Sorbus chamaemespilus	4	10.8								
Arabis hirsuta	4	10.8								
Thalictrum saxatile	4	10.8								
Sedum album	4	10.8								
Salix sp.	4	10.8								
Hieracium bifidum (sp.)	4	10.8								
Loquerium montanum	4	10.8								
Primula auricula	4	10.8								
Gypsophila repens	4	10.8								
Crepis aurea	4	10.8								
Hieracium sp.	4	10.8								
Hieracium staticifolium	4	10.8								
Leontodon incanus	4	10.8								
Melandrium rubrum	4	10.8								
Laserpitium siler	4	10.8								
sonstige Thallophyten:										
Hylocomium splendens	23	62.2	13+	2	22	+	++11	+	+	+
Plagiomnium prostratum	19	51.4	+	11+	1	12+	1	2	222	2
Rhizidiadelphus triquetrus	18	48.6	1+	21	2	+	++1	2+	+	1
Dicranum scoparium	15	40.8	2	+	++1	++	++	+	+	+
Thuidium lamellatum	14	37.8	+	1+	+	++	+	+	+	+
Hydnium cupressiforme	14	37.8	+	1+	+	++	+	+	+	+
Plagiochila asplenoides	10	35.0	2	3	2	+	1	+	+	+
Plagiomnium affine s.str.	10	35.0	+	2	+	1	+	+	+	+
Plagiomnium cuspidatum	7	18.9	11	+	+	+	+	+	+	+
Cirriophyllum piliferum	7	18.9	+	1	+	+	+	+	+	+
Scapania aspera	6	16.2	+	1	+	+	+	+	+	+
Polytrichum formosum	4	10.8	1	+	+	+	+	+	+	+
Peltigera praetextata	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Brachythecium salebrosum (sp.)	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Rhizomnium punctatum	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Scapania sp.	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Lophocolea bidentata	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Encalypta streptocarpa	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Peltigera sp.	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Collema sp.	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Thuidium philibertii	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Campylopus stellatus	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Scleropodium purum	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Conocephalum conicum	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Metzgeria conigata	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Barbilophozia barbata	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Trichocolea tomentella	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Cladonia sp.	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Brachythecium sp.	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Plagiothecium undulatum	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Brum sp.	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Pleurozium schreberi	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Ditrichum flexicaule	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+
Blepharostoma trichophyllum	4	10.8	+	+	+	+	+	+	+	+

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AUFNAHMENUMMER	0335667	33335666778	66	3	67	67	3	335667	6666	3
	8233685	22333667351	55	2	93	63	3	223695	5567	3
	3513494	47235261463	49	6	40	75	0	894875	0635	4
Metzgeria furcata	1	2.7	+							
Bazzania trilobata	1	2.7		1						
Scapania aequiloba	1	2.7			+					
Dicranodontium denudatum	1	2.7				+				
Trentepohlia aurea	1	2.7					+			
Mnium thomsonii	1	2.7						1		
Brachythecium oxycladum	1	2.7							+	
Leskeella nervosa	1	2.7								+
Pylaisia polyantha	1	2.7								+
Preissia quadrata	1	2.7								+
Campylium halleri	1	2.7								+
Pseudoleskea incurvata	1	2.7								+
Abietinella abietina	1	2.7								+
Brachythecium rutabulum (sp.)	1	2.7								1
cf Brachythecium glareosum	1	2.7								1
Brvum flaccidum	1	2.7								+
Cladonia cf furcata	1	2.7								+
Brvum argenteum	1	2.7								+
Racomitrium canescens	1	2.7								+
Calliergonella cuspidata	1	2.7								1
Ptilium crista-castrensis	1	2.7								+
Plagiomnium elatum	1	2.7								+
Rhytidium rupeum	1	2.7								+
Solorina saccata	1	2.7								+
Hyprum lacunosum	1	2.7								1
cf Brachythecium populeum	1	2.7								1

AUFNAHMENUMMER	0335667	33335666778	66	3	67	67	3	335667	6666	3
	8233685	22333667351	55	2	93	63	3	223695	5567	3
	3513494	47235261463	49	6	40	75	0	894875	0635	4

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN

TABELLE 9: AUWALD

Bach-Grauerlenwald (Carici remotae-Fraxinetum):

- A Bach-Grauerlenwald, Mantha-Ausbildung, beweidet
B Bach-Grauerlenwald, Reine Mantha-Ausbildung
C Bach-Grauerlenwald, Eschen-Ausbildung

Grauerlen-Auwald (Alnetum incanae):

- D Grauerlen-Auwald, Tussilago-Ausbildung
E Grauerlen-Auwald, Reine Ausbildung

	A	B	C	D	E
AUFNAHMENUMMER	4	55	5	1344	58
		11	0	5988	42
	4	12	9	0289	39
AUFNAHMEMONAT	J	JJ	J	JMJJ	JS
	U	UU	U	UAAU	UF
	N	LL	L	LILL	LP
AUFNAHMEFLAECH (QM)	2	13	2	2231	11
	0	50	0	0005	55
	0	00	0	0000	00
MEERESHOEHE (10 M)	8	88	8	8888	88
	5	32	2	0333	20
EXPOSITION (GRAD)	1	1		213	33
	2	39		842	30
	0	00		- 500-	00
HANGNEIGUNG (GRAD)	3	32		111	2
	0	00	0	0000	05
ARTENZAHL	3	22	2	6576	55
	2	47	5	6554	49
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	8	78	8	9761	63
	0	00	0	0055	00
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)			5	6	2
				0	0
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	5	5+	+	1	8
				+0+5	02
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	5	99	8	6597	26
	0	00	0	0000	05
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	1	63		212	24
	5	00	+	0005	00

Baumarten

Alnus incana	B	9	90.0	5	45	5444	43
Alnus incana		1	70.0		1+	1141	1
Alnus incana		1	10.0			+	
Acer pseudoplatanus	B1	1	20.0			+	
Acer pseudoplatanus	N	2	20.0			1	+
Acer pseudoplatanus		2	20.0			+	+
Acer pseudoplatanus		7	70.0			1+	+
Fraxinus excelsior	B1	1	30.0			+	+
Fraxinus excelsior		1	30.0			+	+
Fraxinus excelsior		1	50.0			+	+
Picea abies	B2	2	10.0			+	+
Picea abies		2	20.0			1	2
Picea abies		6	60.0			+	+
Picea abies		2	20.0			1	+
Fagus sylvatica	B1	2	20.0			2	+
Fagus sylvatica		3	30.0			+	+
Fagus sylvatica		1	10.0			+	+
Abies alba		1	10.0			+	+
Abies alba		2	20.0			+	+
Ulmus glabra	B1	1	10.0			2	
Ulmus glabra		2	20.0				
Sorbus aucuparia	B1	1	10.0				++
Alnus glutinosa		1	10.0				++

Straucharten

Rosa canina	S	3	30.0			++1	
Lonicera xylosteum	U	2	20.0			+	+
Lonicera xylosteum		1	10.0			+	
Salix appendiculata	U	1	10.0			+	
Rubus fruticosus		2	20.0			+	1
Daphne mezereum		2	20.0			+	+
Salix caprea	U	1	10.0			+	
Berberis vulgaris		1	10.0			+	
Rubus idaeus		1	10.0				+
Clematis vitalba	K	1	10.0				+

		A B C D E				
AUFNAHMENUMMER		4	55	5	1344	58
		1	11	0	598	42
		4	12	9	0289	39
Differentialarten						
V	<i>Alnus incana</i>	9	90.0	5	45	5444 43
	<i>Myosotis palustris</i>	50.0		2	22	2 +
O,K	<i>Carex remota</i>	40.0		1	12	2
	<i>Mentha longifolia</i>	40.0		2	21	+
O,K	<i>Impatiens noli-tangere</i>	40.0		1	12	+
	<i>Cardamine amara</i>	30.0		1	1	+
V	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	30.0		1	1	+
	<i>Juncus effusus</i>	30.0		1	1	+
	<i>Conocephalum conicum</i>	30.0		1	1	+
	<i>Brachythecium rivulare</i>	30.0		2	33	+
	<i>Urtica dioica</i>	30.0		1	2	+
	<i>Equisetum arvense</i>	30.0		1	1	+
O,K	<i>Geum urbanum</i>	30.0		+	+	+
V	<i>Circaea intermedia</i>	20.0		+	+	+
	<i>Galium palustre</i>	20.0		11	+	+
O,K	<i>Festuca gigantea</i>	20.0		+	1	+
O,K	<i>Fraxinus excelsior</i>	7	70.0	1	3	+
O,K	<i>Acer pseudoplatanus</i>	7	70.0	1	1	+
O,K	<i>Ulmus glabra</i>	1	10.0	2	1	+
	<i>Eupatorium cannabinum</i>	50.0			1231	1
	<i>Cirsium oleraceum</i>	30.0			+	+
	<i>Potentilla reptans</i>	30.0			+	+
O,K	<i>Rosa canina</i>	30.0			+	+
	<i>Vicia sepium</i>	30.0			+	+
V	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	30.0			+	+
O,K	<i>Asarum europaeum</i>	20.0			+	+
Weidezeiger						
	<i>Dactylis glomerata</i>	50.0		+	+	1 ++
	<i>Rhynchospora squarrosa</i>	50.0			+	11 +3
	<i>Tussilago farfara</i>	40.0		1	2	+
	<i>Euphorbia cyathophylla</i>	40.0			11	+
	<i>Festuca rubra</i>	40.0			11	+
	<i>Poa trivialis</i>	30.0		1	+	+
	<i>Taraxacum officinale</i>	20.0			+	+
	<i>Meibomia rotunda</i>	20.0			+	+
	<i>Trifolium pratense</i>	20.0			+	+
	<i>Plantago media</i>	20.0			1	+
	<i>Ranunculus repens</i>	20.0			+	++
	<i>Agrostis stolonifera</i>	20.0			+	++
V	Verb. Char.:					
	<i>Plagiomnium undulatum</i>	8	80.0	21	1+22	21
	<i>Stachys sylvatica</i>	1	10.0		+	+
O,K	Ord. u. Klass. Char.:					
	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	10	100.0	1	1	2
	<i>Salvia glutinosa</i>	7	70.0		1	122 11
	<i>Carex sylvatica</i>	40.0		+	1	1
	<i>Aposaris foetida</i>	50.0			+	211 21
	<i>Geranium robertianum</i>	50.0		+	1	1
	<i>Eurhynchium striatum</i>	50.0			1	1
	<i>Fragaria vesca</i>	40.0		+	2	1
	<i>Sanicula europaea</i>	40.0			1	+
	<i>Listera ovata</i>	40.0			+	++
	<i>Malva nutans</i>	40.0			11	+
	<i>Campanula trachelium</i>	40.0			+	++
	<i>Paris quadrifolia</i>	40.0			+	++
	<i>Carex diuturna</i>	40.0			11	+
	<i>Lonicera xylosteum</i>	30.0			+	++
	<i>Cardamine trifolia</i>	30.0		1	1	3
	<i>Petasites albus</i>	20.0			+	+
	<i>Galium rotundifolium</i>	20.0			+	+
	<i>Mercurialis perennis</i>	20.0			+	+
	<i>Daphne mezereum</i>	20.0			+	+
	<i>Hepatica nobilis</i>	20.0			+	+
	<i>Lamium galeobdolon</i>	20.0			+	1
	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	10.0			+	+
	<i>Phytolacca spicata</i>	10.0			+	+
	<i>Prenanthes purpurea</i>	10.0			+	+
	<i>Berberis vulgaris</i>	10.0			+	+
	<i>Anemone nemorosa</i>	10.0			+	+
	<i>Aegopodium podagraria</i>	10.0			+	+
	<i>Dryopteris filix-mas</i>	10.0			+	+
	<i>Polystichum lobatum</i>	10.0			+	+
	<i>Aconitum vulpina</i>	10.0			+	+
	<i>Clematis vitalba</i>	10.0			+	+
	<i>Elymus europaeus</i>	10.0			+	+
sonstige Kormophyten:						
	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	10	100.0	2	45	4
	<i>Senecio jacobae</i>	8	80.0	+	+	1
	<i>Lysimachia nemorosum</i>	8	80.0	+	+	1
	<i>Viola riviniana</i> + <i>reichenb.</i>	8	80.0	+	+	1
	<i>Fragaria vesca</i>	7	70.0	+	+	2112
	<i>Picea abies</i>	7	70.0	+	+	1
	<i>Athyrium filix-femina</i>	7	70.0	+	+	1
	<i>Oxalis acetosella</i>	6	60.0	+	+	1
	<i>Veronica chamaedrys</i>	6	60.0	+	+	1
	<i>Artemisia repens</i>	5	50.0	+	+	1
	<i>Dactylorhiza maculata</i>	5	50.0	+	+	1
	<i>Deschampsia caespitosa</i>	5	50.0	+	+	1
	<i>Myosotis muralis</i>	5	50.0	+	+	1
	<i>Galium album</i>	5	50.0	+	+	1
	<i>Carex alba</i>	4	40.0	+	+	1
	<i>Ranunculus nemorosus</i>	4	40.0	+	+	1
	<i>Adenostyles glabra</i>	4	40.0	+	+	1
	<i>Calamintha clinopodium</i>	4	40.0	+	+	1
	<i>Abies alba</i>	4	40.0	+	+	1
	<i>Calamagrostis varia</i>	3	30.0	12	+	+
	<i>Sesleria varia</i>	3	30.0	+	+	+
	<i>Gymnocarpium robertianum</i>	3	30.0	+	+	+
	<i>Viola biflora</i>	3	30.0	+	+	+
	<i>Pimpinella maior</i>	3	30.0	+	+	+
	<i>Hieracium sylvaticum</i>	2	20.0	+	+	+
	<i>Oriacum vulgare</i>	2	20.0	+	+	+
	<i>Potentilla erecta</i>	2	20.0	+	+	+

		A B C D E				
AUFNAHMENUMMER		4	55	5	1344	58
		1	11	0	5988	42
		4	12	9	0289	39
Cirsium palustre	2	20.0			1	+
Carex flacca	2	20.0			1	+
Ranunculus acris	2	20.0				+
Salix appendiculata	2	20.0				+
Angelica sylvestris	2	20.0			r	1
Solidago virgaurea	2	20.0				+
Mainanthemum bifolium	2	20.0			1	+
Sorbus aucuparia	2	20.0				++
Hypericum maculatum	1	10.0	r			
Salix caprea	1	10.0				
Rumex obtusifolius	1	10.0	r			
Veronica beccabunga	1	10.0	1			
Cirsium arvense	1	10.0				
Agrostis gigantea	1	10.0				
Trollius europaeus	1	10.0		+		
Alchemilla vulgaris	1	10.0			r	
Polypolia chamaebuxus	1	10.0				+
Heracleum sphondylium	1	10.0				+
Cardaminopsis arenosa	1	10.0			r	
Rumex acetosa	1	10.0				
Prunella vulgaris	1	10.0			1	
Campanula scheuchzeri	1	10.0				
Achillea millefolium	1	10.0				
Bellis perennis	1	10.0			1	
Chrysanthemum leucanthemum	1	10.0				
Festuca pratensis	1	10.0				
Poa pratensis	1	10.0			+	
Aquilegia atrata	1	10.0			1	
Ranunculus montanus	1	10.0			r	
Laserpitium latifolium	1	10.0			r	
Viola hirta	1	10.0				+
Kernera saxatilis	1	10.0			r	
Silene vulgaris	1	10.0				
Euphrasium salicifolium	1	10.0				
Carex ornithopus	1	10.0				
Lathyrus pratensis	1	10.0			+	
Cardamine flexuosa	1	10.0				+
Crucifera laevipes	1	10.0			1	
Galeopsis speciosa	1	10.0				+
Lamium maculatum	1	10.0			1	
Adenostyles alliariae	1	10.0				+
Luzula pilosa	1	10.0				+
Geum rivale	1	10.0				+
Lotus corniculatus	1	10.0				+
Sesbiosa columbaria	1	10.0				+
Plantago maior	1	10.0				+
Agrostis tenuis	1	10.0			1	
Poa nemoralis	1	10.0				
Thelypteris pheopteris	1	10.0				+
Alnus glutinosa	1	10.0				+
Gentiana asclepiadea	1	10.0				+
Valeriana officinalis aq.	1	10.0				+
Bromus benekenii	1	10.0				+
Dracopis (cf.) carthusiana	1	10.0				+
Saxifraga rotundifolia	1	10.0				+
Valeriana tripteris	1	10.0				+
Primula elatior	1	10.0				+
Crepis paludosa	1	10.0				+
sonstige Thallophten:						
Cirriophyllum piliferum	5	50.0	1		+	2
Rhynchosia trifolius	5	50.0			1	+
Ctenidium molluscum	4	40.0			1	+
Thuidium tamariscinum	3	30.0	+		1	2
Plagiomnium affine s.str.	3	30.0				1
Leptocolea bidentata	3	30.0				+
Plagiocilia asplenoides	3	30.0				+
Tortella tortuosa	3	30.0			r	+
Plagiomnium rostratum	2	20.0				+
Rhynchosia murale	2	20.0			1	+
Rhynchosia loreus	2	20.0				+
Rhodocorynium rostratum	2	20.0				+
Hylacomium splendens	1	10.0				+
Brachythecium rutabulum (sp.)	1	10.0				+
Brachythecium caespitosum (sp.)	1	10.0				+
Campylopus stellatus	1	10.0			1	
Entodon concinnus	1	10.0				+
Pellia endivifolia	1	10.0				+
Calliergonella cuspidata	1	10.0				+
Fissidens taxifolius	1	10.0				+
Hookeria lucens	1	10.0				+
Rhizomnium punctatum	1	10.0				+
AUFNAHMENUMMER		4	55	5	1344	58
		1	11	0	5988	42
		4	12	9	0289	39

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN

TABELLE 10: ALPENLATTICH-FICHTENWALD (Homogvno-Piceetum)
BRAUNSEGGENSUMPF (Caricetum fuscae)

- A Rippenfarn-Alpenlattich-Fichtenwald, Reine Bazzania-Ausbildung
B Rippenfarn-Alpenlattich-Fichtenwald, Bazzania-Ausbildung, beweidet
C Rippenfarn-Alpenlattich-Fichtenwald, Plagiothecium undulatum-Ausbildung
D Rippenfarn-Alpenlattich-Fichtenwald, Reine Anemone-Ausbildung
E Rippenfarn-Alpenlattich-Fichtenwald, Anemone-Ausbildung, beweidet
F Frauenfarn-Alpenlattich-Fichtenwald, Anemone-Ausbildung, beweidet
G Frauenfarn-Alpenlattich-Fichtenwald, Reine Anemone-Ausbildung
H Frauenfarn-Alpenlattich-Fichtenwald, Reine Ausbildung
I Brauseggensumpf

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
AUFNAHMENUMMER	22 222 222 222 2 53 2 2222 222	66 532 657 777 2 74 7 6877 677	08 897 494 567 2 26 1 3509 158						
AUFNAHMEMONAT	JJ JJJ JJA AAA J JS J JJJ JAA	UU UUU UUU UUU U UE U UUU UUU	LL LLL LLG GGG L LP L LLLG LGG						
AUFNAHMEFLAECHE (QM)	13 442 132 222 2 22 2 2322 112	50 000 500 000 0 00 0 0000 550	00 000 000 000 0 00 0 0000 000						
MEERESHÖHE (10 M)	11 111 111 111 1 11 1 1111 111	44 444 343 333 4 35 4 3433 433	56 126 927 888 0 90 0 9089 188						
EXPOSITION (GRAD)	32 33 222 2	07 01 2 652 7	00 000 500 000 0	00 1 4 44 3					
HANGNEIGUNG (GRAD)	11 11 221 221 2	05 005 000 555 0	05 1 055 003						
ARTENZAHL	12 222 122 433 4 34 2 2222 423	83 452 617 934 5 33 9 5558 147							
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	66 671 376 656 5 2 7 1622 1 1	50 000 000 550 0 0 - 0 0000 0 0							
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)			1 5 5				5 05 5		
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)			< 1 5+0	++ +			2 +		
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	54 335 646 476 6 70 7 8780 486	00 500 000 005 0 00 0 0000 000							
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	43 963 166 356 3 44 1 2361 644	05 000 000 500 0 00 0 0005 000							

Baumarten

Picea abies	B1 21 95.5	44 441 344 444 3 2+ 4 1422 1 1
Picea abies	B2 7 31.8	
Picea abies	4 18.2	1 1 +
Picea abies	3 13.6	r r +
Sorbus aucuparia	2 9.1	
Sorbus aucuparia	7 31.8	+ + + + + r
Sorbus aucuparia	2 22.7	
Larix decidua	B1 4 4.5	
Acer pseudoplatanus	K 1	r

Straucharten

Daphne mezereum	2 9.1	+ r +
Rubus idaeus	1 4.5	

Verb. Char.:
Vaccinio-Piceion

Picea abies	21 95.5	44 441 344 444 3 2+ 4 1422 1 1
Luzula sylvatica s.l.	19 86.4	1+ +11 12 222 1 12 + +1+ +
Larix decidua	1 4.5	

Ass. Char.:
Caricetum fuscae

Viola palustris	1 4.5	
-----------------	-------	--

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
	AUFNAHMENUMMER	22	222	222	222	2	23	2	2222	222
		66	556	667	777	6	74	7	6677	677
		08	897	494	567	2	26	1	3509	138
	Diff.Ass.:									
	Homocyno-Piceetum									
K1	Polytrichum formosum	21	95.5	23	432	143	243	2	21	2
	Drvopteris austriaca s.str.	20	90.9	21	1+1	111	1+1	+	1+1	+
	Rhynidiadelphus loreus	17	89.4	21	21+	12	223	3	211	1
	Trilepteris limbosperma	17	77.7	+	+	+	+	+	2+1	1
	Carex canescens	8	36.4						1	11+
	Diff.Ausb.:									
V	Sphagnum (cf.) nemoreum	16	72.7	21	223	212	++		+	1+ 3 2
	Elaeagnus nemorosus	17	77.7	22	221	++	122	1	+	+
	Dicranum scoparium	12	54.5	11	1+1	++	1+1	+		
	Polytrichum commune	12	54.5	2	1+1	123				212
	Hylocomium splendens	11	50.0	21	1+	1+			++1	1
V	Calamagrostis villosa	6	27.3	32	114	4				
V	Bazzania trilobata	5	22.7	1	21					+
K1	Pleurozium schreberi	5	22.7	1	21					+
	Vaccinium vitis-idaea	3	13.6		++					
	Athyrium distentifolium	19	86.4	11	111	223	+	25	3	4445 1 2
	Veratrum album	14	63.6		+	1	+	1	+	++1+ 212
V	Plagiothecium undulatum	13	59.5		+	22	+			322
	Streptopus amplexifolius	9	40.9			++				+
	Rhizomium punctatum	7	31.8					+	1	++ 1
	Cicerbita alpina	4	18.2						1	++
	Adonostyles alliariae	15	68.2		+	r	213	2	22	2
	Anemone nemorosa	8	31.8				++			++1 1 1
V	Solidago virgaurea	7	31.8				111	1	+	+
	Luzula luzulina	7	31.8				++	+		
	Lysimachia nemorum	7	31.8				++	+		111
	Aposeris foetida	5	22.7				2+1			r
	Hieracium sylvaticum	5	22.7				21+			
	Rhynidiadelphus triquetrus	4	18.2				++			+
	Ranunculus nemorosus	4	18.2				++			+
	Veronica chamaedrys	4	18.2				++			+
	Athyrium filix-femina	4	18.2				++			+
	Polygonatum verticillatum	4	18.2				++			+
	Ctenidium molliuscum	4	18.2				++			+
	Campanula scheuchzeri	4	18.2				++			+
	Ajuga reptans	4	18.2				++			+
	Calamagrostis varia	4	18.2				++			+
	Ass.-Diff. bzw. Char.:									
	Caricetum fuscae									
K2	Calycocorus stipitata	6	27.3				+	+		21+
	Pellia epiphylla	6	27.3							11
	Sphagnum squarrosum	6	27.3						++1	233
	Deschampsia caespitosa	6	27.3			r		1		233
	Poa supina	6	27.3							+
K2	Juncus filiformis	6	27.3							+
	Carex fusca	6	27.3				+			1
	Drepanocladus exannulatus	6	27.3							++
	Callia palustris	6	27.3							++
	Ranunculus repens	6	27.3							++
	Epilobium anacallidifolium	6	27.3							12
	Stellaria uliginosa	6	27.3							11
	Callitriche palustris aq.	6	27.3							++
K1	Sphagnum girgensohnii	6	27.3							++
	Weidezeiger									
	Nardus stricta	7	31.8					1	++	2
	Hypericum maculatum	7	31.8						+	
	Rumex alpestris	7	31.8					12		
	Klass.Char.:									
K1	Vaccinio-Piceetea									
	Homocyno alpina	19	86.4	1+	111	12	222	2	11	1
	Lycopodium annotinum	7	31.8	r	1		+			+
	Huperzia selago	7	31.8				++			
	Barbiliohozia floerkei	7	31.8				+			
	Listera cordata	7	31.8				++			
	Hylocomium umbratum	1	4.5					+		+
K2	Scheuchzerio-Caricetea fuscae									
	siehe Char. und Diff. Ass.									
	sonstige Kormophyten:									
	Vaccinium myrtillus	21	95.5	33	442	232	233	3	21	1
	Oxalis acetosella	18	61.8	1	+	122	21	2	22	1
	Gentiana asclepiadea	17	77.3	++	r+	+	+	1	1	+
	Sorbus aucuparia	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Maianthemum bifolium	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Agrostis stolonifera	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Stellaria nemorum	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Deschampsia flexuosa	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Gymnocarpium drvopteris	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Prenanthes purpurea	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Solidago alpina	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Poa nemoralis	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Potentilla erecta	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Alchemilla vulgaris	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Doronicum austriacum	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Chaerophyllum hirsutum	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Geranium sylvaticum	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Ranunculus montanus	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Galium anisophyllum	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Phytoloma spicatum	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Aster bellidiastrium	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Carex flacca	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Heileborus niger	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Galium rotundifolium	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Carex sylvatica	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Urtica dioica	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Potentilla aurea	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+
	Senecio fuchsii	17	77.3	+	+	+	+	1	1	+

AUFNAHMENUMMER	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	22	222	222	222	2	23	2	2222	222
	66	556	667	777	5	74	7	6677	677
	08	897	494	567	2	26	1	3509	138
Anthoxanthum odoratum	1	4.	5			1			
Melandrium rubrum	1	4.	5				+		
Equisetum sylvaticum	1	4.	5				+		
Alchemilla hoppeana	1	4.	5				+		
Gentiana pannonica	1	4.	5				+		
Crepis paludosa	1	4.	5				+		
Gnaphalium sylvaticum	1	4.	5				r		
Carex leporina	1	4.	5				+		
Phleum alpinum	1	4.	5					+	
Saxifraga rotundifolia	1	4.	5					+	
Cardamine flexuosa	1	4.	5						+
Epilobium angustifolium	1	4.	5					+	
Acer pseudoplatanus	1	4.	5					r	
Thelypteris phegopteris	1	4.	5						+
Cardamine amara	1	4.	5						+
sonstige Thallophten:									
Plagiochila asplenoides	5	22.	7		+		1	2	1
Rhytidadelphus squarrosus	5	22.	7			+	2	5	11*
Brachythecium rutabulum (sp.)	5	22.	7				5	+	1 2*
Atrichum undulatum	4	18.	2		+		1		1
Calypogeia trichomanis	5	18.	2				2	1	
Hypnum callichroum	3	13.	6		1	+			
Plagiothecium denticulatum/sp.	3	13.	6					+	1
Mnium thomsonii	3	13.	6						+
Cetraria islandica	2	9.	1		+	+			
Thuidium tamariscinum	2	9.	1			1			1
Cephalozia cf. loitlesbergieri	2	9.	1				+	+	
Dicranodontium denudatum	1	4.	5		1				
Plagiothecium curvifolium	1	4.	5		+				
Tortelia tortuosa	1	4.	5			1			
Cirriophyllum piliferum	1	4.	5				1		
Dicranella heteromalla	1	4.	5				+		
Lophocolea bidentata	1	4.	5					1	
Plagiothecium cavifolium	1	4.	5						+
Calliergonella cuspidata	1	4.	5						1
Rhizomnium magnifolium	1	4.	5						+
Philonotis cf. caespitosa	1	4.	5						1
AUFNAHMENUMMER	22	222	222	222	2	23	2	2222	222
	66	556	667	777	6	74	7	6677	677
	08	897	494	567	2	26	1	3509	138

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN

TABELLE 11: KARBONAT-FICHTENWALD (Asplenio-Piceetum)

SCHNEEHEIDE-ALPENROSENBUSCH (Erico-Rhododendretum)

A Block-Fichtenwald
Karbonat-Fichtenwald, Reine Luzula sylvatica-Ausbildung
C Karbonat-Fichtenwald, Luzula sylvatica-Ausbildung, beweidet
D Schneeheide-Alpenrosenbusch, Reine Lycopodium-Ausbildung
E Schneeheide-Alpenrosenbusch, Reine Lycopodium-Ausbildung mit Alnus viridis
F Schneeheide-Alpenrosenbusch, Lycopodium-Ausbildung mit Pinus mugo
G Schneeheide-Alpenrosenbusch, Amelanchier-Ausbildung mit Pinus mugo
H Schneeheide-Alpenrosenbusch, Amelanchier-Ausbildung mit Calluna
I Schneeheide-Alpenrosenbusch, Reine Amelanchier-Ausbildung mit Blechnum
J Schneeheide-Alpenrosenbusch, Reine Amelanchier-Ausbildung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AUFNAHMENUMMER	3477778 7033447 9889295	4444577888 122288000 2012114123	4455555 2611223 5878560	1133 8845 4580	1122 39944 3413	222455 399712 667090	444 248 634	4 8 1	45 75 47	3446 8343 1909
AUFNAHMEMONAT	OMSSSSO KAEFEKE TIPPPPT	MJJJJAAAAA AUUUUUUUUU INNNLGGGGG	JJJJJJJJ UUUUUUUU NLLLLL	JSS UUEE LFP	JJJJ UUUU LLLL	JAAJJJ UUUU LGLLL	JJJ UUU NNL	J U L	JA OU LG	OJJA KUUA TNGG
AUFNAHMEFLAECH (QM)	1 2232 5070000 0000000	12222 1111 5000055005 0000000000	4322121 0000500 0000000	122 5500 0000	1242 0000 0000	1 111 025000 00000	2 1 0 0 0 0	21 0 0 0 0	2 21 0500 0500	1 11 2228 8253
MEERESHOEHE (10 M)	1 11 1 290909 6854778	1111111111 1334443444 6481428720	11111111 4555555 7910797	1111 4444 5345	1111 4444 7914	1111 77744 256085	111 102 472	1 1 65	111 2228 8253	1 11 2228 8253
EXPOSITION (GRAD)	233 23 3902 92 0000000	33332 1 52448 1259 0000000000	3222 22 0389 98 0055-00	33 7642 0050	3 00-0	232 622819 000005	1 754 500	0 0 05	25 587 0000	
HANGNEIGUNG (GRAD)	4324433 0500000	4211212212 0055555000	2122 22 5050005	3443 5520	350 333233	3344 005	4 2	26 50	2233 0500	
ARTENZAHL	3735665 2258091	5665555544 7011476227	7755654 0737816	6787 6475	7576 7896	311534 667532	635 228	3 8	57 16	6324 5966
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	4323644 000000000	7255355163 0000000000	4322232 0000000	1112 0050	32 1 00 0	+ 2 + 0	5 2	+ +	21 50	2 3 50 0
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)	2 13 22 11 0 00500 00++	+ + 0 + + 0	3 1 0 ++ 5	12 2 50 0	121 7 0005 0	2 3 0	23 50			
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	2 1 3 +0+5501	1 0+1+	+++ ++	1+1+1+ 5000	1373 0000	377665 000000	175 1 000 0	2 1 + 0	171 0600	
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	6543623 0000500	1254755856 0500000000	3155358 00000000	7374 5000	7314 0000	233677 050000	767 5 000 0	63 33	4212 0005	
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	3326368 0050000	5243144156 0000000000	2221111 0500500	1357 0000	2334 0000	357143 000500	232 1 000 0	1 2 + 5	2 1 0+0	

Baumarten

Picea abies	B1	29	60.4	3312233	4233333142	3322131	1 22			1	
Picea abies	B2	29	60.4	12122	11+	4 3	1			1	
Picea abies	B3	29	60.4	+2+223+	11+	++	+ 13				
Picea abies	B4	35	55.0	2 +++	+	+					
Larix decidua	B1	2	18.7	121	+1	2	2122212	1122	32 2	2 1	11 +
Larix decidua	B2	1	18.7	1							
Larix decidua	B3	12	25.0	+							
Larix decidua	B4	1	18.7	+							
Sorbus aucuparia	B1	16	12.8	++							
Sorbus aucuparia	B2	32	12.8	+++++ 2	+ rr++	+1+	++	+1	+++	+	++
Sorbus aucuparia	B3	62	12.8								
Acer pseudoplatanus	B1	6	6.6								
Acer pseudoplatanus	B2	1	6.6								
Acer pseudoplatanus	B3	20	41.7								
Acer pseudoplatanus	B4	1	6.6								
Fagus sylvatica	B1	2	10.4								
Fagus sylvatica	B2	1	10.4								
Fagus sylvatica	B3	1	10.4								
Fagus sylvatica	B4	4	10.4								
Abies alba	B1	1	16.7								
Abies alba	B2	1	16.7								
Abies alba	B3	1	16.7								
Abies alba	B4	1	16.7								
Sorbus aria	B1	10	20.9								
Sorbus aria	B2	1	20.9								
Sorbus aria	B3	1	20.9								
Sorbus aria	B4	1	20.9								
Betula pubescens	B1	4	4.4								
Betula pubescens	B2	1	4.4								
Betula pubescens	B3	1	4.4								
Betula pubescens	B4	1	4.4								
Pinus cembra	B1	1	2.1								
Pinus cembra	B2	1	2.1								
Pinus cembra	B3	1	2.1								
Pinus cembra	B4	1	2.1								

[illegible]

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AUFNAHMENUMMER		3477778	4444577888	4455555	1133	1122	222455	444	4	45	3446
		703347	12222880	211223	8846	9846	332222	348	25	8	3
		9889293	2012114123	3878560	4580	3413	667090	634	1	47	1909
Blockschuttbesiedler											
Kormophyten:											
K1	Huperzia selago	26	54.2	1r	+1+	+++	++++	+	+++++1		
	Polystichum lonchitis	16	33.5		+	1+	1r	+	++++r	11+	+
	Asplenium viride	13	29.1		+	+	+	+	++++	+	+
K1	Polypodium muscosa	13	29.1		+	+	+	+	++++	+	+
	Clematis alpina	13	29.1		+	+	+	+	++++	+	+
	Campanula cochleariifolia	13	29.1		+	+	+	+	++++	+	+
	Lonicera nigra	10	20.8		+	+	+	+	++++	+	+
Thallophyten:											
	Tortella tortuosa	37	77.1	111121	+22+	+1+	+	2222221	+1+	+21	
	Ctenidium molluscum	27	56.5	1	121	+22+	+1+	221	+1	1	+
	Fissidens cristatus	22	56.5	1	+	+	+	+	+	+	+
	Scapania aequiloba	22	45.8	1	+	+	+	+	+	+	+
	Cladonia cf. furcata	15	33.3	1	+	+	+	+	+	+	+
	Schistidium apocarpum	15	33.3	1	+	+	+	+	+	+	+
	Trentepohlia aurea	17	14.6	1	+	+	+	+	+	+	+
	Scapania aspera	17	14.6	1	+	+	+	+	+	+	+
	Funaria thomsonii	5	10.4								
Weidezeiger											
	Ranunculus montanus	16	33.3								
	Galium anisophyllum	16	33.3								
	Leontodon hispidus	14	29.9								
	Selaginella selaginoides	10	16.9								
	Senecio abrotanifolius	6	12.5								
	Nardus stricta	5	10.4								
Klass.Char.:											
K1	Vaccinio-Piceetea										
	Picea abies	38	79.2	3312233	4233333143	3322131	123	r	++		
	Homogyne alpina	26	75.0	1121+	11121222	122122	2	12r	21+	1	+
	Larix decidua	34	70.8	2	12+2	1	+	2	1222	32+2	
	Rhytidadelphus loreus	14	14.9	1	+	+	+	+	+	+	+
	Luzula lucida	14	14.9	1	+	+	+	+	+	+	+
	Plagiothecium undulatum	14	10.4	1	+	+	+	+	+	+	+
	Vaccinium uliginosum	14	10.4	1	+	+	+	+	+	+	+
	Pyrola secunda	14	10.4	1	+	+	+	+	+	+	+
	Pyrola uniflora	14	10.4	1	+	+	+	+	+	+	+
	Pyrola cf. rotundifolia	14	10.4	1	+	+	+	+	+	+	+
	Cornicularia stricta	14	10.4	1	+	+	+	+	+	+	+
	Hylocomium umbratum	1	2.1								
K2	Erico-Pinetea										
	Calamagrostis varia	42	87.5	222121+	11+12	22	1	1121+11	2211	121	+
	Erica herbacea	20	45.7	1	111+	1112	+	211	1	1	+
	Sorbus chamaebuxus	20	45.7	1	+	+	+	+	+	+	+
	Carex alba	2	10.4	1	+	+	+	+	+	+	+
	Epipactis atrorubens	2	4.2	1	+	+	+	+	+	+	+
sonstige Kormophyten:											
	Vaccinium myrtillus	46	95.8	2222122	2323321233	3233222	3+34	4313	23244	3	2
	Valeriana tripteris	41	85.4	+++11+	1	+++11+	+++11+	+++11+	+++11+	+++11+	+++11+
	Solidago virgaurea	40	83.3	1111111	1+11+111	1+11	1	11	111	1	+
	Sorbus aucuparia	40	83.3	+++11+	1	+++11+	+++11+	+++11+	+++11+	+++11+	+++11+
	Hieracium sylvaticum	39	86.7	+2+1	+++11+	111	2	+	+	+	+
	Oxalis acetosella	38	69.7	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Rosa pendulina	27	56.3	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Sesleria varia	27	56.3	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Gymnocarpium drobopteris	26	54.7	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Rubus saxatilis	26	54.7	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Prenanthes purpurea	24	50.0	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Acer pseudoplatanus	23	47.3	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Athrium filix-femina	23	47.3	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Dryopteris austriaca s.str.	22	45.8	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Abies alba	20	41.7	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Veronica utricifolia	18	37.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Fraxina vesca	18	37.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Carex digitata	18	37.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Gentiana asclepiadea	17	35.4	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Aposotis foetida	17	35.4	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Gymnocarpium robertianum	13	27.1	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Maianthemum bifolium	12	25.0	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Hypericum maculatum	11	22.9	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Sorbus aria	11	22.9	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Polygonatum verticillatum	10	20.8	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Carex ferruginea	8	16.7	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Soldanella alpina	8	16.7	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Cystopteris fragilis	8	16.7	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Lamium galeobdolon	8	16.7	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Melica nutans	7	14.6	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Lysimachia nemorum	7	14.6	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Heliosperma quadridentatum	7	14.6	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Carduus defloratus	7	14.6	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Valeriana montana	7	14.6	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Agrostis alpina	7	14.6	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Phyteuma orbiculare	7	14.6	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Galium album	7	14.6	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Tofieldia calyculata	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Peucedanum ostruthium	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Crepis paludosa	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Hieracium austriacum	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Asplenium ruta-muraria	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Lonicera alpigena	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Veronica officinalis	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Deschampsia flexuosa	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Carex flacca	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Carex brachystachys	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Myosotis muralis	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Lilium martagon	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Anthoxanthum odoratum	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Polystichum lobatum	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Ajuga reptans	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Senecio fuchsii	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Veronica chamaedrys	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Aconitum vulpina	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Scabiosa columbaria	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+
	Luzula alabata	6	12.5	+++1+	1+1+1+	1+	+	+	+	+	+

AUFNAHME-NUMMER	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3477778	4444577888	44555555	1133	1122	222455	444	4	45	3446	
7033447	1222288000	2611223	8845	9944	595712	348	8	75	8343	
9889293	2012114123	3878560	4580	3413	667090	634	1	47	1909	
Juncus trifidus ssp. hostii					++ 2					
Valeriana saxatilis							+	+		
Viola riviniana + reichenb.										
Thelypteris phegopteris	+									
Origanum vulgare										
Euphrasia salisburgensis			+							+
Luzula pilosa							r			
Polypodium vulgare					r					
Asplenium trichomanes										
Anselica sylvestris										
Cicerbita alpina										
Veronica fruticans										
Poa alpina										
Deschampsia caespitosa										
Agrostis rupestris										
Cardamine flexuosa										
Silene vulgaris										
Aconitum napellus										
Carex firma										
Festuca ovina										
Salix glabra										
Carex sempervirens										
Thymus polytrichus (sp.)										
Laserpitium latifolium										
Euphrasium salicifolium										
Molinia arundinacea										
Steghus alopecurus										
Centaurea montana										
Pinquicula sp.										
Lonicera xylosteum										
Calycocorus stipitata										
Veratrum album										
Thesium alpinum										
Ranunculus plataniifolius										
Veronica aphylla										
Polygala alpestris										
Urtica dioica										
Molanderium rubrum										
Polygala amarella										
Arabis alpina										
Ranunculus robertianum										
Dianthus superbus										
Polygonum viviparum										
Chasmodon hirsutum										
Poa hybrida										
Dracopis villarii										
Thalictrum aquilegifolium										
Drvas octopetala										
Hieracium villosum										
Carex capillaris										
Carex ornithopodioides										
Cystopteris montana										
Parnassia palustris										
Potentilla aurea										
Arabis pumila										
Pedicularis rostrato-spicata										
Carlina acaulis										
Ligusticum mutellina										
Hieracium sp.										
Pinus sylvestris										
Betula pendula										
Calamagrostis alpina										
Platanthera bifolia										
Neottia nidus-avis										
Ranunculus repens										
Lotus corniculatus										
Cirsium palustre										
Eupatorium cannabinum										
Dactylorhiza maculata										
Agrostis tenuis										
Helleborus niger										
Fraxinus excelsior										
Convallaria majalis										
Polygonatum multiflorum										
sonstige Thallophyten:										
Dicranum scoparium	40	83.3	12 1 2+	1++	22+22	+1++11+	+12	1111	112+11	1+1
Hylacomium splendens	33.3	68.4	+12222+	1	21		+12	1222	233+121	232
Rhytidiadelphus triquetrus	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Trichum tomentosum	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Plagiochila asplenoides	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Pleurozium schreberi	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Lobelia pulchella (sp.)	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Blepharostoma trichophyllum	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Thuidium tamariscinum	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Rhizomnium punctatum	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Cladonia sp.	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Calypogeia trichomanis	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Peltigera leucophlebia	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Campylidium hauseri	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Campylidium stellatum	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Plagiomnium undulatum	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Barbilophozia parvula	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Plagiomnium affine s.str.	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Plagiomnium rostratum	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Solitaria sacata	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Conocephalum conicum	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Hypnum callichroum	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Barbilophozia sp. (hatcheri)	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Plagioteichium denticulatum/sp.	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Brachythecium sp.	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Brachythecium (sp.)	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Schreberia minutus	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Ditrichum flexicaule	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Leptodermis piliferum	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Eurhynchium striatum	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Metzgeria pubescens	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Collema sp.	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Plagiopus oederi	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Peltigera sp.	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Leptodermis reptans	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Trichomanes exsecta	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Brum elegans	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Brum sp.	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Rhynchostegium murale	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232
Brum capillare aqg.	33.3	68.4	1++1+	1	21		+12	1222	233+121	232

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AUFNAHMENUMMER	3477778	4444577888	4455555	1133	1122	222455	444	4	45	3446
	7033447	1222288000	2611223	8845	9944	399712	348	8	75	8343
	9889293	2012114123	3878560	4580	3413	667090	634	1	47	1909
Lophozia obtusa					++					
Saniouia uncinata						1+				
Cratoneuron commut. sulcatum										
Chiloscyphus pallidus										
Pannaria pezizoides										
Bazzania flaccida										
Leiocolea muelleri										
Barbula crocea (sp.)										
Leucobryum glaucum										
Plagiomnium cuspidatum										
Neckera crispa										
Pohlia cruda										
Preissia quadrata										
Cirriophyllum tenuinerve										
Brachythecium rutabulum (sp.)										
Plagiothecium sp.										
Pseudoleskea incurvata										
Peltigera praetextata										
Bryum flaccidum										
(cf) Lophozia guttulata										
Pellia epiphylla										
Hypnum sauteri										
Rhytidiadelphus squarrosus										
Polypodium juniperinum										
Brachythecium salebrosum (sp.)										
Anastrophyllum michauxii										
Cratoneuron commutatum										
Cephaezia cf. loitlesbergeri										
Barbilophozia attenuata										
Pseudoleskeella catenulata										
Dicranum fuscoscens										
Lophocolea bidentata										
Fissidens adianthoides										
Hypnum cupressiforme										
Lophozia ventricosa										
Calypogeia muelleriana										
Isotervium muellerianum/sp.										
Pedinophyllum interruptum										
Rhacomitrium canescens										
Metzgeria conigata										
Rhodobryum roseum										
AUFNAHMENUMMER	3477778	4444577888	4455555	1133	1122	222455	444	4	45	3446
	7033447	1222288000	2611223	8845	9944	399712	348	8	75	8343
	9889293	2012114123	3878560	4580	3413	667090	634	1	47	1909

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN

TABELLE 12: ALPENDOSTFLUR (Adenostylis-Cicerbitetum)
GRUENERLENBUSCH (Alnetum viridis)

- A Alpendostflur, Reine Petasites-Ausbildung
B Alpendostflur, Petasites-Ausbildung, Schlaefliur
C Alpendostflur, Reine Heliosperma-Ausbildung
D Alpendostflur, Heliosperma-Ausbildung mit Moehringia
E Gruenerlenbusch

	A	B	C	D	E
AUFNAHMENUMMER	1122778 5848790 4861965	18 55 21	138 846 979	1111112 8888994 1236122	337 440 454
AUFNAHMEMONAT	JJJAAAA UUUUUU LLL6666	JS UE NP	JSS UFE LPP	JJJJJJJ UUUUUUU LLLLLLL	SSS FFF PPP
AUFNAHMEFLAECH (QM)	32 2312 0050000 0000000	21 121 00 000 00 000	121 121 0055000 0000000	221 221 0055000 0000000	221 221 0055000 0000000
MEERESHOEHE (10 M)	1111111 1343443 7927342	11 111 13 444 21 162	111 111 3343444 5915472	111 111 444 444 894	111 111 444 444 894
EXPOSITION (GRAD)	3 33 5245 00050--	3 33 80 44 00 00-	3 33 24 53 0000000	3 33 3 33 0000000	3 33 3 33 0000000
HANGNEIGUNG (GRAD)	23232 5005500	23 33 50 550	33 333 5355050	333 333 5355050	444 444 505
ARTENZAHL	6346433 2808412039064	63 463 1092492740409	463 7668566 563	563	
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	11 +00	+	1 0 0 000	111 +05 000	232 600
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)	1 0		1 1 0 055	3 +0	
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	1 0+ +	1 51	1 0 5+ +050+	1 1 000	233 600
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	9888090 0000000	1 1 80 790 00 000	1 1 5767677 0000000	976 000	
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	13 3743 0550000	1 332 02 050	3342333 0005000	213 500	

Baumarten	B1	10	45.5	+21	1	11+	+ 23
Picea abies	10	15	31.8	1	+	111	++
Picea abies	10	15	31.8	1	+	111	++
Picea abies	10	15	31.8	1	+	111	++
Larix decidua	10	15	31.8	1	+	111	++
Larix decidua	10	15	31.8	1	+	111	++
Larix decidua	10	15	31.8	1	+	111	++
Larix decidua	10	15	31.8	1	+	111	++
Acer pseudoplatanus	10	15	31.8	1	+	111	++
Acer pseudoplatanus	10	15	31.8	1	+	111	++
Acer pseudoplatanus	10	15	31.8	1	+	111	++
Acer pseudoplatanus	10	15	31.8	1	+	111	++
Sorbus aucuparia	10	15	31.8	1	+	111	++
Sorbus aucuparia	10	15	31.8	1	+	111	++
Sorbus aucuparia	10	15	31.8	1	+	111	++
Sorbus aucuparia	10	15	31.8	1	+	111	++
Fagus sylvatica	10	15	31.8	1	+	111	++
Fagus sylvatica	10	15	31.8	1	+	111	++
Fraxinus excelsior	10	15	31.8	1	+	111	++
Betula pubescens	10	15	31.8	1	+	111	++

Straucharten	S	5	22.7	1	+	+	232
Alnus viridis	S	5	22.7	1	+	+	232
Rubus idaeus	S	5	22.7	1	+	+	232
Rosa pendulina	S	5	22.7	1	+	+	232
Ribes alpina	S	5	22.7	1	+	+	232
Daphne mezereum	S	5	22.7	1	+	+	232
Lonicera alpigena	S	5	22.7	1	+	+	232
Clematis alpina	S	5	22.7	1	+	+	232
Sorbus chamaemespilus	S	5	22.7	1	+	+	232
Salix appendiculata	S	5	22.7	1	+	+	232

V

Verb. Char.:	3	13.6	1	2	+
Peucedanum ostruthium	3	13.6	1	2	+
Salix appendiculata	3	13.6	1	2	+

		A B C D E				
AUFNAHMENUMMER		1122778	18	138	1111112	337
		5348790	35	846	8888999	440
		4861965	21	979	1236122	454
Ass.Char.:						
Alnus viridis		5	22.7		+	232
Diff.Ass.:						
O.K	Viola biflora	20	90.9	12212+1	+1	21
O.K	Adonis vernalis	20	90.9	53454	2222122	11
O.K	Saxifraga rotundifolia	19	86.4	12212+	12	232
	Crepis paludosa	15	68.2	+111+	1	1+1
	Gaum rivale	15	68.2	+11+	+1	1+1
K2	Dentaria enneaphyllos	13	59.1	+1	+1	1111111
O.K	Mvosotis sylvatica	9	40.9	2	1	+111
K2	Aconitum vulpina	11	50.0	13+	r	+
V	Doronicum austriacum	15	22.7	2	+	22
K2	Stellaria nemorum	18	91.8	1211223	12	122
	Conceophalum conicum	14	82.8	11+12	1	11
K2	Chrysosplenium alternifolium	13	59.1	21	222	1+2
	Cardamine amara	11	50.0	121	1	2+
	Cirriophyllum piliferum	9	40.9	+2	1	1+1
O.K	Primula elatior	5	22.7		+	111
	Cicerbita alpina	4	18.2			122
	Pellia epiphylla	2	9.1			12
	Hypnum callichroum	1	4.5			+
	Fissidens taxifolius	1	4.5			+
Diff.Ausb.:						
Petasites albus		8	36.4	5	21 1 22	22
Pellia endiviaefolia		7	31.6	1	2111	+1
Chiloscyphus pallascens		6	27.5		+1+	+1
O.K	Poa hybrida	10	45.5		+	22
	Heliosperma quadridentatum	10	45.5		+	1112 1
	Arabis alpina	10	45.5		+	1+
	Carex ferruginea	9	40.9	1 2	1+	1+
	Luzula diabata	9	40.9		1+	2++111
Blockschuttbiesiedler						
Kormophyten:						
	Aster bellidiflorus	11	50.0	++	1	1+1111+
	Campanula scheuchzeri	11	50.0	++	++	1111+1+
	Polystichum lonchitis	11	50.0	++	++	1111+1+
	Knaulia dipsacifolia	9	40.9	+	1	++
	Ranunculus montanus	9	40.9	+	1	1+1222
	Galium anisophyllum	7	21.6	+		++
K2	Gymnocarpium diopteris	7	21.6	+		1+1
	Leontodon hispidus	6	18.2	r		1+1
	Vaccinium myrtillus	6	18.2	+		++
	Valeriana tripteris	6	18.2	+		++
	Poa alpina	6	18.2	+		++
	Homogyne alpina	6	18.2	+		++
	Moshrindia muscosa	5	15.3	+		++
	Asplenium viride	5	15.3	+		++
	Cystopteris montana	4	12.2	+		++
	Sesleria varia	4	12.2	+		++
	Selaginella selaginoides	4	12.2	+		++
	Rhododendron hirsutum	4	12.2	+		++
Thallophyten:						
	Ctenidium molluscum	11	50.0	+	1	+
	Tortella tortuosa	8	36.4	+		2321222
	Rhynchostegium murale	8	36.4	++		1+1111
	Hylacomium splendens	7	31.8	++		++
	Scapania seculifolia	7	31.8	+		++
	Dicranum scoparium	7	31.8	+		++
	Rhytidadelphus triquetrus	6	27.3	+		++
	Camplium stellatum	4	18.2	+		++
	Schistidium apocarpum	3	13.6	+		++
Schlaepflanzen						
	Poa trivialis	4	18.2		+	+
K2	Rubus idaeus	2	9.1		1	+
K2	Geranium robertianum	1	4.5		1	+
	Scrophularia nodosa	1	4.5		r	+
	Mycelis muralis	1	4.5		+	+
	Ranunculus repens	1	4.5		+	+
	Russula farfara	1	4.5		+	+
O.K	Ord. u. Klass.Char.:					
	Geranium sylvaticum	18	91.8	1+1+1+	+	42
	Rumex alpestris	11	50.0	+2	231	+11
	Epilobium alpestre	13	59.1	++		++
	Athyrium distentifolium	9	40.9	11		+
	Luzula alpina	9	40.9	+		+
	Rosa pendulina	2	9.1		+	r
Begleiter aus der Klasse						
K2	Quercus-Fagetea					
	Epilobium montanum	13	59.1	++	1+	++
	Acer pseudoplatanus	11	50.0	1+	++	++
	Apocynum foetidum	11	50.0	+11	1	1+1
	Lamium albidifolium	11	50.0	11+	+	++
	Phytolacca spicata	9	40.9	+		++
	Paris quadrifolia	9	40.9	+		++
	Dryopteris filix-mas	9	40.9	1	+	++
	Veronica urticifolia	9	40.9	1	+	++
	Atrichum undulatum	9	40.9	+		++
	Thalictrum aquilegifolium	9	40.9	+		++
	Fagus sylvatica	9	40.9	+		++
	Mercurialis perennis	9	40.9	+		++
	Adiantum undulatum	9	40.9	+		++
	Polystichum lobatum	9	40.9	+		++
	Melica nutans	9	40.9	+		++
	Carex sylvatica	9	40.9	+		++
	Streptopus amplexifolius	9	40.9	+		++
	Brachypodium sylvaticum	9	40.9	+		++
	Geum urbanum	2	9.1	+		++

		A	B	C	D	E
AUFNAHMENUMMER		1122778	18	138	1111112	337
		5848790	35	846	8888994	440
		4861965	21	979	1236122	454
Adoxa moschatellina	4.9		+			1
Circaea intermedia	4.4	+				
Lilium martagon	4.4	r				
Eurhynchium striatum	4.4					
Ranunculus lanuginosus	4.4		I			
Ribes alpinum	4.4					
Sanicula europaea	4.4		+			
Impatiens noli-tangere	4.4		+			
Thapsus mezereum	4.4		+			
Salvia glutinosa	4.4		+			
Stachys sylvatica	4.4			2		
Elymus europaeus	4.4					
Lonicera alpidigena	4.4			+		
Fraxinus excelsior	4.4				r	
Carex digitata	4.4					+
Actaea spicata	4.4					+
Prenanthes purpurea	4.4					+
Polygonatum verticillatum	4.4					+

sonstige Kormophyten:

Cherophyllum hirsutum	21	95.95	21	2313	23	223	1221122	112
Alchemilla vulgaris	20	90.9	11	1123	++	22	22	111
Senecio jacobae	18	81.8	11	1123	++	22	22	111
Athyrum filix-femina	17	77.7	11	1123	++	22	22	111
Picea abies	17	77.7	11	1123	++	22	22	111
Cardamine flexuosa	15	65.6	11	1123	++	22	22	111
Oxalis acetosella	15	65.6	11	1123	++	22	22	111
Hypericum maculatum	14	54.5	11	1123	++	22	22	111
Soldanella alpina	14	54.5	11	1123	++	22	22	111
Luzula sylvatica s.l.	14	54.5	11	1123	++	22	22	111
Larix decidua	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Lysimachia nemorosus	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Ranunculus nemorosus	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Sorbus aucuparia	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Helandrium rubrum	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Poa nemoralis	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Calamagrostis varia	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Urtica dioica	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Rumex alpinus	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Cystopteris fragilis	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Ajuga reptans	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Veronica chamaedrys	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Veratrum album	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Solidago virgaurea	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Gymnocarpium robertianum	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Trollius europaeus	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Aconitum napellus	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Deschampsia caespitosa	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Gentiana asclepiadea	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Lamium maculatum	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Dryopteris austriaca s.str.	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Galium album	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Festuca rubra	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Heracleum austriacum	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Heracleum sylvaticum	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Thalictrum flavum	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Silene vulgaris	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Gentiana pannonica	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Calamagrostis villosa	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Poa supina	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Acrostis stolonifera	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Caltha palustris	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Dactylis glomerata	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Heracleum sphondylium elegans	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Adenostyles glabra	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Dryopteris villarii	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Luzula luzulina	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Rupertia selago	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Campanula cochleariifolia	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Juncus trifidus ssp. hostii	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Potentilla erecta	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Vicia sepium	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Pedicularis recutita	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Cardus pinnatifidus	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Arisaema	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Euphorbia cyparissias	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Origanum vulgare	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Poa pratensis	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Myosotis palustris	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Valeriana montana	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Trifolium pratense	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Achillea millefolium	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Festuca arundinacea	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Phleum alpinum	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Dactylorhiza maculata	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Carex brachystachys	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Agrostis alpina	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Veronica beccabunga	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Betula pubescens	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Clematis alpina	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Rubus saxatilis	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Sorbus chamaemespilus	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Leucorchis albida	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Ranunculus alpestris	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Alchemilla hoppeana	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Phodanthus chamaecistus	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Pinguicula sp.	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Phytolacca orbiculare	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Carex sempervirens	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Saxifraga stellaris	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Polygonum viviparum	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Corallorhiza trifida	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Gentiana montana	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Deschampsia flexuosa	13	43.4	11	1123	++	22	22	111
Cirsium oleraceum	13	43.4	11	1123	++	22	22	111

		A	B	C	D	E
AUFNAHME-NUMMER		1122778	18	138	1111112	337
		5868790	35	846	8888994	440
		4861965	21	979	1236122	454
sonstige Thallophten:						
Plagiocliphila asplenoides	17	77.3	+	+22	+	+1
Rhizomnium punctatum	18	50.0	+	+	+1	+2
Brachythecium rutabulum (sp.)	19	40.9	+	+	+	1
Rhizomnium punctatum	20	40.9	13	2+3	1	25
Rhizidiadiaphus squarrosus	21	31.8	+	+	+	2
Brachythecium salebrosum (sp.)	22	22.7	+	+	+	+
Dichodontium delucidum	23	22.7	+	+	+	+
Mnium thomsonii	24	18.2	+	+	+	+
Brachythecium velutinum (sp.)	25	18.2	+	+	+	+
Mnium cruda	26	18.2	+	+	+	+
Plagiothecium denticulatum/sp.	27	18.2	+	+	+	+
Rhizidiadiaphus loreus	28	18.2	+	+	+	+
Rhizomnium marginatum	29	18.2	+	+	+	+
Polytrichum formosum	30	13.6	+	+	+	+
Pladonia sp.	31	13.6	+	+	+	+
Pseudocolea incurvata	32	9.1	1	1	1	2
Cratoneuron commut. sulcatum	33	9.1	1	1	1	2
Scapania sp.	34	9.1	1	1	1	2
Pohlia wahlenbergii	35	9.1	1	1	1	2
Bryum sp.	36	9.1	1	1	1	2
Bryum pseudotriquetrum	37	9.1	1	1	1	2
Lophozia ventricosa	38	9.1	1	1	1	2
Fissidens cristatus	39	9.1	1	1	1	2
Plagiostoma trichophyllum	40	9.1	1	1	1	2
Sanitaria uncinata	41	9.1	1	1	1	2
Cratoneuron commutatum	42	9.1	1	1	1	2
Brachythecium glareosum	43	9.1	1	1	1	2
Fissidens bryoides	44	9.1	1	1	1	2
Plagiomnium rostratum	45	9.1	1	1	1	2
Cratoneuron decipiens	46	9.1	1	1	1	2
Plagiotoechium sp.	47	9.1	1	1	1	2
cf Brachythecium populeum	48	9.1	1	1	1	2
Bryum schleicheri	49	9.1	1	1	1	2
Plagiomnium elatum	50	9.1	1	1	1	2
Tayloria serrata	51	9.1	1	1	1	2
Trentepohlia aurea	52	9.1	1	1	1	2
Orthotrichum rufescens	53	9.1	1	1	1	2
Peltidiera sp.	54	9.1	1	1	1	2
Peltidiera leucophlebia	55	9.1	1	1	1	2
Lophozia obtusa	56	9.1	1	1	1	2
Narchantia polymorpha	57	9.1	1	1	1	2
Pleurozium schreberi	58	9.1	1	1	1	2
Tritomania quinqueidentata	59	9.1	1	1	1	2
Brachythecium rivulare	60	9.1	1	1	1	2
Pleurozia bidentata	61	9.1	1	1	1	2

AUFNAHMENUMMER	1122778	18	138	1111112	337
	5848790	35	846	8888994	440
	4861965	21	979	1236122	454

M. Storch 1983 NATIONALPARK BERCHTESGADEN

TABELLE 13: POST-BUNTREITGRASFLUR
(Origanum-Calamagrostietum)

A Viola biflora-Ausbildung
B Reine Ausbildung

	A	B
AUFNAHMENUMMER	11 0111223 36 7332116 31 0567679	
AUFNAHMEMONAT	JJ JJJJJJS UU UUUUUUE NL NNNNLLP	
AUFNAHMEFLAECH (QM)	22 2212123 00 0050500 00 0000000	
MEERESHÖHE (10 M)	11 1111111 13 1121120 40 0908807	
EXPOSITION (GRAD)	11 111 02 6000978 00 0000000	
HANGNEIGUNG (GRAD)	33 333443 00 8550550	
ARTENZAHL	56 4553567 22 9929548	
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	5 1 2 3 7 0+ 0 0 0 0	
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)	+ 4 0 +	
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	5+ 1 111 0+++000	
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	47 4825594 00 0000000	
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	22 3221 13 00 0000+00	

Baumarten

Picea abies	B1	33	3	1	2	1	+
Picea abies	B2	33	3	1	2	1	+
Picea abies	S	100	0	1	1	+	121
Picea abies	K	44	4	+	+	+	+
Fagus sylvatica	B1	33	3	2	+	+	+
Fagus sylvatica	B2	33	3	2	+	+	+
Fagus sylvatica	S	44	4	+	+	+	+
Fagus sylvatica	K	33	3	+	+	+	+
Acer pseudoplatanus	B1	33	3	3	1	+	+
Acer pseudoplatanus	B2	33	3	3	1	+	+
Acer pseudoplatanus	S	55	5	+	1	+	4
Fraxinus excelsior	B1	22	2	+	1	+	+
Fraxinus excelsior	B2	22	2	+	1	+	+
Fraxinus excelsior	S	11	1	+	1	+	+
Fraxinus excelsior	K	66	6	+	+	+	+
Larix decidua	B1	11	1	+	+	+	+
Larix decidua	S	11	1	+	+	+	+
Larix decidua	K	11	1	+	+	+	+

Straucharten

Daphne mezereum	S	33	3	+	r	+	+
Rubus idaeus	S	33	3	+	r	+	+
Pinus mugo	S	11	1	+	r	+	+
Pinus alba	S	11	1	+	r	+	+
Sambucus racemosa	K	11	1	+	r	+	+
Clematis alpina	K	11	1	+	r	+	+

Diff. Ges.:

Origanum vulgare	9	100	0	+1	11	+	1122
Eupatorium cannabinum	9	88	8	+	12	+	1+2+
Poa nemoralis	9	88	8	+	12	+	1+2+
Fagus sylvatica	7	77	7	2	+	+	+
Polystichum lobatum	7	77	7	+	1	+	11+
Carduus defloratus	7	77	7	1	+	+	1+
Campanula trachelium	7	77	7	+	+	+	+
Calamintha alpina	6	66	6	+	21	+	1+
Arabis hirsuta	6	66	6	+	+	+	+
Sedum album	6	66	6	+	+	+	+
Aconitum napellus	5	55	5	1	+	+	+
Vincetoxicum hirsutaria	5	55	5	+	+	+	+
Centaurea montana	5	55	5	+	+	+	+
Arabis ciliata	5	55	5	r	1	r	+
Carex sempervirens	5	55	5	+	+	+	+
Stachys alopecurus	5	55	5	1	+	+	+

AUFNAHMENUMMER	A		B	
	11	0111223		
	36	7333116		
	31	0567679		

Diff.Ausb.:

Schistidium apocarpum	4	44.4	11	+	1
Sesleria varia	2	22.2	r	+	+
Ranunculus montanus	2	22.2	1	+	+
Dentaria enneaphyllos	2	22.2	1	+	+
Viola biflora	2	22.2	1	+	+
Stellaria nemorum	2	22.2	1	+	+

Klass.Char.:

Gymnocarpium robertianum	8	88.9	2+	2+	+++
Adiantum glabra	2	22.2	+	2	++
Arabis alpina	2	22.2	r	+	+
Campanula cochleariifolia	2	22.2	1	+	+
Polystichum lonchitis	2	22.2	+	r	+
Rumex scutatus	1	11.1	1		

sonstige Kormophyten:

Picea abies	9	100.0	1+	1+2+121	
Galium album	9	100.0	++	1111++1	
Senecio fuchsii	9	100.0	11	11++212	
Calamagrostis varia	9	100.0	12	2221122	
Lamium galeobdolon	8	88.9	1+	1+1+1	
Moehringia muscosa	8	88.9	++	11++1	
Geranium robertianum	8	88.9	++	11++1	
Acer pseudoplatanus	7	77.8	21	1+1+4	
Quercus vesca	7	77.8	r	++1+1	
Mycelis muralis	7	77.8	+	++1+1	
Myosotis sylvatica	7	77.8	2	2+211+	
Fraxinus excelsior	6	66.7	+	++1+1	
Euphorbia cyparissias	6	66.7	1	12311	
Brachypodium pinnatifidum	6	66.7	+	++22	
Ajuga reptans	6	66.7	+	1++	
Veronica chamaedrys	6	66.7	1	1++	
Asplenium trichomanes	6	66.7	+	rrrr+	
Ranunculus nemorosus	6	66.7	++	++11	
Epilobium montanum	5	55.6	+	r1	++
Mercurialis perennis	5	55.6	+	1	++
Chaerophyllum hirsutum	4	44.4	+	1	++
Lysimachia nemorum	4	44.4	+	+	1+
Malva nutans	4	44.4	+	++1	
Athyrium filix-femina	4	44.4	+	r	1+
Urtica dioica	4	44.4	+	++	1
Carex digitata	4	44.4	+	1	21
Salvia glutinosa	4	44.4	+	++	++
Solidago virgaurea	4	44.4	+	++	++
Viola riviniana + reicherb.	4	44.4	+	++	++
Aposotis foetida	3	33.3	+	+	++
Oxalis acetosella	3	33.3	+	+	1+
Thesium alpinum	3	33.3	r	r	++
Galium anisophyllum	3	33.3	+	++	++
Campanula scheuchzeri	3	33.3	+	++	++
Pimpinella major	3	33.3	+	1	++
Moehringia trinervia	3	33.3	+	+	++
Carex sylvatica	3	33.3	+	+	++
Lilium martagon	3	33.3	+	+	++
Calamagrostis alpina	3	33.3	+	++	++
Tussilago farfara	3	33.3	+	++	++
Prenanthes purpurea	2	22.2	r	+	++
Poa trivialis	2	22.2	+	+	++
Maianthemum bifolium	2	22.2	+	+	++
Poa pratensis	2	22.2	1	1	++
Hippocrepis comosa	2	22.2	+	+	++
Larix decidua	2	22.2	+	+	++
Hypericum maculatum	2	22.2	+	+	++
Cystopteris fragilis	2	22.2	+	+	++
Lotus corniculatus	2	22.2	+	+	++
Geranium sylvaticum	2	22.2	+	+	++
Scabiosa columbaria	2	22.2	+	+	++
Dryopteris filix-mas	2	22.2	+	+	++
Knaulia dipsacifolia	2	22.2	r	+	++
Festuca rubra	2	22.2	+	+	++
Cardamine flexuosa	2	22.2	+	+	++
Ranunculus acris	2	22.2	++	+	++
Laserpitium latifolium	2	22.2	r	+	++
Euphrasia asperifolia	2	22.2	+	+	++
Listera ovata	2	22.2	+	+	++
Polypodium vulgare	2	22.2	1	1	++
Polypodium aureum	2	22.2	1	1	++
Geum urbanum	2	22.2	r	+	++
Scrophularia nodosa	2	22.2	+	+	++
Hepatica nobilis	2	22.2	1	1	++
Phyteuma spicatum	2	22.2	+	+	++
Veronica urticifolia	2	22.2	+	+	++
Galeopsis tetrahyx	2	22.2	+	+	++
Circaea intermedia	2	22.2	++	+	++
Carex flacca	2	22.2	++	+	++
Festuca gigantea	2	22.2	++	+	++
Aconitum vulpina	1	11.1	+	+	++
Lathyrus pratensis	1	11.1	+	+	++
Vicia sepium	1	11.1	+	+	++
Galium odoratum	1	11.1	2	+	++
Crepis paludosa	1	11.1	+	+	++
Paris quadrifolia	1	11.1	+	+	++
Pinus mugo	1	11.1	+	+	++
Saxifraga rotundifolia	1	11.1	+	+	++
Alchemilla vulgaris	1	11.1	+	+	++
Geum rivale	1	11.1	+	+	++
Trifolium repens	1	11.1	+	+	++
Rumex alpestris	1	11.1	2	+	++
Helandrium rubrum	1	11.1	+	+	++
Leontodon hispidus	1	11.1	+	+	++
Luzula luzulina	1	11.1	1	+	++
Carex ferruginea	1	11.1	+	+	++
Kernera saxatilis	1	11.1	+	+	++
Lamium maculatum	1	11.1	+	+	++
Potentilla reptans	1	11.1	+	+	++
Trifolium pratense	1	11.1	r	+	++
Viola hirta	1	11.1	r	+	++
Sambucus racemosa	1	11.1	r	+	++
Festuca pratensis	1	11.1	+	+	++
Asplenium viride	1	11.1	+	+	++
Clematis alpina	1	11.1	+	+	++
Alchemilla homopsea	1	11.1	+	+	++

AUFNAHMENUMMER

	11	0111223		
	36	7333116		
	31	0567679		
Hieracium sylvaticum	1	11.1	+	
Corallorhiza trifida	1	11.1	r	
Epipactis atrorubens	1	11.1	+	
Silene nutans	1	11.1	+	
Verbascum thapsus	1	11.1	r	+
Valeriana tripteris	1	11.1	+	
Senecio abrotanifolius	1	11.1	+	
Thalictrum aquilegifolium	1	11.1	r	r
Anemone silvestris	1	11.1	+	
Hieracium austriacum	1	11.1	+	
Silene vulgaris	1	11.1	+	
Prunella vulgaris	1	11.1	+	
Cirsium palustre	1	11.1	+	
Sanicula europaea	1	11.1	+	
Euphorbia amygdaloides	1	11.1	1	
Gentiana ciliata	1	11.1	+	
Verbascum nigrum	1	11.1	+	

sonstige Thallophyten:

Tortella tortuosa	9	100.0	12	22++22	
Ctenidium molluscum	9	100.0	2	2+2	2
Brachythecium sp.	8	88.9	+	1+	+
Pseudoleskea incurvata	4	44.4	2	++	+
Dicranum scoparium	4	44.4	+	++	+
Hylocomium splendens	4	44.4	+	++	+
Rhizidium punctatum	3	33.3	+	1	+
Rhizidium punctatum	3	33.3	+	1	+
Peltigera sp.	2	22.2	2	+	++
Cladonia pyxidata (sp.)	2	22.2	1	+	++
Rhizidium punctatum	2	22.2	+	+	++
Entodon concinnus	1	11.1	+	+	++
Thuidium tamariscinum	1	11.1	2	+	++
Rhizidium punctatum	1	11.1	+	+	++
Fissidens cristatus	1	11.1	+	+	++
Plagiochila asplenoides	1	11.1	+	+	++
Brachythecium velutinum (sp.)	1	11.1	+	+	++
Barbilophozia barbata	1	11.1	+	+	++
Scapania aspera	1	11.1	+	+	++
Campanula punctatum	1	11.1	+	+	++
Eurhynchium striatum	1	11.1	+	+	++
Hypnum cupressiforme	1	11.1	+	+	++
Pseudoleskea catenulata	1	11.1	+	+	++
Rhynchostegium murale	1	11.1	+	+	++
Schistidium trichodum	1	11.1	+	+	++
Pyrum caespiticium (sp.)	1	11.1	+	+	++
Placomium rostratum	1	11.1	+	+	++
Mnium thomsonii	1	11.1	+	+	++

AUFNAHMENUMMER

	11	0111223		
	36	7333116		
	31	0567679		

M. Storch 1983 NATIONALPARK BERCHTESGADEN
TABELLE 14: ROSTSEGGENRASEN (*Caricetum ferrugineae*)

A B C	Dactylis-Ausbildung Ligusticum-Ausbildung Adenostyles-Ausbildung			
		A	B	C
	AUFNAHMENUMMER	22 23 29	222 233 278	888 667 450
	AUFNAHMEMONAT	JJ UU LL	JJJ UUU LLL	SSS EEE PPP
	AUFNAHMEFLÄCHE (QM)	22 00 00	222 000 000	111 000 000
	MEERESHOEHE (10 M)	11 66 43	111 677 947	111 444 222
	EXPOSITION (GRAD)	1 08 05	468 005	3 -0-
	HANGNEIGUNG (GRAD)	22 00	223 552	050
	ARTENZAHL	44 70	656 723	444 014
	DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	2 5+		
	DECKUNG DER 1. KRAUTSCHICHT (%)	1 0		
	DECKUNG DER (2.) KRAUTSCHICHT (%)	1 90 00	1 808 005	11 900 000
	DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	1 0+	< 11 00+	112 000
V	Verb.Char.:			
	<i>Heracleum austriacum</i>	4	50.0	+ + + +
	<i>Luzula glabrata</i>	1	12.5	+ +
	lokale Diff.:			
	<i>Carlina acaulis</i>	7	87.5	+ + + + + r
	<i>Phleum alpinum</i>	6	75.0	11 + + + +
O,K	<i>Hieracium villosum</i>	2	25.0	+ r
V	<i>Carex ferruginea</i>	8	100.0	33 323 222
	<i>Hypericum maculatum</i>	7	87.5	1+ + 1 222
	<i>Soldanella alpina</i>	7	87.5	+ 11+ +12
	<i>Luzula sylvatica</i> s.l.	7	87.5	1 +11 1+1
	<i>Geranium sylvaticum</i>	5	62.5	+ + + 212
	<i>Pseudoleskea incurvata</i>	4	50.0	1+ 1 +
	Diff.Ausb.:			
	<i>Leontodon hispidus</i>	6	75.0	11 111 +
	<i>Lotus corniculatus</i>	6	62.5	2+ + +1
	<i>Poa alpina</i>	6	62.5	22 +11
	<i>Veratrum album</i>	5	62.5	22 2+ +
	<i>Viola biflora</i>	5	62.5	+ + +1 +
O,K	<i>Carex sempervirens</i>	4	50.0	2 1 12
	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	4	50.0	1 + + +
	<i>Ctenidium molluscum</i>	4	50.0	1 + + +
	<i>Veronica chamaedrys</i>	6	75.0	12 + +12
	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	5	62.5	11 1 122
	<i>Achillea millefolium</i>	5	62.5	11 111
	<i>Cerastium fontanum</i> s.l.	4	37.5	11 r
	<i>Dactylis glomerata</i>	4	37.5	+1 1
	<i>Stellaria graminea</i>	4	37.5	+ + +
	<i>Crepis aurea</i>	4	25.0	11
	<i>Tapaxacum officinale</i>	4	25.0	+ +
	<i>Daphne mezereum</i>	6	75.0	+ + + + +
	<i>Gentiana pannonica</i>	4	50.0	+ 1 12
	<i>Potentilla erecta</i>	4	50.0	+ 1 + +
	<i>Vaccinium myrtillus</i>	4	50.0	+1 + +
	<i>Aster bellidiastrum</i>	4	50.0	+ 111
	<i>Homogyne alpina</i>	4	50.0	111 +
	<i>Calycocorsus stipitata</i>	4	37.5	+ 1+
O,K	<i>Sesleria varia</i>	4	37.5	+ 2 1
	<i>Ligusticum mutellina</i>	4	37.5	122
	<i>Polygonum viviparum</i>	4	37.5	11+
	<i>Nardus stricta</i>	4	37.5	+11

AUFNAHMENUMMER		A	B	888
		22	222	667
		29	578	450
	Plagiochila asplenoides	7	++	
	Sanionia uncinata	7	+1	
	Hylocomium pyrenaicum	7	+1	
	Larix decidua	7	1r	
	Tofieldia calyculata	7	1	
	Scapania aequilops	7	++	
	Scissidens cristatus	7	++	
	Tortella tortuosa	7	12	
	Androsace chamaejasme	7	1	
	Rhododendron hirsutum	7	++	
	Anthrillix vulneraria	7	1	
	Bartsia alba	7	++	
	Pedicularis rostrato-spicata	7	++	
	Scabiosa columbaria	7	++	
	Hieracium spuriaticum	7	++	
	Juncus trifidus ssp. hostii	7	++	
	Plagiomnium affine s.str.	7	++	
	Rhizomnium punctatum	7	++	
	Haberzia selago	7	++	
	Dryopteris filix-mas	7	++	
	Calamagrostis villosa	7	1+	
	Calypogeia trichomanis	7	1+	
	Atrichum undulatum	7	1+	
	Silene vulgaris	6	++	+1
	Ranunculus nemorosus	6	+	1+
	Aconitum napellus	6		12
	Geum rivale	6		1+
	Epilobium alpestre	6		1+
	Melandrium rubrum	6		1+
	Rumex alpinus	6		21
	Adenostyles alliariae	6		212
	Poa hybrida	6		212
	Carduus personata	6		212
	Festuca arundinacea	6		11
	Epilobium montanum	6		1+
	Lamium maculatum	6		++
	Pedicularis recutita	6		++
	Carduus defloratus	6		++
	Ord. u. Klass.Char.:			
	Galium anisophyllum	6	75.0	1+ + + +
	Phyteuma orbiculare	6	25.0	+ 1 + +
	Rhinanthus glacialis	6	25.0	+ 1 + +
	Thymus polytrichus (sp.)	6	12.5	+ + + +
	Anemone narcissiflora	6	12.5	+ + + +
	Alchemilla hoppeana	6	12.5	+ + + +
	Biscutella laevigata	6	12.5	+ + + +
	Gentiana clusii	6	12.5	+ + + +
	sonstige Kormophyten:			
	Alchemilla vulgaris	6	100.0	22 +11 211
	Potentilla aurea	6	100.0	1+ 111 + + +
	Potentilla praealta	6	100.0	1+ 111 + + +
	Deschampsia caespitosa	6	100.0	33 233 211
	Rumex alpestris	6	75.0	11 + + +
	Trollius europaeus	6	75.0	11 + + +
	Ranunculus montanus	6	50.0	+ 1+ + +
	Campanula scheuchzeri	6	50.0	+ 1+ + +
	Ranunculus acris	6	50.0	+ 2 + + +
	Polygala amarella	6	50.0	+ + + +
	Luzula campestris aqg.	6	50.0	+ + + +
	Prunella vulgaris	6	50.0	+ + + +
	Senecio fuchsii	6	50.0	+ + + +
	Festuca ovina	6	50.0	+ + + +
	Myosotis silvatica	6	50.0	+ + + +
	Carex pallens	6	50.0	+ + + +
	Briza media	6	50.0	+ + + +
	Lysimachia nemorum	6	50.0	+ + + +
	Stachys alpestris	6	50.0	+ + + +
	Chrysanthemum leucanthemum	6	50.0	+ + + +
	Symadenia conopsea	6	50.0	+ + + +
	Carex flacca	6	50.0	+ + + +
	Agrostis tenuis	6	50.0	+ + + +
	Ranunculus repens	6	50.0	+ + + +
	Galium saxatile	6	50.0	+ + + +
	Rumex obtusifolius	6	50.0	+ + + +
	Euphrasia pinnatifida	6	50.0	+ + + +
	Polycnemum viride	6	50.0	+ + + +
	Cynosurus cristatus	6	50.0	+ + + +
	Festuca pratensis	6	50.0	+ + + +
	Polystichum lonchitis	6	50.0	+ + + +
	Pinus mugo	6	50.0	+ + + +
	Rhododendron chamaecistus	6	50.0	+ + + +
	Carex dioica	6	50.0	+ + + +
	Ranunculus platanifolius	6	50.0	+ + + +
	Alnus viridis	6	50.0	+ + + +
	Pimpinella major	6	50.0	+ + + +
	Agrostis stolonifera	6	50.0	+ + + +
	Silene nutans	6	50.0	+ + + +
	Aquilegia reptans	6	50.0	+ + + +
	sonstige Thallophyten:			
	Brachythecium sp.	6	50.0	1 + 112
	Brachythecium salebrosum (sp.)	6	50.0	1 + 112
	Leptodermis quadrifida	6	50.0	1 + 112
	Brachythecium rutabulum (sp.)	6	50.0	1 + 112
	Campylopus stellatus	6	50.0	1 + 112
	Bryum pseudotriquetrum	6	50.0	1 + 112
	Bryum thomsonii	6	50.0	1 + 112
	Blepharostoma trichophyllum	6	50.0	1 + 112
	Radula complanata (sp.)	6	50.0	1 + 112
	Scapania sp.	6	50.0	1 + 112
	Brachythecium glareosum	6	50.0	1 + 112
	Pohlia cruda	6	50.0	1 + 112
	Peziza pubescens	6	50.0	1 + 112
	Cirriophyllum piliferum	6	50.0	1 + 112
	Rhynchostegium murale	6	50.0	1 + 112
	Bryum sp.	6	50.0	1 + 112
	Dicranum scoparium	6	50.0	1 + 112
	Schistidium apocarpum	6	50.0	1 + 112
	Plagiomnium rostratum	6	50.0	1 + 112
	Thuidium tamariscinum	6	50.0	1 + 112

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN

TABELLE 15: BLAUGRAS-HORSTSEGGENRASEN (Seslerio-Caricetum sempervirentis)

A Molinia-Ausbildung mit Allium
B Molinia-Ausbildung mit Convallaria
C Reine Molinia-Ausbildung, beweidet
D Reine Molinia-Ausbildung
E Primula auricula-Ausbildung
F Reine Hippocrepis-Ausbildung
G Hippocrepis-Ausbildung, beweidet

H Reine Ausbildung, rein, beweidet
I Reine Ausbildung
J Reine Ausbildung mit Hoehringia, beweidet
K Reine Ausbildung mit Hoehringia
L Hookeria-Ausbildung
M Reine Luzula sylvatica-Ausbildung
N Luzula sylvatica-Ausbildung, beweidet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
AUFNAHMENUMMER	6666667 5556795 5789083	5888 3111 8456	5 0 4	5677 6267 7190	677 937 262	134 561 238	013 559 311	57 51 15	0000157 4455561 7901348	5 1 4	55 55 06	55 55 45	277 519 010	2227777 335089 341657
AUFNAHMEMONAT	SSSSSSSS EEEEEEEE PPPPPPPP	JAAA UUUU LGGG	AACD LKKK U GGT	SSD FEK PPT	SSJ UEU LPN	JJM UUA NLI	JS UE LP	JJJJJAS UUUUUUE NNNNLGP	J JA U UJ L LG	AA UU GG	JSA UEU LPG	JJJJAA UUUUU LLLLPGG		
AUFNAHMEFLAECH (QM)	1211211 0050005 0000000	11 1 5050 0 0000 0	2 1111 0 5000 0000 0	1 520 000	222 000 000	212 000 000	21 000 000	4323121 0000000 0000000	2 1 55 00 00 00	11 55 00	11 00 00	211 000 0000	122111 500500 000000	
MEERESHOEHE (10 M)	6778868 4005597	11 5179	9 1	8630 4594	902 986	010 635	008 244	24 20	1111181 9640314	1 7	11 10	89 82	422 149	1111111 685544 685544
EXPOSITION (GRAD)	1111122 1213365 0505500	1333 2210 0000	3 2 4 9	233 1178 0000	2 2 0-00 000	221 995 000	32 445 000	221 002 50	2222232 1222522 0000000	2 2 05 00	2 05	179 050	22 1 960000	
HANGNEIGUNG (GRAD)	3333334 5275030	4444 0050	1 3 5050	333 505	564 550	334 550	332 055	32 05	443345 0055050	5 3 80 25	34 44	44 005	343 555000	22 322 555000
ARTENZAHL	5553244 1169884	7765 4475	7 5 5	5556 1900	642 814	656 534	576 902	55 51	5456666 4940870	7 1 66 13	55 86	86 675	666 675	466685 799104
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)		1 0	1 5	2 0	211 050	11 00	112 500	1 1	22 2 11 00+0550	1 1 0 0	+	411 000	++ 2 0	
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)			5 2	0 0		1 0	21 00		11 1 23 00 00	5	1 5 0+0	5		
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)		1 1+ 2+ 1001	11 1 0 2505	2 25+ 0505	121 1 000 05+ 0	0 0 05+ 0	1 0 05+ 0	1 0 05+ 0	1 0 05+ 0	1 0 05+ 0	1 0 05+ 0	1 0 05+ 0	1 0 05+ 0	1 0 05+ 0
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)		6865967 5000005	7468 0000	8 0 0000	342 000	877 000	888 000	99 000	8688786 0000005	4 64 00 05	77 05	375 050	999980 000000	1 000000
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)		3243 33 0000+00	1111 0005	0 1122 0000	310 050	32 11	11 11 005 00	1 1 005 00	1 1 005 00	22 1 05+0505	0 12 05 00	22 212 00 005	212 005	<131 +5500

Baumarten														
Picea abies	23	47.9		2	1	21+	11	212	22+211	1 1		311	+	2
Picea abies	32	31.3						21	11	22				
Picea abies	32	66.7	+	1	1+	1	2112	+	222	2+	2	312	+	2
Picea abies	12	25.0	1	1					1	+	+	1	+	+
Larix decidua	12	25.0							1	+	+	1	+	+
Larix decidua	14	29.2												
Larix decidua	14	29.2												
Larix decidua	14	29.2												
Acer pseudoplatanus	18	10.4	+	+	+	1+								
Acer pseudoplatanus	18	10.4	+	+	+	1+								
Acer pseudoplatanus	18	10.4	+	+	+	1+								
Fagus sylvatica	18	10.4	+	+	+	1+								
Fagus sylvatica	18	10.4	+	+	+	1+								
Fagus sylvatica	18	10.4	+	+	+	1+								
Fagus sylvatica	18	10.4	+	+	+	1+								
Sorbus aria	18	10.4	+	+	+	1+								
Sorbus aria	18	10.4	+	+	+	1+								
Sorbus aria	18	10.4	+	+	+	1+								
Fraxinus excelsior	18	10.4	+	+	+	1+								
Fraxinus excelsior	18	10.4	+	+	+	1+								
Fraxinus excelsior	18	10.4	+	+	+	1+								
Alnus incana	18	10.4	+	+	+	1+								
Betula pendula	18	10.4	+	+	+	1+								
Abies alba	18	10.4	+	+	+	1+								
Abies alba	18	10.4	+	+	+	1+								
Abies alba	18	10.4	+	+	+	1+								
Ulmus glabra	18	10.4	+	+	+	1+								
Ulmus glabra	18	10.4	+	+	+	1+								
Ulmus glabra	18	10.4	+	+	+	1+								
Alnus incana	18	10.4	+	+	+	1+								
Betula pubescens	18	10.4	+	+	+	1+								
Straucharten														
Daphne mezereum	16	33.3		++	+		++	+	1+	++	+	+	++	+
Rosa pendulina	16	33.3		1					1				++	++
Rosa pendulina	16	33.3		1					1				++	++

			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
AUFNAHMENUMMER			6666667	5688	5	5677	677	134	013	57	0000157	5	55	55	277	227777
			5556795	7118	0	567	837	861	559	21	0455661	1	55	55	519	235089
			5789083	8455	4	7190	262	238	311	15	7901348	4	06	45	010	341657
			Salix appendiculata	4	8.3											
			Salix appendiculata	4	8.3											
			Amelanchier ovalis		10.4		++	1 + 1							++	
			Amelanchier ovalis		10.4		++	1 + 1							++	
			Corvulus avellana		10.4		++	11+								
			Berberis vulgaris		10.4		+									
			Lonicera alba		10.4		+									
			Lonicera alba		10.4		+									
			Clematis alpina		10.4		+									
			Clematis vitalba		10.4		+									
			Rosa (cf) micrantha		10.4		+									
			Sambucus racemosa		10.4		+									
			Rhamnus cathartica		10.4		+									
			Lonicera xylosteum		10.4		+									
			Salix sp.		10.4		+									
			Juniperus communis		10.4		+									
			Rosa canina		10.4		+									
			Hedera helix		10.4		+									
			Rubus idaeus		10.4		+									
			Salix glabra		10.4		+									
			Pinus mugo		10.4		+									
			Salix walsteiniana		10.4		+									
			Sorbus chamaemespilus		10.4		+									
V		Verb. Char. :														
		Euphrasia salisburgensis	6	12.5		+			1					+		
		Hieracium villosum	4	12.5		+										
		Nigritella nigra	4	12.5		+										
		Androsace chamaejasme	4	12.5		+										
		Gentiana clusii	4	12.5		+										
		Achillea clavennae	4	12.5		+										
		Diff. Ass. :														
		Bupthalamum salicifolium	43	89.6	1211122	21+2	+	1111	211	221	121	+	11112++	2	+	11+
O.K		Androsace villosa	43	89.6	1211122	21+2	+	1111	211	221	121	+	11112++	2	+	11+
O.K		Carex sempervirens	3336	75.0	3	2221	2	12	+	12	2+1	+	321111	2	+	312+
O.K		Calamintha alpina	68.6	1222+12	+	+	+	11	1	+	2+1	12	+	+	+	11+21
O.K		Rhinanthus glacialis	68.6	121+22	+	+	+	12	1	+	+	+	+	+	+	11
O.K		Thymus polytrichus (sp.)	2222	15.4	2+1	22	1	+	+	+	+	+	+	+	+	11
O.K		Scabiosa columbaria	2222	55.2	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
O.K		Stachys alopecurus	2222	47.8	221+1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
O.K		Carlina acaulis	2222	47.8	221+1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
O.K		Laserpitium latifolium	21	43.6	+	1+1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
O.K		Viola hirta	11	43.6	+	1+1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
K2		Cephalanthus longifolia	6	12.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
		Diff. Ausb. :														
		Molinia arundinacea	16	33.3	121	432	2213	2	4+24							
		Anthericum ranosum	13	27.1	+	+	1++	+	+	+						
		Vincetoxicum hirsutaria	19	39.6	211+2+3	+	+	+	+	+						
		Eritron coccineum	13	27.1	2233	13	+	+	+	+						
K2		Fraxinus excelsior	13	27.1	1	1	+	+	+	+						
K2		Campanula trachelium	10	20.6	+	+	+	+	+	+						
K2		Campanula stellatum	8	16.7	+	+	+	+	+	+						
K2		Corvulus avellana	5	10.4	+	+	11+									
		Teucrium montanum	9	18.8	2+1	11	+		2							
		Medicago lupulina	9	18.8	2+1	11	+		2							
		Silene nutans	68	10.7	1111+		+									
		Rhytidium rugosum	7	14.6	2+1	21	+									
		Abietinella abietina	7	14.6	2+1	21	+									
		Allium montanum	10	10.4	2221				2							
		Bryum argenteum	5	10.4	+	+	+									
K2		Erica herbacea	13	27.1	++	+	322	+								
K2		Amelanchier ovalis	7	14.6	++	+	1++	1								
		Parnassia palustris	9	18.8	11+	+			+	1						
		Aconitum napellus	7	14.6	1++	+				+						
		Convallaria majalis	10	10.4	+	+	21+		1							
		Polygonatum odoratum	4	8.3	+	+	+									
		Laserpitium siler	4	8.3	+	+	11									
		Hepatica nobilis	4	8.3	+	+	1+									
		Gentiana aspera	4	8.3	+	+	++									
		Primula auricula	4	8.3	+	+										
		Potentilla caulescens	2	4.2	+	+										
		Tofieldia calyculata	19	39.6	+	11+	+	+	11+	++						
		Hippocrepis comosa	19	39.6	+	+	+	+	11+	++						
		Plantago media	19	39.6	+	+	+	+	11+	++						
O.K		Anthriscus vulneraria	19	39.6	+	+	+	+	11+	++						
O.K		Biscutella laevigata	19	39.6	+	+	+	+	11+	++						
O.K		Carex firma	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
O.K		Gentiana verna	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
O.K		Centaurea jacea	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
O.K		Ophrys insectifera	2	4.2	+	+	+	+	11	++						
		Rhizomium punctatum	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
		Trifolium quinquefolium	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
		Preissia quadrata	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
		Polytrichum formosum	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
		Lycopodium annotinum	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
		Bazzania tricenata	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
		Brotherella lorentziana	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
		Hookeria lucens	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
		Sphagnum (cf) nemoreum	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
		Blechnum spicant	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
		Biophanostoma trichophyllum	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
		Dicranodontium denudatum	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
		Riccardia multifida	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
		Trichocolea tomentella	4	8.3	+	+	+	+	11	++						
		Geranium sylvaticum	12	25.0	+	+	+	+								
		Luzula sylvatica s.l.	12	25.0	+	+	+	+								
		Helianthemum nummularium	12	25.0	+	+	+	+								
		Soldanella alpina	12	25.0	+	+	+	+								
		Polystichum lonchitis	12	25.0	+	+	+	+								
		Pseudoleskea incurvata	12	25.0	+	+	+	+								

			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
AUFNAHMENUMMER			6666667	5888	5	5677	677	134	013	57	0000157	5	55	55	277	222777
			5556795	3111	0	6267	937	561	559	51	4455551	1	55	55	519	335089
			5789083	8456	4	7190	262	238	311	15	7901548	4	06	45	010	341657
Blockschuttbesiedler																
Kormophyten:																
Campanula cochleariifolia	12	25.0														
Asplenium ruta-muraria	12	25.0														
Huperzia selago	6	16.7														
Moehringia muscosa	7	14.6	1													
Asplenium viride	7	14.6														
Thallophyten:																
Tortella tortuosa	34	70.8	22	2+	2+	2+	+	+								
Schistidium apocarpum	22	45.4	22	11	11	11	11	11								
Tenidium molluscum	34	16														
Scapania aspera	16	18.9														
Fissidens cristatus	7	14.6														
Heidezeiger																
Trifolium pratense	15	47.9														
Leontodon sibiricus	15	20.3														
Prunella vulgaris	11	22.2														
Briza media	10	18.0														
Alchemilla vulgaris	9	16.7														
Plantago lanceolata	9	16.7														
Geranium chamaedrys	5	10.4														
Dactylis glomerata	4	8.3														
Arrhenatherum elatius	4	8.3														
Rhynchospora alba	3	6.5														
Heracleum austriacum	9	18.9														
Hypericum maculatum	8	16.7														
Potentilla aurea	7	14.6														
Anthoxanthum odoratum	7	14.6														
Poa alpina	7	14.6														
Veratrum album	7	14.6														
Trollius europaeus	6	12.5														
Polygonum viviparum	6	12.5														
Crepis aurea	6	12.5														
Rumex alpestris	6	12.5														
Nardus stricta	6	12.5														
Deschampsia caespitosa	6	12.5														
Phleum alpinum	6	12.5														
Luzula campestris aq.	6	12.5														
Gentiana pannonica	6	12.5														
Ord. u. Klass.Char.:																
Sesleria varia	35	72.2														
Galium anisophyllum	30	62.2														
Phyteuma orbiculare	29	59.9														
Geranium robertianum	29	59.9														
Thesium alpinum	29	59.9														
Alchemilla hoppeana	29	59.9														
Alchemilla lucida	29	59.9														
Hieracium bifidum (sp.)	29	59.9														
Arabis ciliata	29	59.9														
Polydrus alpestris	29	59.9														
Globularia cordifolia	1	2.1														
Phleum hirsutum	1	2.1														
Beckleiter aus der Klasse																
Quercus-Faetetea																
Carex diqitata	26	54.4														
Melica nutans	26	54.4														
Acer pseudoplatanus	19	41.7														
Aopseris foetida	19	41.7														
Mercurialis perennis	16	33.3														
Fagus sylvatica	16	33.3														
Daphne mezereum	16	33.3														
Veronica urticifolia	14	30.0														
Polycarpon verticillatum	14	30.0														
Salvia glutinosa	11	22.2														
Listera ovata	8	16.7														
Lanium galeobdolon	8	16.7														
Epiclobium montanum	6	12.5														
Neottia nidus-avis	6	12.5														
Platanomium undulatum	5	10.4														
Malaxis monophyllos	5	10.4														
Helleborus niger	5	10.4														
Prenanthes purpurea	4	8.3														
Hypericum montanum	4	8.3														
Geranium robertianum	4	8.3														
Dryopteris filix-mas	4	8.3														
Lilium martagon	4	8.3														
Brachypodium sylvaticum	4	8.3														
Dentaria enneaphyllos	4	8.3														
Euphorbia amygdaloides	4	8.3														
Berberis vulgaris	4	8.3														
Lonicera alpigena	4	8.3														
Lonicera europaea	4	8.3														
Tilia platyphyllos	4	8.3														
Eupactis helleborine	4	8.3														
Gymnocarpium dryopteris	4	8.3														
Veronica montana	4	8.3														
Phyteuma spicatum	4	8.3														
Aquilegia (cf) vulgaris	4	8.3														
Lilium vitalba	4	8.3														
Rosa (cf) micrantha	4	8.3														
Rhamnus cathartica	4	8.3														
Thalictrum aquilegifolium	4	8.3														
Aruncus dioicus	4	8.3														
Lonicera xylosteum	4	8.3														
Paris quadrifolia	4	8.3														
Ulmus glabra	4	8.3														
Rosa canina	4	8.3														
Carex montana	4	8.3														
Alnus incana	4	8.3														
Eurhynchium striatum	4	8.3														
Polytrichum lobatum	4	8.3														
Aconitum vulparia	4	8.3														

sonstige Kormophyten:

AUFNAHME-NUMMER	66666667	5888	5	5677	677	134	013	57	0000157	5	55	55	277	222777
	5555795	3111	0	6267	937	561	559	51	4455561	1	55	55	519	535089
	5589083	8456	4	7190	262	238	311	15	7901348	4	06	45	010	341657
sonstige Kormophyten:														
Calamagrostis varia	44	91.7	32	11+1	2222	2	2232	32+	222	222	23	2242134	2	42
Picea abies	40	83.3	+	+	244	1	2112	21+	222	222	22	2222222	2	42
Potentilla erecta	37	77.1	12+	+	11+	1	1111		222	121	22	+1111+	2	2
Ranunculus nemorosus	36	75.0	+	+	+1	+	+1		222	111	22	1	+11	1
Rotula corniculatus	35	72.0	+	+	+1	+	+1		222	111	22	1	+11	1
Pimpinella major	30	62.5	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Carex flacca	28	58.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Polycala chamaebuxus	28	58.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Adenostyles glabra	27	56.3	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Aster bellidiflorus	26	54.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Campanula trachelium	26	54.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Euphorbia cyparissias	25	50.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Origanum vulgare	22	45.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Ranunculus acris	22	45.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Larix decidua	21	43.8	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Hieracium sylvaticum	21	43.8	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Valeriana tripteris	20	41.9	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Manispermum sylvaticum	20	41.9	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Galium album	19	40.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Gymnocarpium robertianum	19	40.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Gentiana asclepiadea	19	40.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Knautia dipsacifolia	18	37.6	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Senecio fuchsii	18	37.6	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Polidio vulgaris	16	33.3	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Carex alba	15	31.1	1	+	2				222	111	22	1	+11	1
Homocvne alpina	15	31.1	1	+	2				222	111	22	1	+11	1
Ranunculus montanus	15	31.1	1	+	2				222	111	22	1	+11	1
Linum catharticum	14	29.9	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Sorbus aria	14	29.9	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Valeriana riviniana + reichenb.	13	27.7	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Adiantum reptans	13	27.7	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Aquilegia atrata	12	25.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Rubus saxatilis	11	23.3	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Calamintha clinopodium	11	23.3	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Silene vulgaris	11	23.3	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Gymnadenia conopsea	10	20.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Epipactis atrorubens	10	20.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Valeriana saxatilis	10	20.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Selaginella selaginoides	10	20.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Lysimachia nemorum	10	20.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Viola biflora	10	20.0	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Euphrasia picta	9	18.8	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Rosa pendulina	9	18.8	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Vaccinium myrtillus	9	18.8	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Oxalis acetosella	8	16.7	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Galanthum biflorum	8	16.7	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Polycala amurensis	8	16.7	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Agrostis stolonifera	7	14.6	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Salix appendiculata	7	14.6	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Sedum rubra	7	14.6	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Gypsophila repens	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Centaurea montana	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Chrysanthemum leucanthemum	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Teucrium chamaedrys	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Sorbus aucuparia	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Athyrium filix-femina	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Carex mucronata	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Sedum album	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Valeriana officinalis agg.	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Crepis alpestris (sp.)	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Gentiana ciliata	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Eupatorium cannabinum	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Dactylorhiza maculata	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Carex flava	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Chaerophyllum hirsutum	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Agrostis tenuis	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Drvas octopetala	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Carex ornithopoda	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Rhododendron hirsutum	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Primella grandiflora	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Thesium pyrenaicum	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Coluna vulgaris	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Gymnadenia odoratissima	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Clematis alpina	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Agrostis rupestris	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Abies alba	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Myosotis sylvatica	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Poa nemoralis	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Poa compressa	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Anchelya sylvestris	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Hypericum perforatum	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Asplenium trichomanes	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Vicia sepium	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Cardaminopsis arenosa	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Galeopsis tetrahit	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Carolina vulgaris	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Petasites paradoxus	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Rumex scutatus	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Mycelis muralis	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Pinguicula sp.	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Crepis paludosa	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Lathyrus pratensis	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Pimpinella saxifraga	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Kernera saxatilis	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Poa pratensis	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Hieracium pilosella	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Coeloglossum viride	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Cirsium palustre	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Trifolium repens	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Arabis pumila	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Senecio abrotanifolius	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Carex pallescens	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Carex brachystachys	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Agrostis alpina	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Crepis pyrenaica	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Sambucus racemosa	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Erigeron cf acris	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Salvia pratensis	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Leontodon incanus	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Epipactis palustris	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Salix sp.	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Valeriana montana	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Hieracium sphondylium elegans	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Betula pendula	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1
Ranunculus acris	6	12.2	+	+	+	+	+		222	111	22	1	+11	1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
AUFNAHMENUMMER	6666667	5888	5	5677	677	134	013	57	0000157	5	55	55	277	222777
	5555795	3111	0	6267	957	551	555	51	4455561	1	55	55	519	555089
	5789083	8456	4	7190	262	238	311	15	7901348	4	06	45	010	341657
Trifolium medium	1	2	1											
Carex panicea	1	2	1											
Carex pulicaris	1	2	1											
Holcus lanatus	1	2	1											
Danthonia decumbens	1	2	1		1									
Stipa calamagrostis	1	2	1			1								
Juniperus communis	1	2	1											
Pinus sylvestris	1	2	1			1								
Rhamnus pumila	1	2	1											
Hieracium staticifolium	1	2	1											
Pinquicula alpina	1	2	1											
Pinquicula vulgaris	1	2	1				+							
Melampyrum pratense	1	2	1					+						
Primula farinosa	1	2	1						1					
Leucorchis albida	1	2	1							+				
Orobanche sp.	1	2	1											
Russiaco farfara	1	2	1											
Astragalus glycyphyllos	1	2	1							1				
Holinnia caerulea	1	2	1											
Hiatanthra bifolia	1	2	1											
Astrantia maior	1	2	1											
Veronica fruticans	1	2	1											
Veronica officinalis	1	2	1											
Betula pubescens	1	2	1											
Arabis alpina	1	2	1											
Rhodthamnus chamaecistus	1	2	1											
Carex capillaris	1	2	1											
Salix glabra	1	2	1											
Thelypteris limbosperma	1	2	1											
Pinus mugo	1	2	1											
Ligusticum mutellina	1	2	1											
Salix waldsteiniana	1	2	1											
Cerastium fontanum s.l.	1	2	1											
Juncus trifidus ssp. hostii	1	2	1											
Festuca ovina	1	2	1											
Sorbus chamaemespilus	1	2	1											
cf Chrysanthemum vulgare	1	2	1											
Luzula luzulina	1	2	1											
Eriochloa alpestris	1	2	1											

sonstige Thallophyten:

[illegible]

AUFAHMENUMMER	6666667	5888	5	5677	677	134	013	57	0000157	5	55	55	277	222777
	5556795	3111	0	6267	937	561	559	51	4455561	1	55	55	519	335089
	5789083	8456	4	7190	262	238	311	15	7901348	4	06	45	010	341657

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN

TABELLE 16: POLSTERSEGGENRASEN (*Caricetum firmæ*),
SCHNEEHEIDE-VARIANTE

- A Reine Biscutella-Ausbildung
B Biscutella-Ausbildung, beweidet
C Latschen-Ausbildung
D Salix elaeagnos-Ausbildung mit Parnassia
E Salix elaeagnos-Ausbildung mit Petasites paradoxus

	A	B	C	D	E
AUFNAHMENUMMER	036 390 046	3 8 8	6 5 6	666 009 150	66666 01111 24024
AUFNAHMEMONAT	JMM JAA NII	M A I	M U L	AAS UOE GGP	AAAAA UUUUU GGGGG
AUFNAHMEFLÄCHE (QM)	124 000 000	2 0 0	2 0 0	211 055 000	1221 50000 00000
MEERESHÖHE (10 M)	988 822	8 2	9 4	666 011	66666 01222
EXPOSITION (GRAD)	2 6 5--		1 5 -	1 4 0-	1111 4684 -0000
HANGNEIGUNG (GRAD)	3 500	0 0	1 0	010	01222
ARTENZAHL	455 162	5 7	4 7	454 526	33444 79753

DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	1 0+	1 0	+ 2		
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)		2 0			
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	1 0+1	5 5	3 0	11 052	13221 00000
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	787 000	6 0	7 0	788 000	53414 00000
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	11 05	3 5	1 0	123 000	21113 05000

Baumarten

Picea abies	B1	3	23.1	2	1	+		
Picea abies	B2	1	7.7		2			
Picea abies		9	69.2	1			221	111+2
Picea abies		1	7.7					+
Acer pseudoplatanus		1	7.7				+	
Acer pseudoplatanus	10	1	76.9	+	+	+	+	+++1+
Salix elaeagnos		1	7.7				1	
Salix elaeagnos		1	61.5				11+	22222
Salix elaeagnos		1	15.4					21
Sorbus aria		1	15.4				+	+
Sorbus aria		1	15.4				+	+
Fagus sylvatica		1	15.4				+	+
Fagus sylvatica		1	30.8				+	+
Larix decidua		1	7.7				+	+
Larix decidua	B1	1	15.4	1			1	
Larix decidua		1	15.4					+
Alnus incana		1	15.4	+	1			++

Straucharten

Berberis vulgaris	S	6	46.2	1+	1		+	++
Berberis vulgaris		2	15.4					+
Fraxinus alnus		2	46.2	++	+	+	1	+
Crataegus monogyna		2	15.4	+	1			
Juniperus sibirica		1	7.7				+	
Pinus mugo		1	7.7				3	
Amelanchier ovalis		1	7.7				+	
Salix waldsteiniana		1	7.7					+
Clematis vitalba	K	1	7.7					+

V

Verb.Char.:

Saxifraga caesia	1	7.7					+	
Achillea clavensis	1	7.7					+	

			A	B	C	D	E
	AUFNAHMENUMMER		034	3	4	666	66666
			390	8	5	009	00111
			046	8	6	150	24024
	lokale Char. u. Diff.:						
	Erica herbacea	13	100.0	12	2	3	233
	Drvas octopetala	12	92.3	12	1	211	21212
O,K	Carex firma	18	61.5	++			++
O,K	Thesium alpinum	8	61.5	++	1	+	++rr
	Globularia cordifolia	10	76.9	+	2	241	1414+
	Carex mucronata	10	76.9	+	2	241	112+1
	Leontodon incanus	7	53.6	1	++	+	++ 1
	Teucrium montanum	4	53.1	+			++
V	Euphrasia salisburgensis	4	53.1				++
	Hieracium piloselloides	3	23.1		+		++
	Diff.Ausb.:						
	Hippocrepis comosa	9	69.2	+++	+	2	222 +
	Lotus corniculatus	9	69.2	+++	1	1	+
	Tofieldia calyculata	8	61.5	111	1	+	111
	Primula farinosa	7	55.8	222	2	1	221
	Plantago media	7	55.8	1+	2		1+
	Ranunculus nemorosus	6	46.2	1+	2		21
O,K	Gentiana clusii	4	38.5	1	+	1	1
	Hypnum cupressiforme	3	23.1	1		+	
	Euphorbia cyparissias	6	46.2	1++	+		++
	Biscutella laevigata	6	46.2	111	1		+
O,K	Gymnadenia conopsea	4	38.5	+++	1	+	
	Hylocomium splendens	4	38.5	1+	1		+
	Ranunculus montanus	4	38.5	+++			
	Aposeris foetida	4	38.5	++	1		
	Selaginella selaginoides	4	38.5	++			*
	Helicia nutans	4	38.5	++			+
	Pleurozium schreberi	4	38.5	++	1	2	
	Rhynchosia triquetrus	4	38.5	++	2		
O,K	Gentiana verna	4	38.5	++	1		
	Melampyrum sylvaticum	4	38.5	++	1		
	Pyrrola cf rotundifolia	4	38.5	++	1		
	Carlina vulgaris	4	38.5	++	1		
	Anthericum ramosum	2	15.4		1	+	
	Gentiana utriculosa	2	15.4		3		+
	Pinus mugo	1	7.7				
	Juniperus sibirica	1	7.7				
	Amelanchier ovalis	1	7.7				
	Rubus saxatilis	1	7.7				
	Athamanta cretensis	1	7.7				
	Senecio abrotanifolius	1	7.7				
	Polygonum bistorta	1	7.7				
	Salix elaeagnos	8	61.5			111	2222
	Euphrasia picea	8	61.5			211	111+
	Molinia arundinacea	8	61.5			222	+12++
	Prunella grandiflora	8	61.5			212	1+ 1
	Stachys alpocurus	8	61.5			1	++ +
	Parnassia palustris	4	38.5	+		111	
	Gymnadenia odoratissima	4	38.5	+		++	
	Briza media	4	38.5			++	
	Epipactis palustris	4	38.5			++	
O,K	Carduus defloratus	6	46.2	r			+1211
	Petasites paradoxus	6	46.2			+	+11r
	Tortella inclinata	6	46.2				2223
	Hieracium staticifolium	6	46.2			+	+ 1+
	Fissidens cristatus	6	46.2				++
	Campanula cochlearifolia	6	46.2				+++
	Weidezeiger						
	Trifolium pratense	4	38.5	+	1		++
	Pimpinella major	4	38.5	+			++
	Plantago lanceolata	4	38.5	+			++
	Anthoxanthum odoratum	4	38.5	1			+
	Crataegus monogyna	4	38.5	+	1		
	Gentiana asclepiadea	4	38.5			r	
	Ranunculus acris	4	38.5				
	Prunella vulgaris	4	38.5				
	Achillea millefolium	4	38.5				
	Dactylorhiza maculata	4	38.5				
	Dactylis glomerata	4	38.5				
	Festuca rubra	4	38.5				
O,K	Ord. u. Klass.Char.:						
	Sesleria varia	13	100.0	833	3	1	121
	Thymus polytrichus (sp.)	11	84.6	+11	+	2	22122
	Rhinanthus glacialis	8	61.5	+	+	1	+++
	Phytolacca orbiculata	8	61.5	1+	+	1	+++
	Carex sempervirens	4	38.5	+		1	
	Gallium anisophyllum	4	38.5			+	++ +
	Gentiana aspera	4	38.5			++	++
	Hieracium bifidum (sp.)	4	38.5				+++
	Carex ferruginea	4	38.5	1+r			
	Calamintha alpina	2	15.4				++
	sonstige Kormophyten:						
	Potentilla erecta	12	92.3	1++	1	1	122
	Calamagrostis varia	11	84.6	311	2	2	1
	Acer pseudoplatanus	11	84.6	+	+	+	++
	Picea abies	11	84.6	21	2	2	1
	Bupththalmum salicifolium	10	76.9	1+	1	1	111+
	Leontodon hispidus	10	76.9	1+	1	1	111+
	Polygala chamaedryx	9	69.2	1+	1	1	111+
	Carlinia acaulis	9	69.2	1+	1	1	111+
	Carex flacca	8	61.5	1+	2	2	1
	Aster bellidifolium	8	61.5	1+	2	2	1
	Berberis vulgaris	7	53.6	1+	1	+	+
	Sorbus aria	7	53.6	1+	1	+	+
	Fraxinus alnus	6	46.2	++	+		+
	Carex digitata	6	46.2	+	1		+1+
	Hieracium sylvaticum	4	38.5	++	+		
	Larix decidua	4	38.5	1	+	1	++
	Fagus sylvatica	4	38.5	+	r		++
	Linum catharticum	4	38.5	+	+		++
	Valeriana saxatilis	4	38.5	+	1		++

		A	B	C	D	E
AUFNAHMENUMMER		034	3	4	666	66666
		390	8	5	009	00111
		046	8	6	150	24024
Carex ornithopoda	23	1		1		
Helleborus niger	23	1			+	
Carex panicea	23	1		11		
Antennaria dioica	23	1		r+		
Pinguicula sp.	15	4			1	
Polygala amarella	15	4				+
Alnus incana	15	4		+1		
Carex ericetorum	15	4		++		
Trifolium montanum	15	4		+		
Viola hirta	15	4		r		
Helianthemum bifolium	15	4		+		
Listera ovata	15	4		r		
Carex alba	15	4		+		
Hieracium sp.	15	4		+		
Scabiosa columbaria	15	4				+
Edipactis atrorubens	15	4			+	*
Laserpitium latifolium	15	4			+	
Angelica sylvestris	15	4				r
Helianthemum nummularium	15	4				+
Gypsophila repens	15	4				+
Anthyllus vulneraria	15	4				+
Galium album	15	4				+
Potentilla caulescens	15	4				r
Primula auricula	15	4				r+
Polygala sp.	15	4				++
Molinia caerulea	7	7		+		
Campanula scheuchzeri	7	7		+		
Cirsium arvense	7	7				
Polygonum viviparum	7	7		1		
Pinguicula vulgaris	7	7				
Carex capillaris	7	7				
Pinguicula alpina	7	7				
Luzula pilosa	7	7		+		
Trifolium medium	7	7			+	
Trifolium repens	7	7			+	
Koeleria pyramidata	7	7			+	
Succisa pratensis	7	7			1	
Convallaria majalis	7	7				+
Salix waldsteiniana	7	7				+
Veronica urticifolia	7	7				+
Clematis vitalba	7	7				+
Saxifraga burseriana	7	7				+
Rumex scutatus	7	7				+
Valeriana tripteris	7	7				+
Valeriana montana	7	7				r
Solidago virgaurea	7	7				+
Laserpitium siler	7	7				+
Pimpinella saxifraga	7	7				+
Hypericum perforatum	7	7				+
Vincetoxicum hirsutinaria	7	7				+
Centaurea scabiosa	7	7				1
sonstige Thallophten:						
Tortella tortuosa	9	69	2	2	1+	2++++
Ctenidium molluscum	30	8		+	+	
Thuidium tamariscinum	23	1		++	1	
Cladonia sp.	15	4			1	2
Rhytidium rupeum	15	4		1		
Ditrichum flexicaule	15	4		+		
Hypnum lindbergii	15	4		+	1	
Abietinella abietina	7	7		1		
Cladonia pyxidata (sp.)	7	7			2	
Rhacomitrium canescens	7	7				1
Campylopus stellatus	7	7				2
Entodon concinnus	7	7				3
Hypnum lacunosum	7	7				
AUFNAHMENUMMER		034	3	4	666	66666
		390	8	5	009	00111
		046	8	6	150	24024

NATIONALPARK BERCHTESGADEN

TABELLE 17: GEHÖLZREICHE GESELLSCHAFTEN AUF FEINSCHUTTSTANDORTEN

- A Verarmte Kalkschuttflur
B Schneepestwurzflur (*Petasitetum paradoxi*)

Lavendelweidenbusch (*Salicetum elaeagni*):

- C Lavendelweidenbusch, Reine Ausbildung
D Lavendelweidenbusch, Succisa-Ausbildung
E Lavendelweidenbusch, Rhytidadelphus-Ausbildung

	A	B	C	D	E
AUFNAHMENUMMER	5556666 99011 478616	46 6 50 1 77 3	66 5 00 9 03 9		
AUFNAHMEMONAT	AAAAAA UUUUU GGGGGG	JA JU LG	AA 00 GG	A 0 G	
AUFNAHMEFLAECHE (QM)	222122 000000 000000	22 2 00 0 00 0	31 1 00 0 00 0		
MEERESHOEHE (10 M)	6666666 211121	96 6 51 2	66 6 10 1		
EXPOSITION (GRAD)	111111 000581 000000	11 1 28 8 00 0			
HANGNEIGUNG (GRAD)	222222	02 2	00 0		
ARTENZAHL	454342 424552	56 4 61 2	55 5 51 1		
DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	417587 000005	16 50	11 00		
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)	71222 +55000	21 00			
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	1 2 1 +720+0	1 01	2 5	32 7 05 0	
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	231433 000000	33 1 50 0	99 8 00 0		
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	++1+5+	05 1 00 0	++ 3 00 0		

Baumarten

[illegible]

Straucharten

Species	Number of plants	Number of leaves	Number of flowers	Number of fruits	Number of seeds
<i>Fraxinus alnus</i>	7	58	1	1	11
<i>Fraxinus alnus</i>	7	58	1	1	11
<i>Berberis vulgaris</i>	7	58	1	1	11
<i>Berberis vulgaris</i>	7	58	1	1	11
<i>Daphne mezereum</i>	7	58	1	1	11
<i>Clematis vitalba</i>	7	58	1	1	11
<i>Viburnum opulus</i>	7	58	1	1	11
<i>Viburnum opulus</i>	7	58	1	1	11
<i>Salix appendiculata</i>	7	58	1	1	11

		A B C D E				
AUFNAHMENUMMER		555666	46	6	66	5
		999011	50	1	00	9
		478616	77	3	03	9
K	Lonicera xylosteum	16.7	++			
	Lonicera xylosteum	16.7	++			
	Viburnum lantana	16.7	+		+	
	Viburnum lantana	16.7	+			
	Pinus mugo	16.7		1		
	Amelanchier ovalis	16.7				+
	Euonymus europaeus	16.7	+			
	Corylus avellana	16.7		1		
	Salix glabra	16.7	+			
	Salix aurita	16.7			+	
	Rhododendron hirsutum	16.7				+
	Juniperus communis	16.7				+
	Salix waldsteiniana	16.7				1
	Liqustrum vulgare	16.7				+
	Ass.Char.:					
Petasitetum paradoxo						
Petasites paradoxus		7 58.3	1	1	32	++
Salicetum elaeagnos						
Salix elaeagnos		10 83.3	+++1	+2	2	12 1
lokale Char. der Gesellschaftsgruppe:						
K	Taraxacum officinale	58.3	rr+	++	+	+
	Arabis pumila	58.3	rr+	++	+	+
	Viburnum corymbosum	58.3	+	++		+
	Hutchinsia alpina	58.3	+	+	r	
	Viburnum lantana	58.3	+	++		+
Differentialarten						
K	Fraxinus alnus	9 75.0	r+	1++	1	11 1
	Molinia arundinacea	9 75.0	+	11r	2	+ 22
	Berberis vulgaris	9 75.0	+++	+	1	+
	Acer pseudoplatanus	12 100.0	343343	23	1	2+ 1
	Iussilago farinosa	12 100.0	21214	1		
K	Tortella tortuosa	7 58.3	+++14	21		
	Clematis vitalba	41.7	1+	1+	2	
	Adiantum glabra	41.7	r+	++		
	Rhynchosostegium murale	41.7	+1	+1	+	
	Dactylorhiza maculata	41.7	++	r	++	1
K	Fissidens cristatus	41.7	+	+	+	1
	Myoclis muralis	41.7	+	+	+1	
	Abies alba	41.7	1	r	+	
	Primula auricula	25.0	r	1	rr	
	Encalypta streptocarpa	25.0			++	
K	Polygala amarella	16.7			++	
	Europhila repens	16.7			++	
	Leontodon hispidus	6 50.0	+	+	++	1+
	Phyteuma orbiculare	6 50.0	+	+	++	++
	Scabiosa columbaria	6 50.0	+	+	++	++
K	Melica nutans	6 50.0	+	+	++	++
	Tofieldia calyculata	6 50.0	+	+	++	++
	Pimpinella major	6 50.0	+	+	++	++
	Melampyrum sylvaticum	6 50.0	+	+	++	++
	Carex flacca	7 58.3	++11		2+	+
K	Knaulia dipsacifolia	7 58.3	++		++	++
	Rubus saxatilis	7 58.3	++		++	++
	Prunella grandiflora	7 58.3	++		++	++
	Potentilla erecta	7 58.3	++		++	++
	Erica herbacea	7 58.3	++		++	++
K	Carex sempervirens	7 58.3	++		++	++
	Euphrasia picta	7 58.3	++		++	++
	Lotus corniculatus	7 58.3	++		++	++
	Polygala chamaebuxus	7 58.3	++		++	++
	Rhinanthus glacialis	7 58.3	++		++	++
K	Paris quadrifolia	7 58.3	++		++	++
	Picea abies	12 100.0	r11211	21	+ 12	3
	Cirripodium piliferum	12 100.0	+		+	+
	Rhytidelphus triquetrus	12 100.0			+	+
	Hylocomium splendens	12 100.0			+	+
K	Calliergonella cuspidata	12 100.0			+	+
	Thuidium tamariscinum	12 100.0			+	+
	Plagiomnium affine s.str.	12 100.0			+	+
	Rhizomnium punctatum	12 100.0			+	+
	Plagiomnium undulatum	12 100.0			+	+
Heidezeiger						
K	Trifolium pratense	16.7			++	
	Succisa pratensis	16.7			++	
	Ranunculus montanus	16.7			++	
	Selaginella selaginoides	16.7			+	
	Plantago lanceolata	16.7			+	
Klass.Char.:						
Thlaspietum rotundifolii						
K	Silene vulgaris	5 41.7	++		++	+
	Campanula cochleariifolia	5 41.7	+		++	+
	Moehringia ciliata	5 41.7	1+		+	
	Rumex scutatus	5 41.7	+		+	
	Hieracium sticticifolium	5 41.7		1	+	+
K	Gymnocarpium robertianum	5 41.7		r		r
	Arabis alpina	5 41.7	+			
	Achillea atrata	5 41.7	+			
	Hieracium piloselloides	5 41.7			+	
	sonstige Kormophyten:					
K	Brachypodium sylvaticum	10 83.3	111+21	++	+	2
	Fraxinus excelsior	10 83.3	112143	+	r	+
	Sorbus aria	10 83.3	+1+1+2	2	1+	+
	Fagus sylvatica	10 83.3	322112	r	21	2

		A B C D E				
AUFNAHMENUMMER		555666	46 6 66 5			
		999011	50 1 00			
		478616	77 3 03 9			
Salvia glutinosa	9	75.0	21+12	++	+	+
Calamagrostis varia	9	75.0	1 *	1+	1	23 3
Buphthalmum salicifolium	9	75.0	++	+	1	1+
Sesleria varia	8	75.0	+++	+		21 1
Ranunculus nemorosus	8	66.7	2++1	++		1
Angelica sylvestris	8	66.7	++1	++		1
Apocynis foetida	8	66.7	++1	++		1
Eupatorium cannabinum	6	50.0	r+	+		
Carduus defloratus	6	50.0	++	++		
Fragaria vesca	6	50.0	++	1	++	
Helieborus niger	6	50.0	++	1	+	2
Carex digitata	6	50.0	++	1	+	+
Hieracium sylvaticum	4	41.7	++	+		
Carex alba	4	22.3	2+2	+		2
Gentiana asclepiadea	4	33.3	++			
Euphorbia amygdaloides	4	33.3	++			++
Senecio fuchsii	4	25.0	++			
Parnassia palustris	4	25.0	r			++
Salix appendiculata	4	25.0	++	+		
Euphorbia cyparissias	4	25.0	++	+		
Cephalanthera rubra (sp.)	4	25.0	++	+		
Galium album	4	25.0	++			+
Maianthemum bifolium	4	25.0	r			+
Mercurialis perennis	4	25.0	r			+
Carex ferruginea	4	25.0			11	
Epilobium montanum	4	16.7	r+			
Pyrrola (cf.) minor	4	16.7	++			
Lonicera xylosteum	4	16.7	++			
Valeriana tripteris	4	16.7	++			
Rubus fruticosus	4	16.7	++			
Epipactis helleborina	4	16.7	++			+
Veronica urticifolia	4	16.7	++			+
Hieracium sp.	4	16.7	++			
Aquilegia atrata	4	16.7	++			1
Drvas octopetala	4	16.7	++			1
Thymus polytrichus (sp.)	4	16.7	++			1
Amelanchier ovalis	4	16.7	++			+
Thesium alpinum	4	16.7	++			1
Aster bellidiastrum	4	16.7	++			1
Arabis ciliata	4	16.7	++			
Heliosperma quadridentatum	4	16.7	++			
Carex brachystachys	4	16.7	++			
Lysimachia nemorum	4	16.7	++			
Primula elatior	4	16.7	++			
Cirsium oleraceum	4	16.7	++			
Petasites albus	4	16.7	++			
Solidago virgaurea	4	16.7	++			
Chaerophyllum hirsutum	4	16.7	++			
Ajuga reptans	4	16.7	++			
Ulmus glabra	4	16.7	++			
Pyrrola cf. rotundifolia	4	16.7	++			
Polycnatum odoratum	4	16.7	++			
Euronimus europaeus	4	16.7	++			
Hedera helix	4	16.7	++			
Aegopodium podagraria	4	16.7	++			
Sanicula europaea	4	16.7	++			
Viola riviniana + reichenb.	4	16.7	++			
Orobancha sp.	4	16.7	++			
Dactylis glomerata	4	16.7	++			
Hochmunda muscosa	4	16.7	++			
Pinus mugo	4	16.7	++			
Pinus sylvestris	4	16.7	++			
Alnus incana	4	16.7	++			
Corvulus avellana	4	16.7	++			
Laserpitium latifolium	4	16.7	++			
Salix glabra	4	16.7	++			
Listera ovata	4	16.7	++			
Neottia nidus-avis	4	16.7	++			
Alchemilla hoppana	4	16.7	++			
Geranium robertianum	4	16.7	++			
Soldanella alpina	4	16.7	++			
Valeriana saxatilis	4	16.7	++			
Carex firma	4	16.7	++			
Carex mucronata	4	16.7	++			
Larix decidua	4	16.7	++			
Betula pubescens	4	16.7	++			
Linum catharticum	4	16.7	++			
Polygala sp.	4	16.7	++			
Stachys alopecurus	4	16.7	++			
Teucrium montanum	4	16.7	++			
Achillea clavennae	4	16.7	++			
Hieracium bidentatum (sp.)	4	16.7	++			
Leontodon incanus	4	16.7	++			
Salix aurita	4	16.7	++			
Salix anisophyllum	4	16.7	++			
Campanula scheuchzeri	4	16.7	++			
Carlina acaulis	4	16.7	++			
Epipactis atrorubens	4	16.7	++			
Juniperus communis	4	16.7	++			
Salix waldsteiniana	4	16.7	++			
Liqustrum vulgare	4	16.7	++			
Centaurea tacea	4	16.7	++			
Epipactis palustris	4	16.7	++			
Priza media	4	16.7	++			
Pimpinella saxifraga	4	16.7	++			
sonstige Thallophyten:						
Ctenidium molluscum	8	66.7	++1 1+	1	+	+
Hypnum cupressiforme	4	33.3	++	1	+	+
Brachythecium salebrosum (sp.)	4	25.0	++	+		+
Compilium stellatum	4	25.0	++	+		1
Cratogeomys filicinum	4	16.7	++			
Conocephalum conicum	4	16.7	++			
Cratoneuron commutatum	4	16.7	++			
Brvum capillare add.	4	16.7	++			
Schistidium apocarpum	4	16.7	++			
Antitrichia curtipendula	4	16.7	++			
Compilium chrysophyllum	4	16.7	++			
Eurhynchium striatum	4	16.7	++			
Plagiomnium rostratum	4	16.7	++			
Brvum caespiticium (sp.)	4	16.7	++			
Cratogeomys purpureus	4	16.7	++			
Tortella inclinata	4	16.7	++			
Pleurozium schreberi	4	16.7	++			

M. Storch 1983 NATIONALPARK BERCHTESGADEN

TABELLE 18: ROSTSEGGEN-ALPENRISPENGASWEIDE
(*Prunello-Poetum alpinae*
caricetosum ferrugineae)

A Saquina-Ausbildung
B Sesleria-Ausbildung

	A	B
AUFNAHMENUMMER	335 33 662 66 128 57	
AUFNAHMEMONAT	SSJ SS FEU EF PPL PP	
AUFNAHMEFLAECH (QM)	112 12 000 00 000 00	
MEERESHÖHE (10 M)	111 11 235 12 877 91	
EXPOSITION (GRAD)	32 13 49 61 005 50	
HANGNEIGUNG (GRAD)	222 22 005 55	
ARTENZAHL	776 65 406 07	

DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	5 55
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)	5 1 0
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	2 41 055 00
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	777 87 000 00
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	331 12 000 50

Baumarten

Picea abies	B1 3 60.0	1 +1
Picea abies	2 40.0	+ 1
Picea abies	3 100.0	21+ 31
Picea abies	4 40.0	1 +
Larix decidua	1 40.0	1 1
Larix decidua	2 40.0	1 1
Larix decidua	3 100.0	111 11
Sorbus aria	1 20.0	+ r
Acer pseudoplatanus	1 20.0	r

Verb.Char.:

Poa alpina	5 100.0	+21 12
Crepis aurea	2 40.0	+2
Cerastium fontanum s.l.	1 20.0	+

Diff.Subass.:

D

Seslerietea-Arten

Carex ferruginea	5 100.0	122 23
Galium anisophyllum	4 80.0	+++ +
Thymus polytrichus (sp.)	4 80.0	11 +
Phyteuma orbiculare	2 40.0	+ 2
Polygala alpestris	1 20.0	1 +
Alchemilla hoppeana	1 20.0	+
Heracleum austriacum	1 20.0	+
Carex firma	1 20.0	2

lokale Char.:

O,K
D

Parnassia palustris	5 100.0	12+ 1+
Carex flava	5 100.0	221 12
Linum catharticum	4 80.0	111 +
Bellis perennis	4 80.0	111 +
Russiaco farfara	4 80.0	22 11
Chrysanthemum leucanthemum	3 60.0	+ ++
Gentiana aspera	1 20.0	+ +
Briza media	1 20.0	+ +1
Hypnum lindbergii	1 20.0	1
Veronica aphylla	1 20.0	+
Sagina saginoides	3 60.0	++r
Ranunculus alpestris	2 40.0	+2

A B

AUFNAHMENUMMER

335 33
662 66
128 57

Diff. Ausb.:

Veronica chamaedrys	3	60.0	1+r
Campanula scheuchzeri	3	60.0	+1
Campanula stellatum	3	60.0	+1+
Ostrya scoparium	3	60.0	++
Galium album	3	40.0	++
Veratrum album	3	40.0	+r
Carex sylvatica	3	40.0	++
Crocodylium conicum	3	40.0	++
Sanionia uncinata	3	40.0	+3
Thuidium tamariscinum	3	40.0	++
Plagiomnium rostratum	3	40.0	1+
Ajuga reptans	3	40.0	+
Schistidium apocarpum	3	40.0	+
Ranunculus repens	3	40.0	+
Scapania aequiloba	3	40.0	r1
Sesleria varia	3	60.0	+ 22
Calamintha alpina	3	60.0	1
Euphorbia cyperarissias	3	40.0	1+
Rhinanthus glacialis	3	40.0	+
Cardus defloratus	3	40.0	11
Calamagrostis varia	3	40.0	1+

Ord. u. Klass. Char.:

Alchemilla vulgaris	5	100.0	+1+ ++
Prunella vulgaris	5	100.0	12+ +1
Trifolium pratense	5	80.0	++ 1+
Gentiana asclepiadea	5	60.0	+
Lantana lanceolata	5	60.0	++
Euphrasia pecta	5	60.0	1+ +
Achillea millefolium	5	40.0	2
Trifolium repens	5	20.0	+
Cirsium palustre	5	20.0	+
Festuca rubra	5	20.0	+
Pimpinella major	5	20.0	1
Traxacum officinale	5	20.0	+
Gymnadenia conopsea	5	20.0	+

sonstige Kormophyten:

Selaginella selaginoides	5	100.0	+++ +1
Larix decidua	5	100.0	111 11
Picea abies	5	100.0	211 31
Ranunculus montanus	5	100.0	121 ++
Potentilla erecta	5	100.0	+1 21
Lotus corniculatus	5	100.0	r12 1+
Polygala chamaebuxus	5	100.0	+++ 11
Aposeris foetida	5	100.0	+++ ++
Carex flacca	5	80.0	111 21
Hypericum maculatum	5	80.0	+++ 2
Soldanella alpina	5	80.0	+++ 1
Asperula bellidifolium	5	80.0	+++ 1
Helleborus niger	5	80.0	1r 11
Leontodon plicatus	5	80.0	22 11
Toxocarpus calyculatus	5	80.0	+++ 11
Acrostis stolonifera	5	80.0	21 11
Viola biflora	5	80.0	12 ++
Monarda alpina	5	80.0	+++ 1
Senecio fuchsii	5	60.0	+1 +
Lythrum salicaria	5	60.0	11 +
Deschampsia caespitosa	5	60.0	+++ 1
Chenopodium hirsutum	5	60.0	+++ +1
Adenostyles glabra	5	60.0	+++ +
Gymnocarpium robertianum	5	40.0	1 +
Ranunculus nemorosus	5	40.0	+
Fragaria vesca	5	40.0	+
Euphorbia amygdaloides	5	40.0	+
Campanula cochlearifolia	5	40.0	1 +
Festuca ovina	5	40.0	+
Athyrium filix-femina	5	20.0	+
Sorbus aria	5	20.0	+
Valeriana tripteris	5	20.0	+
Veronica officinalis	5	20.0	+
Coeloglossum viride	5	20.0	+
Gymnadenia odoratissima	5	20.0	+
Luzula campestris aq.	5	20.0	+
Luzula pilosa	5	20.0	+
Aster pseudoplatanus	5	20.0	r
Heliosperma quadridentatum	5	20.0	r
Pinguicula sp.	5	20.0	+
Huperzia selago	5	20.0	+
Asplenium viride	5	20.0	r
Polystichum lonchitis	5	20.0	+
Sedum album	5	20.0	r
Vaccinium myrtillus	5	20.0	l
Polygonum viviparum	5	20.0	+
Scabiosa columbaria	5	20.0	r
Lamium epispachum	5	20.0	+
Adenostyles alliariae	5	20.0	+
Senecio abrotanifolius	5	20.0	+
Asplenium adnigrum	5	20.0	+
Carex dioica	5	20.0	+
Acrostis tenuis	5	20.0	+
Nardus stricta	5	20.0	+
Anthyllus vulneraria	5	20.0	+
Mercurialis perennis	5	20.0	+
Knautia dipsacifolia	5	20.0	+
Salvia glutinosa	5	20.0	+
Origanum vulgare	5	20.0	+
Polygonum verticillatum	5	20.0	+
Carex alba	5	20.0	+
Brachypodium sylvaticum	5	20.0	+
Melica nutans	5	20.0	+
Valeriana saxatilis	5	20.0	+
Carolina acaulis	5	20.0	+
Juncus alpino-articulatus	5	20.0	+

A B

AUFNAHMENUMMER

335 33
662 66
128 57

sonstige Thallophyten:

Rhizidiadelphus triquetrus	5	100.0	2++ 21
Fontella tortuosa	5	100.0	+++ +
Cladodium molluscum	5	80.0	+2+ 2
Hylacomium splendens	5	40.0	+
Chiloscyphus pallidus	5	20.0	+
Plagioglossum asplenoides	5	20.0	+
cf. Brachythecium glareosum	5	20.0	+
Plagioglossum bidentatum	5	20.0	+
Atrichum undulatum	5	20.0	3
Brachythecium triquetrum	5	20.0	1
Dichodontium pellucidum	5	20.0	+
Pseudoceros cristatus	5	20.0	+
Rhizoglossum punctatum	5	20.0	+
Pellia endiviasifolia	5	20.0	+
Preissia quadrata	5	20.0	+
Camptopogon halleri	5	20.0	+
Pseudoleskea incurvata	5	20.0	+
Ptychodermis plicatum	5	20.0	+
Rhynchostegium murale	5	20.0	+
Brum sp.	5	20.0	+
Pogonatum urnigerum	5	20.0	+
Pohlia drummondii	5	20.0	+
Polytrichum formosum	5	20.0	1

AUFNAHMENUMMER

335 33
662 66
128 57

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN - TABELLE 19: ROTSCHWINGELWEIDE (Alchemillo-Cynosuretum)

AUFNAHMENUMMER	66 12
AUFNAHME MONAT	JJ UU NN
AUFNAHME FLÄCHE (QM)	12 00 00
MEERESHÖHE (10 M)	11 22 10
EXPOSITION (GRAD)	23 23 05
HANGNEIGUNG (GRAD)	1 30
ARTENZAHL	56 72
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	11 00
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	78 00
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	32 00

Verb.Char.:

Trifolium repens 1 50.0 1

lokale Char. u. Diff.:

Polygala amarella	2	100.0	11
Gentiana verna	2	100.0	11
Plantago lanceolata	2	100.0	11
Plantago media	2	100.0	11
Luzula multiflora	2	100.0	11
Climacium dendroideum	1	50.0	2
Carex montana	1	50.0	+
Festuca pratensis	1	50.0	+

Klass.Char.:

Alchemilla vulgaris	2	100.0	11
Pimpinella major	2	100.0	11
Gentiana asclepiadea	2	100.0	11
Prunella vulgaris	2	100.0	11
Achillea millefolium	2	100.0	11
Festuca rubra	2	100.0	11
Dactylorhiza maculata	1	50.0	1
Dactylis glomerata	1	50.0	1
Trollius europaeus	1	50.0	1
Trifolium pratense	1	50.0	1
Bellis perennis	1	50.0	+
Cirsium palustre	1	50.0	+
Poa alpina	1	50.0	1

sonstige Kormophyten:

Picea abies	B1	2	100.0	11
Picea abies	S	2	100.0	22
Helioportus niger			100.0	11
Potentilla erecta			100.0	11
Polygala chamaebuxus			100.0	11
Hypericum maculatum			100.0	11
Viola biflora			100.0	11
Lythymachia nemorum			100.0	11
Soldanella alpina			100.0	21
Rhinanthus glacialis			100.0	11
Ajuga reptans			100.0	11
Salvia glutinosa			100.0	11
Campanula scheuchzeri			100.0	11
Adenostyles glabra			100.0	11
Aposeris foetida			100.0	22
Carduus defloratus			100.0	11
Leontodon hispidus			100.0	11
Senecio fuchsii			100.0	11
Lisiera ovata			100.0	11
Luzula luzulina			100.0	11
Carex digitata			100.0	11
Carex flacca			100.0	11
Carex sylvatica			100.0	11
Anthoxanthum odoratum			100.0	22
Galamagrostis varia			100.0	11
Deschampsia caespitosa			100.0	11
Aquilegia atrata			100.0	11
Ranunculus nemorosus			100.0	11
Fragaria vesca			100.0	11

AUFNAHMENUMMER 66
12

Lotus corniculatus	1	50.0	+
Euphorbia amygdaloides	1	50.0	+
Heracleum austriacum	1	50.0	+
Galium album	1	50.0	+
Melampyrum pratense	1	50.0	+
Melampyrum sylvaticum	1	50.0	+
Veronica chamaedrys	1	50.0	+
Origanum vulgare	1	50.0	1
Carlinia acutis	1	50.0	1
Homogyne albina	1	50.0	+
Luzula pilosa	1	50.0	+
Selaquinella selaginoides	1	50.0	+
Larix decidua	1	50.0	1
Anemone nemorosa	1	50.0	1
Acer pseudoplatanus	1	50.0	+
Linum catharticum	1	50.0	+
Mercurialis perennis	1	50.0	+
Euphorbia cyparissias	1	50.0	1
Galium anisophyllum	1	50.0	+
Aster bellidiflorus	1	50.0	+
Hieracium sylvaticum	1	50.0	1
Tofieldia calyculata	1	50.0	+
Carex ferruginea	1	50.0	1
Carex lepidocarpa	1	50.0	1
Carex ornithopoda	1	50.0	+
Nardus stricta	1	50.0	1

sonstige Thallophyten:

Rhytidia delphus squarrosus	2	100.0	21
Rhytidia delphus triquetrus	2	100.0	11
Atrichum undulatum	2	100.0	11
Pleurozium schreberi	2	100.0	11
Thuidium tamariscinum	2	100.0	11

AUFNAHMENUMMER 66
12

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN - TABELLE 20: BORSTGRASRASEN (Nardetum alpinum)

AUFNAHMENUMMER	447 660 015
AUFNAHMEMONAT	JJS JUE LLP
AUFNAHMEFLÄCHE (QM)	222 000 000
MEERESHÖHE (10 M)	111 000 788
EXPOSITION (GRAD)	12 904 005
HANGNEIGUNG (GRAD)	223 002
ARTENZAHL	455 614

DECKUNG DER BAUMSCHICHT (%)	5 0
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	22 005
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	398 500
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	12 0+0

Verb.Char.:			
Gentiana pannonica	1	33.3	1
lokale Char. u. Diff.:			
Arnica montana	100.0	111	
Carex pilulifera	100.0	1+	
Nardus stricta	100.0	223	
Calluna vulgaris	66.7	+	
Carex pallens	66.7	1+	
Polygala alpestris	66.7	2+	
Hieracium pilosella	66.7	2+	
Cynosurus cristatus	66.7	++	
Luzula luzuloides	33.3	+	
Campanula barbata	33.3	+	
Antennaria dioica	33.3	+	
Centaurea jacea	33.3	2	
Hypochaeris radicata	33.3	+	
Plantago bifolia	33.3	+	
Danthonia decumbens	33.3	+	
Leucobryum glaucum	33.3	+	
Dianthus superbus	33.3	+	
Phleum hirsutum	33.3	+	
Ord. u. Klass.Char.:			
Potentilla aurea	100.0	12	
Potentilla erecta	100.0	221	
Hypericum maculatum	33.3	+	
Luzula campestris aq.	33.3	+	

sonstige Kormophyten:			
Picea abies	33.3	1	
Picea abies	100.0	222	
Pimpinella major	100.0	1+	
Vaccinium myrtillus	100.0	122	
Achillea millefolium	100.0	+	
Carlina acutis	100.0	12	
Homocyme alpina	100.0	2+	
Anthriscus odoratum	100.0	+	
Festuca rubra	100.0	222	
Larix decidua	33.3	3	
Larix decidua	33.3	1	
Asclepias	66.7	11	
Melampyrum sylvaticum	66.7	2+	
Agrostis tenuis	66.7	21	
Achillea vulgaris	66.7	+	
Viola riviniana + reichenb.	66.7	+	
Lotus corniculatus	66.7	1+	
Trifolium pratense	66.7	11	
Euphorbia cyparissias	66.7	11	
Vaccinium vitis-idaea	66.7	1+	
Ajuga reptans	66.7	1+	
Plantago lanceolata	66.7	1+	
Plantago media	66.7	1+	
Leontodon hispidus	66.7	121	
Thelypteris limbosperma	33.3	1	

AUFNAHMENUMMER	447 660 015	
Anemone nemorosa	1	
Betula pendula	1	
Lysimachia nemorum	1	
Veronica officinalis	1	
Prunella vulgaris	1	
Aposperris foetida	1	
Bellis perennis	1	
Hieracium sylvaticum	1	
Senecio fuchsii	1	
Solidago virgaurea	1	
Carex sylvatica	1	
Selaginella selaginoides	1	
Athyrium filix-femina	1	
Hippocrepis comosa	1	
Polygala chamaebuxus	1	
Galium album	1	
Galium anisophyllum	1	
Campanula scheuchzeri	1	
Cirsium palustre	1	
Hieracium caesium	1	
Tofieldia caliculata	1	
Luzula luzulina	1	
Ranunculus montanus	1	
Ranunculus nemorosus	1	
Trollius europaeus	1	
Anthriscus vulneraria	1	
Geranium sylvaticum	1	
Soldanella alpina	1	
Siene nutans	1	
Gentiana aspera	1	
Rhinanthus glacialis	1	
Thymus polytrichus (sp.)	1	
Chrysanthemum leucanthemum	1	
Crepis aurea	1	
Hieracium sp.	1	
Cymadendron conopea	1	
Listera ovata	1	
Luzula sylvatica s.l.	1	
Carex digitata	1	
Agrostis stolonifera	1	
Briza media	1	
Bactiflex glomerata	1	
sonstige Thallophyten:		
Rhytidadelphus triquetrus	3	100.0
Hylacomium splendens	2	99.7
Leptocarpus bidentata	1	1
Plagiocchia asplenoides	1	1
Calliergonella cuspidata	1	1
Rhytidadelphus squarrosus	1	1
Rhizomnium punctatum	1	1
Plagiomnium elatum	1	1
Polytrichum commune	1	1
Polytrichum formosum	1	1
Cetraria islandica	1	1
Pleurozium schreberi	1	1
Brachythecium salebrosum (sp.)	1	1
Hylacomium pyrenaicum	1	1
Plagiomnium rostratum	1	1
AUFNAHMENUMMER	447 660 015	

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN

TABELLE 21: QUELLFLUREN UND RISPENSEGGENRIED

Davallseegeen-Quellmoor (Caricetum davallianae):

- A Davallseegeen-Quellmoor, Prunella-Ausbildung
 B Davallseegeen-Quellmoor, Reine Ausbildung
 C Cratoneuron-Quellflur (Cratoneuretum filicino-commutatae)
 D Rispenseggenried (Caricetum paniculatae)

	A	B	C	D
AUFNAHMENUMMER	06 01478 01 30774 86 59936	0457 1311 9006	8 4 7	
AUFNAHMEMONAT	JJ JJ NN	JJJOS JJKKE NNLT	JJJS JJJE NNLP	S S P
AUFNAHMEFLAECH (QM)	21 4321 00 00000	211 1 0503 0 0000 0	1 0 0	
MEERESHÖHE (10 M)	1 09 01	111 87101 63858	1 1 1 8084 1 3421 8	1 1 8
EXPOSITION (GRAD)	31 42 05	33 2 20439 00000	33 2 2257 8 5000 0	2 8 0
HANGNEIGUNG (GRAD)	3 50	22212 50505	3211 2 0508 0	2 0
ARTENZAHL	34 25	33323 42400	3122 3 1427 4	3 4

DECKUNG DER 1. BAUMSCHICHT (%)	2 0	< 1 0		
DECKUNG DER 2. BAUMSCHICHT (%)		1 0		
DECKUNG DER STRAUCHSCHICHT (%)	1 0+	2 0+	+ +	
DECKUNG DER KRAUTSCHICHT (%)	68 00	46870 00000	1 0005	1 0
DECKUNG DER MOOSSCHICHT (%)	32 00	32223 00000	2435 2 5000 0	2 0

lokale Char. u. Diff.:

Equisetum arvense	6	50.0	1 1	+ +1 +
Bryum pseudotriquetrum	4	41.7	+ 1	1 1
Calliergonella cuspidata	3	41.7	2 2	2 2
Equisetum palustre	3	16.7		2
Molinia caerulea	5	41.7	3 3134	
Caltha palustris	8	66.7	2	+ 1 1113 1
Brachythecium rivulare	4	33.3		+ 2+3

Klass.Char.:

Scheuchzeria-Caricetea fuscae

Carex davalliana	6	50.0	31 222 3	
Carex lepidocarpa	4	41.7	+ 114	1
Primula farinosa	4	33.3	+ 21 2	
Eriophorum latifolium	4	33.3	+ 2+3	1
Carex panicea	4	33.3	2 2	
Pinguicula vulgaris	4	25.0	1 11	
Parnassia palustris	4	25.0	+ 1 1	
Tofieldia calyculata	4	25.0	+ 1 1	
Campylopus stellatus	4	16.7	+ +	
Calycocorsus stipitata	4	16.7	+ +	2
Carex flava	4	16.7		
Juncus articulatus (sp.)	1	8.3	1 +	
Drepanocladus revolvens (sp.)	1	8.3		
Fissidens adianthoides	1	8.3	+ 1	
Carex fusca	1	8.3		
Selaginella selaginoides	1	8.3		
Juncus alpino-articulatus	1	8.3		

		A	B	C	D
AUFNAHMENUMMER		04	01478	0457	6
		01	30774	1311	4
		86	59936	9006	7
Montio-Cardamineacea					
Cratoneuron commutatum	7	59.3	1	3	1 13 4 2
Cardamine amara	5	41.7	+		1412
Helliosperma quadridentatum	4	33.3	+	+	22
Cratoneuron decipiens	4	16.7	1	+	1
Epilobium alsinifolium	1	18.3		+	2
Philonotis calcarea	1	8.3			+
Stellaria uliginosa					
Phragmitacea					
Carex paniculata	3	25.0	+		1 5
Heidezeiger					
Cirsium palustre	3	25.0	1+	r	
Trifolium pratense	1	16.7	1+		
Veronica beccabunga	1	16.7	1+		
Prunella vulgaris	1	16.7	1r		
Myosotis palustris	1	16.7	+		2
Dactylis glomerata	1	16.7	+		+
Ranunculus acris	1	16.7	+		
Valeriana dioica	1	16.7	+		
Senecio alpinus	1	16.7	+		
Climacium dendroides	1	16.7	+		
Pimpinella maior	1	16.7	+		
Hypericum tetrapetrum	1	16.7	+		
Anthoxanthum odoratum	1	16.7	+		
Briza media	1	16.7	+		
sonstige Kormophyten:					
Potentilla erecta	88	6.7	r	+	2++
Chaerophyllum hirsutum	88	6.7	+		2251 1
Carex flacca	88	12	+	1	1
Crepis paludosa	88	21	+	1	1
Viola biflora	88	1	+	1	1
Aster bellidifolium	88	1	21+	1	1
Picea abies	88	2	+		+
Picea abies	88	1	+		+
Picea abies	88	1	+		+
Acer pseudoplatanus	88	1	11	+	+
Lysimachia nemorosum	88	1	+	1	1
Gentiana asclepiadea	88	1	+	1	2
Tussilago farfara	88	1	11	2	2
Sesleria varia	88	1	11	2	2
Adenosylvia elabra	88	1	+	2	1
Agrostis stolonifera	88	1	+	+	2
Leontodon hispidus	88	1	+	+	+
Alchemilla vulgaris	88	1	+	+	+
Aposeris foetida	88	1	+	1	1
Mentha longifolia	88	1	+	1	2
Soldanella alpina	88	1	+	1	1
Dactylorhiza maculata	88	1	+	1	1
Ranunculus montanus	88	1	+	1	1
Phyteuma orbiculare	88	1	+	1	1
Calamagrostis varia	88	1	+	1	1
Valeriana saxatilis	88	1	+	1	1
Galium anisophyllum	88	1	+	1	1
Deschampsia caespitosa	88	1	+	1	1
Pinguicula sp.	88	1	+	1	1
Gymnocarpium robertianum	88	1	+	1	1
Melica nutans	88	1	+	1	1
Lotus corniculatus	88	1	+	1	1
Listera ovata	88	1	+	1	1
Pinus mugo	88	1	+	1	1
Pinus mugo	88	1	+	1	1
Carex ferruginea	88	1	+	1	1
Galium album	88	1	+	1	1
Scabiosa lucida	88	1	+	1	1
Oxalis acetosella	88	1	+	1	1
Saxifraga rotundifolia	88	1	+	1	1
Athyrum filix-femina	88	1	+	1	1
Geranium sylvaticum	88	1	+	1	1
Primula elatior	88	1	+	1	1
Luzula pilosa	88	1	+	1	1
Ranunculus nemorosus	88	1	+	1	1
Bupththalmum salicifolium	88	1	+	1	1
Cephalanthera longifolia	88	1	+	1	1
Carex diutata	88	1	+	1	1
Larix decidua	88	1	+	1	1
Salix purpurea	88	1	+	1	1
Daphne mezereum	88	1	+	1	1
Carex firma	88	1	+	1	1
Ainus glutinosa	88	1	+	1	1
Ainus incana	88	1	+	1	1
Polygala chamaebuxus	88	1	+	1	1
Salix elaeagnos	88	1	+	1	1
Hieracium sylvaticum	88	1	+	1	1
Dentaria enneaphyllos	88	1	+	1	1
Salix waldsteiniana	88	1	+	1	1
Scabiosa columbaria	88	1	+	1	1
Dactylorhiza majalis	88	1	+	1	1
Salix sp.	88	1	+	1	1
Gentiana aspera	88	1	+	1	1
Centaurea jacea	88	1	+	1	1
Cystopteris fragilis	88	1	+	1	1
Geranium robertianum	88	1	+	1	1
Mentha aquatica	88	1	+	1	1
Festuca rubra	88	1	+	1	1
Poa pratensis	88	1	+	1	1
Poa trivialis	88	1	+	1	1
Chrysosplenium alternifolium	88	1	+	1	1
Rumex obtusifolius	88	1	+	1	1
Fraxinus excelsior	88	1	+	1	1
Veronica chamaedrys	88	1	+	1	1
Juncus effusus	88	1	+	1	1
Agrostis gigantea	88	1	+	1	1
Festuca gigantea	88	1	+	1	1
Gelum rivale	88	1	+	1	1
Stellaria nemorum	88	1	+	1	1
Rumex alpestris	88	1	+	1	1
Adenosylvia alliariae	88	1	+	1	1
Lathyrus pratensis	88	1	+	1	1
Vicia cracca	88	1	+	1	1
Hypericum maculatum	88	1	+	1	1

		A	B	C	D
AUFNAHMENUMMER		04 01478	0457 8		
		01 30774	1311 4		
		86 59936	9006 7		
Valeriana montana	1	8.3			+
Knautia dipsacifolia	1	8.3			+
Ajuga reptans	1	8.3			+
Stachys sylvestica	1	8.3			+
Cirsium arvense	1	8.3			+
Senecio fuchsii	1	8.3			+
sonstige Thallophten:					
Conocephalum conicum	1	41.7	1	1	2
Plagiomnium rostratum	1	25.0	1	+	+
Plagiomnium elatum	1	25.0	2	+	+
Ctenidium molluscum	1	25.0	1	+	+
Lophocolea bidentata	1	16.7		+	1
Atrichum undulatum	1	8.3	+		
Thuidium tamariscinum	1	8.3	+		
Drepanocladus seditneri	1	8.3	1		
Ditrichum flexicaule	1	8.3	+		
Racomitrium canescens	1	8.3	2		
Tortella tortuosa	1	8.3		+	
Brachythecium velutinum (sp.)	1	8.3		2	
Rhizomnium punctatum	1	8.3		1	
Plagiomnium undulatum	1	8.3			+
Plagiochila asplenoides	1	8.3			+
Rhytidiadelphus squarrosus	1	8.3			+
Brachythecium rutabulum (sp.)	1	8.3			+
AUFNAHMENUMMER		04 01478	0457 8		
		01 30774	1311 4		
		86 59936	9006 7		

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN - STETIGKEITSTABELLE

: Weissseegen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald (149)
: Schneehaide-Hainlattich-Tannen-Buchenwald (31)
: Hainsimsen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald (64)
: Neckera-Hainlattich-Tannen-Buchenwald (42)
: Reiner Hainlattich-Tannen-Buchenwald (85)
: Roskseegen-Hainlattich-Tannen-Buchenwald (112)
: Ahorn-Buchenwald (29)
: Ahorn-Eschenwald (19)
: Schluchtwald (33)
: Hasel-Felsenbirnen-Gesellschaft (37)
: Aulwald (10)
: Labkraut-Buchenwald (28)
: Weissseegen-Fichtenwald (15)
: Alpenlattich-Fichtenwald (19)
: Karbonat-Fichtenwald (24)

	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
Lokale Charakter- und Differentialarten:														
<i>erostyles glabra</i>	79.9	80.6	78.1	97.6	43.5	34.8	41.4	31.4	57.6	40.0	39.3			25.0
<i>curialis perennis</i>	82.6	80.6	79.1	97.6	43.5	34.8	41.4	31.4	57.6	40.0	39.3			25.0
<i>ola riviniana</i> + reich.	73.8	48.6	89.1	42.9	72.9	64.7	42.1	42.4	42.4	80.0	85.7	86.7		8.5
<i>anthemum bifolium</i>	61.1	35.5	69.8	57.1	12.9	26.8	18.1	18.1	18.1	40.0	42.9	100.0	47.4	29.2
<i>herba ovata</i>	58.9	35.5	69.8	57.1	12.9	26.8	18.1	18.1	18.1	40.0	42.9	100.0	47.4	29.2
<i>lvia glutinosa</i>	69.1	12.9	87.5	47.6	62.4	33.6	27.6	84.2	81.8	70.0	75.0	46.7		
<i>aquionium undulatum</i>	49.0	12.9	87.5	47.6	62.4	33.6	27.6	84.2	81.8	70.0	75.0	46.7		
<i>achypodium silvaticum</i>	64.9	12.9	87.5	47.6	62.4	33.6	27.6	84.2	81.8	70.0	75.0	46.7		
<i>nicula europaea</i>	63.1	3.7	82.0	14.3	78.8	12.9	41.0	52.6	66.6	10.0	89.3	75.0		
<i>icanum vulgare</i>	38.3	3.7	26.6	14.3	2.4	50.0	4.5	6.1	6.1	20.0	35.7	20.0		
<i>rhynchium striatum</i>	51.1	16.1	29.9	23.8	12.9	6.8	0.0	10.0	10.0	40.0	42.9	6.7		
<i>laminia clinopodium</i>	23.5	16.1	29.9	23.8	12.9	6.8	0.0	10.0	10.0	40.0	42.9	6.7		
<i>ottia nidus-avis</i>	23.5	19.4	26.6	2.4	2.4	3.6	3.0				14.3	26.7		
<i>azzania trilobata</i>	14.8		18.8	38.1	7.1	3.6		6.1	2.7		7.1	20.0	26.3	70.8
<i>lamagrostis varia</i>	95.3	93.5	42.3	90.5	41.2	72.3	72.4	10.5	72.7	30.0	85.7	80.0	10.5	21.7
<i>lycia varia</i>	89.2	48.6	42.3	38.1	33.6	72.3	72.4	10.5	72.7	30.0	85.7	80.0	10.5	21.7
<i>leria varia</i>	73.8	71.0	14.1	38.1	12.9	37.5	17.1	24.1	24.1	30.0	7.1	95.3	5.3	50.0
<i>ter bellidistrium</i>	51.1	42.3	20.0	46.7	20.0	80.4	44.8	26.3	30.3	40.0	3.6	46.7	5.3	70.8
<i>lica rutans</i>	57.0	35.5	10.9	21.4	2.4	33.2	3.4			18.0	21.4	85.7		
<i>lampyrum silvaticum</i>	46.3	48.6	4.3	35.7	15.5	59.9	27.6	10.5	6.1	60.0	28.6	13.3	5.3	83.3
<i>rix decidua</i>	59.1	39.2	31.3	81.0	44.7	47.7	51.7	5.3	48.9	10.0	10.7	6.7		
<i>leronia tripteris</i>	59.1	39.2	31.3	81.0	44.7	47.7	51.7	5.3	48.9	10.0	10.7	6.7		
<i>onica urticifolia</i>	59.1	39.2	31.3	81.0	44.7	47.7	51.7	5.3	48.9	10.0	10.7	6.7		
<i>nocarpium robertianum</i>	59.1	41.9	26.6	78.8	11.6	22.3	61.4	26.3	36.4	30.0	7.1	13.3		
<i>autia dipsacifolia</i>	36.2	48.6	6.3	23.8	27.1	55.6	24.1	26.3	30.3	45.9	14.3			
<i>rex alba</i>	73.2	51.6	25.0	42.9	58.8	1.8	3.4	10.5	24.2	70.3	50.0	3.6	100.0	12.5
<i>rbus aria</i>	37.6	58.1	4.7	35.7	34.1	1.8		10.5	18.2	40.3	21.4	55.3		16.7
<i>rex flacca</i>	51.7	51.6	14.1		8.2	11.6		5.3	12.1	24.3	20.0	42.9	66.7	5.3
<i>lycia chamaebuxus</i>	51.7	48.6	14.1		2.4	16.1				8.1	10.0	10.7	80.0	41.7
<i>herba cyparissias</i>	58.9	3.2	25.0		9.5			5.3		2.7	10.0	14.3	6.7	
<i>phorbia amygdaloides</i>	58.9	3.2	25.0		4.8	15.3	1.8		6.1	2.7	10.0	14.3	6.7	
<i>ica herbaea</i>	6.7	64.5		2.4	1.2	17.0			3.0	5.4		40.0		83.3
<i>ilium martaon</i>	10.1	25.8		7.1	14.1	13.4	13.8		30.3	13.5				8.3
<i>atica nobilis</i>	10.1	64.5	6.3	23.8	36.5	0.9	10.3	5.3	12.1	45.9	20.0	3.6	20.0	
<i>bus saxatilis</i>	18.8	32.3	3.1	16.7	24.7	17.9	17.2		15.2	51.4				45.8
<i>onitum napellus</i>	4.7	22.6	1.6	9.5	1.2	9.8	13.8		21.2	21.6				
<i>itaura montana</i>	15.1	25.8	3.1	11.9	8.2	18.0	17.2		21.2	21.6				
<i>alecia atria</i>	2.0	22.6		9.8	2.7				3.0	27.0	10.0			
<i>leriana saxatilis</i>	2.0	22.6		9.8	2.7				3.0	27.0	10.0			
<i>lanchier ovalis</i>	2.0	22.6		9.8	2.7				3.0	27.0	10.0			
<i>ottia arundinacea</i>	4.0	29.0						3.0	32.4					
<i>itrichum formosum</i>	16.1		59.4	64.3	14.1	39.3	31.0		12.1	10.8		53.6	6.7	54.2
<i>opteris austriaca</i> s.str.	6.7	6.5	53.1	67.3	28.2	35.7	41.4	10.5	9.1	18.1		53.6	94.7	50.0
<i>ila biflora</i>	38.3	3.7	69.8	62.9	10.6	33.9	100.0	52.6	27.3	35.4	30.0	21.4	46.7	
<i>nocarpium dropteris</i>	20.8	9.7	61.9	61.9	8.2	49.8	27.6	10.5	3.0	22.7		36.4		
<i>ila luzulina</i>	18.8		19.0									39.3	15.8	50.0
<i>adamine flexuosa</i>	6.0		34.4	2.4	7.1	16.1	82.8	73.7	15.2	2.7	10.0	17.9		5.3
<i>tydiadelphus loreus</i>	12.8	3.2	67.2	7.1	5.9	27.7	24.1	5.3	12.1		20.0	75.0	40.0	89.5
<i>ula pilosa</i>	20.8			11.9	41.1	24.7	24.1	5.3			10.0	35.7	80.0	16.7
<i>rex silvatica</i>	36.9	6.5	61.9	16.1	23.8	18.0	24.1	79.3	21.2	9.1	35.4	6.7	5.3	4.2
<i>ilium undulatum</i>	1.7	3.2	69.8	2.4	3.4	6.3	6.3	47.4			2.7	55.0		15.8
<i>unculus repens</i>	1.7	3.2	69.8	2.4	3.4	6.3	6.3	47.4			2.7	55.0		15.8
<i>emone nemorosa</i>	1.7	3.2	69.8	2.4	3.4	6.3	6.3	47.4			2.7	55.0		15.8
<i>estum pulstre</i>	1.7	3.2	69.8	2.4	3.4	6.3	6.3	47.4			2.7	55.0		15.8
<i>ilvpteris pheopteris</i>	6.0		42.3	21.4	1.2	11.6	24.1	15.8	9.1	5.4	10.0	60.7	5.3	8.3
<i>onica officinalis</i>	10.7		25.8	9.5	1.2	9.8	17.2				20.0	39.3	13.3	4.2
<i>ica rotundifolia</i>	15.4		15.6						3.0		20.0	39.3	5.3	
<i>chraea squararia</i>														
<i>istidium apocarpum</i>	24.2	6.5	12.5	81.0	30.6	55.4	44.8	39.4	3.0	62.2	21.4			29.2
<i>emoralis</i>	12.1	3.2	7.8	1.2	1.1	11.4	58.6	10.5	16.1	16.1	17.9		10.5	
<i>ania pendulina</i>	14.8	3.2	1.6	47.6	16.1	25.5	34.5	27.3	3.3	14.3	10.7			75.0
<i>ania aequiloba</i>	14.8	3.2	1.6	47.6	16.1	25.5	34.5	27.3	3.3	14.3	10.7			75.0
<i>ania thomsonii</i>	14.8	3.2	1.6	47.6	16.1	25.5	34.5	27.3	3.3	14.3	10.7			75.0
<i>ndonia pvxidata</i> (sp.)	11.4	3.2	1.6	47.6	16.1	25.5	34.5	27.3	3.3	14.3	10.7			75.0
<i>ania aspera</i>	11.4	3.2	1.6	47.6	16.1	25.5	34.5	27.3	3.3	14.3	10.7			75.0
<i>ania alpicola</i>	11.4	3.2	1.6	47.6	16.1	25.5	34.5	27.3	3.3	14.3	10.7			75.0
<i>icera nigra</i>	11.4	3.2	1.6	47.6	16.1	25.5	34.5	27.3	3.3	14.3	10.7			75.0
<i>apharostoma trichophyllum</i>	13.4		15.6	38.1	3.6	15.4	20.7	15.2	6.1	0.0				
<i>intepohia aurea</i>	13.4	6.5	9.4	11.4	11.9	14.5	16.3	9.1	2.7	0.0			7.1	
<i>tigra leucophlebia</i>	13.4													
<i>num cupressiforme</i>	17.4	6.5	9.4	11.4	11.9	14.5	16.3	9.1	2.7	0.0				
<i>ilenum trichomanes</i>	0.7	3.2	9.4	11.4	11.9	14.5	16.3	9.1	2.7	0.0				
<i>icera xylotum</i>	0.7	3.2	9.4	11.4	11.9	14.5	16.3	9.1	2.7	0.0				
<i>ilenum vulgare</i>	0.7	3.2	9.4	11.4	11.9	14.5	16.3	9.1	2.7	0.0				
<i>tigra praetextata</i>	6.0		3.1		10.0	10.5	13.8	15.2	16.1	2.7		7.1		
<i>ilva streptocarpa</i>	6.0				10.0	10.5	13.8	15.2	16.1	2.7		7.1		
<i>ilenum ruta-muraria</i>	3.4	9.7			3.5	8.0	9.4	3.0	3.0		3.6			
<i>ex brachystachys</i>	6.0	3.2				2.7	6.9	5.3	6.1	2.7				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Isoetecium alopecuroides</i>	6.7	3.2	9.4	26.2	14.1	0.9			15.2						
<i>Sambucus racemosa</i>	3.4		1.6	14.3	2.4		6.9	5.3	3.0			7.1			
<i>Neckera crispa</i>	2.0			19.0	1.2	0.9			18.2	5.4					4.
<i>Metzgeria conopsea</i>															
<i>Fraxinus excelsior</i>	32.9	6.5	26.6	35.7	74.1	0.9	41.4	36.8	69.7	100.0	70.0	17.9			
<i>Heileborus niger</i>	38.3	3.2	4.7	7.1	57.6	16.1	3.4		3.0	5.4				5.3	
<i>Abies fruticulosa</i>	3.4		1.6		11.9	24.4		15.8	15.2	8.1	20.0	32.1			
<i>Polyodonatum multiflorum</i>					16.5				2.7						
<i>Carex ferruginea</i>	19.5	71.0	1.6	2.4	4.7	61.6	27.6		3.0						
<i>Soldanella alpina</i>	13.4	16.1				87.0	6.9								
<i>Heracleum austriacum</i>	5.4	45.2				22.3			3.0						
<i>Dentaria enneaphyllos</i>	21.5	61.3	10.9	38.1	17.6	58.0	79.3	10.5	42.4	13.5					
<i>Alchemilla vulgaris</i>	17.4	3.2	31.3	2.6	1.2	52.7	24.1	31.6							
<i>Hypericum maculatum</i>	12.2	2.7	16.7	1.2	1.2	72.4	10.5	10.5	8.1	10.0	17.9	40.0	10.0	10.0	12.
<i>Luculia sylvatica</i> s.l.	15.4	19.1	11.9	2.4	2.4	36.6	34.4	10.5	3.0		10.0	42.9	20.0	10.0	29.
<i>Adenostyles alliariae</i>	9.4	3.2	37.5	7.1	7.1	76.8	82.9	10.5	6.1		10.0	25.0		68.4	33.
<i>Geranium silvaticum</i>	7.4	6.5	1.6	1.2	1.2	81.3	55.1	15.6	3.0	2.7	10.0	3.6		10.0	62.
<i>Saxifraga cotundifolia</i>	6.7		16.7			55.1	21.1	33.0						5.3	
<i>Polystichum lonchitis</i>	13.4	9.7	10.9	23.8	4.7	51.6	58.6	18.2	10.8					33.	
<i>Myosotis silvatica</i>	10.1		7.8	4.8	4.7	86.2	31.6	9.1	2.7		10.0	3.6			
<i>Crepis paludosa</i>	4.7	6.5	10.9			39.3	10.5	54.5	32.4	10.0				5.3	4.
<i>Aconitum vulpura</i>	18.8		1.6	16.7	11.8	37.5	41.4			10.0					
<i>Geum rivale</i>	0.7				1.2	27.5	31.0	10.5						3.6	
<i>Pseudoleisma incurvata</i>	2.0					13.4	10.7	17.2	9.1	2.7				3.6	
<i>Doronicum austriacum</i>						10.7	13.4	17.2						15.8	
<i>Coelodossium viride</i>	3.4		3.1			10.7	13.4	17.2							
<i>Aquilegia alpina</i>	3.0			4.8		10.7	13.4	17.2							
<i>Leontodon hispidus</i>	8.1	9.7	18.8	2.4		4.9	10.3								
<i>Veratrum album</i>	2.0		17.2		1.2	42.9	6.9	10.5				7.1	6.7	57.9	4.
<i>Poa alpina</i>	2.0		4.7			42.9	6.9	10.5						4.	
<i>Potentilla aurea</i>	2.7	3.2		2.4		28.4								5.3	
<i>Trollius europaeus</i>	2.0					42.0	3.4	5.3			10.0	3.6			
<i>Gentiana pannonica</i>						42.0									
<i>Crepis aurea</i>						20.0								5.3	37.
<i>Polygomon viviparum</i>	1.3	6.5				25.0				2.7					
<i>Fagus sylvatica</i>	36.9	83.9	29.7	50.0	82.4	9.8	86.2	26.3	72.7	73.0	40.0	39.3	66.7		12.
<i>Polystichum lobatum</i>	7.4	12.9	12.5	26.2	10.6	13.4	93.1	5.3	51.5	24.0	10.0				
<i>Cystopteris fragilis</i>	6.7		3.1	35.7		15.2	79.3	5.3	15.2	5.4					20.
<i>Adoxa moschatellina</i>						0.9	20.7								
<i>Renunculus lanuginosus</i>							24.1		9.1						
<i>Petasites albus</i>	11.4		29.7	9.5	8.2	11.6	48.3	36.8	60.6	8.1	20.0	53.6			
<i>Cirrhophyllum piliferum</i>	12.1	3.2	10.9		18.8	17.0	20.7	52.6	21.2	16.2	20.0	57.1			
<i>Urtica dioica</i>	12.1		10.9	7.1	8.2	10.7	20.7	78.9	18.2	10.8		17.9		95.3	4.
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	0.7		21.9	2.4		6.3	44.8	78.9	18.2		30.0				
<i>Impatiens noli-tangere</i>	0.7		3.1		10.6	0.9	37.9	73.7	30.3	2.7	40.0	25.0			
<i>Alnus incana</i>			3.1		10.6	0.9		47.4	9.1	16.2	20.0	28.6			
<i>Festuca gigantea</i>	10.1	3.2	6.3		8.2	0.9		47.4	9.1		30.0	3.6			
<i>Geum urbanum</i>	2.0		6.3		9.4		3.4	47.4	9.1		30.0	3.6			
<i>Cirsium oleraceum</i>	1.3	3.2	1.6		1.2	1.8	3.4	36.8	9.1	2.7	40.0	3.6			
<i>Mentha longifolia</i>						0.9		47.4							
<i>Stachys sylvatica</i>	5.4		14.1		2.4			78.9	12.1	2.7	10.0	28.6			
<i>Galeopsis speciosa</i>	4.0		1.6		1.2	2.7	3.4	31.6	12.1	8.1	10.0	10.8			
<i>Cirsium arvense</i>	4.0		1.6		1.2			26.3			10.0	21.4			
<i>Stellaria media</i>	6.0		3.1		4.7	0.9	3.4	21.1		5.4		7.1			
<i>Campanula trachelium</i>	22.8	3.2	15.6	33.3	23.5	1.8	10.3	10.5	42.4	86.5	40.0	17.9			
<i>Anemula silvestris</i>	4.7	16.1	7.1	5.9	2.7	6.9	10.3	10.5	30.3	37.8	20.0		26.7		8.
<i>Lonchaea alpigena</i>	6.0	9.7	6.3	31.0	4.7	5.4	37.8	5.3	42.4	2.7		3.6			
<i>Urtica spicata</i>	6.0		14.7	16.7	4.7	0.8	15.0	21.1	42.4	10.8	10.0				
<i>Urtica glabra</i>	6.0		14.7	16.7	4.7	0.8	15.0	21.1	42.4	10.8	10.0				
<i>Arnica dioica</i>	2.0	6.5	4.7	11.9	7.1	3.6	10.3	10.5	57.6	18.9		3.6			
<i>Asarum europaeum</i>	2.0		3.1		3.6	0.9			21.2	8.1	20.0				
<i>Galium odoratum</i>	2.0		3.1		3.6	0.9			21.2	8.1	20.0				
<i>Bromus benekenii</i>	2.0		3.1		4.7	0.9			21.2	8.1	20.0				
<i>Symphytum tuberosum nodosum</i>								5.3	18.2	2.7	10.0	3.6			
<i>Lunaria rediviva</i>									18.2	2.7		7.1			
<i>Phyllitis scolopendrium</i>				2.4					15.2	2.7					
<i>Festuca altissima</i>				2.4					15.2	2.7					
<i>Eupatorium cannabinum</i>	20.1	6.5	4.7	7.1	10.6	0.9	10.3	36.8	24.2	81.1	50.0	35.7			
<i>Vincetoxicum hirsutinaria</i>	6.0	3.2		2.4	5.9				9.1	37.8					
<i>Corvulus avellana</i>	7.4		15.6	2.4	27.1			10.5	24.2	78.4		14.3			
<i>Clematis vitalba</i>	2.0		1.6		5.9				24.2	35.1	10.0	7.1			
<i>Impatiens helleborine</i>	4.4				11.8				15.2	18.2					
<i>Silene nutans</i>	2.7				3.5		3.4			24.3					
<i>Entodon concinnus</i>	0.7				3.5	0.9				24.3		10.0			
<i>Hypericum montanum</i>	0.7				3.5					24.3					
<i>Homalothecium lutescens</i>				4.8	3.5				3.0	27.0					
<i>Cardamine trifolia</i>			1.6					5.3			20.0	14.3			
<i>Myosotis palustris</i>			20.3			0.9		31.6	3.0		50.0	10.7			
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	2.0	6.5		4.8		0.9	20.7		12.1	2.7	30.0				
<i>Blechnum triviale rivulare</i>	0.7								16.1		30.0	3.6			
<i>Vicia sepium</i>	4.7		6.3		1.2			6.9	10.5	5.4	30.0	14.3			
<i>Potentilla reptans</i>	2.0		3.1						10.5		30.0	3.6			
<i>Carex nemata</i>											30.0	7.1			
<i>Juncus effusus</i>											30.0	7.1			
<i>Rosa canina</i>	1.3		1.6					5.3			30.0	3.6			
<i>Aquopvion caninum</i>											20.0	7.1			
<i>Thelypteris limbosperma</i>	6.7	9.7	10.9		2.4	23.2	6.9	15.8	6.1	2.7					
<i>Blechnum spicant</i>	0.7	6.5	1.6	2.4	1.2	2.7									
<i>Carex pallescens</i>	0.7					1.8									
<i>Lathyrus pratensis</i>	3.4	3.2	1.6			0.9		10.5			10.0	14.3			
<i>Holcus lanatus</i>	2.7				1.2							28.6			
<i>Equisetum silvaticum</i>												7.1			
<i>Francula alnus</i>	8.1	3.2			5.9			5.3		13.5		73.3			
<i>Berberis vulgaris</i>	3.4				7.1					2.7	10.0	3.6	26.7		
<i>Pleurozium schreberi</i>	14.8	6.5	28.1	4.8	1.2	8.9	3.4		5.4		20.0	28.6	33.3	26.3	37.
<i>Abies alba</i>	9.4	32.3	10.9	16.7	20.0	7.1	13.8	10.5	33.3	5.4	30.0	28.6	33.3		41.
<i>Lophocolea bidentata</i>	11.4	3.2	14.1	2.4	1.2	0.9		10.5	6.1	8.1	30.0	10.7	46.7	5.3	
<i>Deschampsia cespitosa</i>	1.3		10.9	2.4	1.2	1.8		26.3	21.2	2.7	10.0	3.6	46.7		
<i>Ptilium crista-castrensis</i>												66.7			4.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Krautige und Zwergstraucharten															
osieris foetida	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
sericea fuchsii	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
alis acetosella	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
schmacha nemorum	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
agria vesca	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
humilis filix-femina	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
lidago virgaurea	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
modvne alpina	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
acutifolius hirsutus	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
eracium sylvaticum	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
manula schuechzeri	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
riana scaberrima	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
cinium mirtillifolium	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
tentilla erecta	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
lex rotunda	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
reum diotilla	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
lium album	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
num calceodolon	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
onica chamaedruss	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
celis muralis	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
anion anisophyllum	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
voparia filix-mas	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
schampsia caespitosa	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ris quadrifida	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
numulus montanus	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
enanthus purpurea	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
rhinaria maior	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
rhinaria verticillatum	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ehringia muscosa	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ytus corniculatus	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
numulus montanus	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ytuma spicatum	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
itolium pratense	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ytus corniculatus	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
rostis stolonifera	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
unella vulgaris	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
numulus viride	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ytuma orbiculare	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
stuca rubra	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
mparia schlegeliana	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
numulus odoratum	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
fieldia calciculata	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
perzia selado	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
numulus glomerata	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
hillea millefolium	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
clivioriza maculata	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
numulus selado	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ellaria nemorum	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
lene vulgaris	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
andrium rubrum	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ipactis atrorubens	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
mex arifolius	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
abis alpina	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
rostis tenuis	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
phrasia dicta	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
abis alpina	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
mnadenia conopea	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
rcaea intermedia	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
numulus acris	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
num maculatum	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
rophularia nodosa	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
a supina	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
reum ornithopoda	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
a pratensis	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
zula campestris agg.	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
thyllis vulneraria	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
necio abrotanifolius	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
phalanthera rubra (sp.)	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
chemilla hoppeana	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
stuca ovina	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
rex lepidocarpa	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ehringia trinervia	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
mex alpinus	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
eracium sp.	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ymus europaeus	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
leriana montana	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
schampsia flexuosa	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
leopdis tetrahit	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
lamprum pratense	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
rola cf rotundifolia	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
nucula sp.	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ncus trifidus ssp. hostii	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
eracium bifidum (sp.)	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
mex obtusifolius	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
eracium sabordium	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
nunculus platanifolius	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
psophila repens	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
mex scutatus	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ucedanum ostruthium	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
rostis aqantea	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
lianthenum nummularium	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
riularia maialis	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ipactis palustris	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ntiana ciliata	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
rola uniflora	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
rcaea luteiflora	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
rola secunda	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
trantia minor	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
leriana officinalis agg.	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
ncus alpino-articulatus	25.8	83.3	9.9	28.6	70.6	70.5	51.7	58.4	39.4	8.1					
itolium medium	25.8	83.3	9.9												

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Dryopteris villarsii</i>						0.9								
<i>Achillea clavennae</i>						0.9								
<i>Carex capillaris</i>														
<i>Moschiriua ciliata</i>														
<i>Verbascum thapsus</i>	2.7		2.4											
<i>Carex ericetorum</i>														
<i>Sentiana utriculosa</i>														
<i>Trifolium montanum</i>														
<i>Cardaminopsis arenosa</i>						0.9					10.0			
<i>Dryopteris (cf) carthusiana</i>											10.0			
<i>Poa annua</i>		1.6	2.4	2.4			10.5							
<i>Carex leporina</i>		1.6				3.6					7.1		5.3	
<i>Veronica fruticans</i>														8.3
<i>Tozzia alpina</i>						3.4								
<i>Rumex acetosa</i>	0.7		3.1							10.0				
<i>Verbascum nigrum</i>	2.0													
<i>Leucorchus albidus</i>	0.7					4.5								
<i>Anemone narcissiflora</i>														
<i>Carum carvi</i>														
<i>Vicia cracca</i>	1.3													
<i>Cypripedium calceolus</i>	1.3			2.4			5.0		3.0	2.7				
<i>Veronica montana</i>		1.6				0.9	10.0							
<i>Glechoma hederacea</i>				1.2										
<i>Teucrium chamaedrys</i>	1.3													
<i>Ranunculus aconitifolius</i>						0.9	10.3							
<i>Allium montanum</i>														
<i>Campanula rotundifolia</i>	4.0			2.4								3.6		
<i>Senecio alpinus</i>		1.6												
<i>Pinguicula alpina</i>														
<i>Achillea atrata</i>						0.9								
<i>Astragalus olivophyllos</i>	0.7								2.7			3.6		
<i>Valeriana dioica</i>	0.7													
<i>Milium effusum</i>	0.7							5.3				3.6		
<i>Epilobium angustifolium</i>	1.3					0.9			2.7				5.3	
<i>Thesium pyrenaicum</i>														
<i>Crepis alpestris (sp.)</i>														
<i>Dactylorhiza matialis</i>														
<i>Hypericum tetrapetrum</i>														
<i>Mentha aquatica</i>														
<i>Athamanta cretensis</i>														
<i>Centaurea scabiosa</i>														
<i>Koeleria pyramidata</i>														
<i>Saxifraga burseriana</i>														
<i>Saxifraga caesia</i>														
<i>Carex ornithopodioides</i>														
<i>Bromus erectus</i>												6.7		
<i>Leucopium vernum</i>														
<i>Onophylis sylvaticum</i>	0.7								6.1					
<i>Galeopsis sp.</i>	0.7	1.6											5.3	
<i>Cirsium vulgare</i>	2.0													
<i>Arctium minus</i>														
<i>Arrhenatherum elatius</i>														
<i>Brachypodium pinnatum</i>														
<i>Carex hirta</i>														
<i>Saxifraga stellaris</i>														
<i>Trisetum flavescens</i>														
<i>Crepis blattarioides</i>						0.9		5.3						
<i>Monotropa hypopitys</i>	2.7			2.4										
<i>Ophrys insectifera</i>	0.7													
<i>Euphrasia rostkoviana</i>	0.7													
<i>Orchis ustulata</i>	0.7													
<i>Orobanche cf caryophyllacea</i>	0.7													
<i>Aquilegia (cf) vulgaris</i>														
<i>Nicotitella nigra</i>														
<i>Poa compressa</i>														
<i>Carex muricata</i>														
<i>Carex pendula</i>														
<i>Hypericum hirsutum</i>						3.6								
<i>Veronica albina</i>														
<i>Medicullaris rostrato-capitata</i>		3.2												
<i>Arctium nemorosum</i>						0.9			3.0					
<i>cf Chrysanthemum vulgare</i>														
<i>Corydalis cava</i>														
<i>Thalictrum saxatile</i>									3.0					
<i>Thymus pulegioides</i>	2.7									2.7				
<i>Torilis japonica</i>														
<i>Erigeron polymorphus</i>				2.4						2.7				
<i>Vinea minor</i>					2.4									
<i>Arabis caerulea</i>														
<i>Carex pulicaris</i>														
<i>Erigeron cf acris</i>														
<i>Salvia pratensis</i>														
<i>Stipa calamagrostis</i>														
<i>Gnaphalium hoppeanum</i>						1.8								
<i>Trifolium badium</i>														
<i>Botrychium lunaria</i>	0.7	1.6				0.9								
<i>Euphorbia dulcis</i>	1.3													
<i>Hieracium laevigatum (sp.)</i>	1.3													
<i>Calamagrostis epideios</i>						0.9								
<i>Cirsium spinosissimum</i>						0.9								
<i>Festuca rupicaprina</i>						0.9								
<i>Potentilla brauneana</i>						0.9								
<i>Agropvron repens</i>	0.7													
<i>Brachypodium rupestre</i>	0.7													
<i>Cardamine impatiens</i>	0.7													
<i>Helictotrichon pubescens</i>	0.7													
<i>Orobanche gracilis</i>	0.7													
<i>Sanguisorba minor</i>	0.7													
<i>Stachys officinalis</i>	0.7													

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3. Thallophyten															
Ctenidium molluscum	61.1	48.4	81.3	100.0	61.2	87.5	100.0	15.8	87.9	73.0	40.0	46.4	10.5	70.8	4
Tortella tortuosa	59.7	58.1	42.2	100.0	42.2	84.8	82.0	15.8	55.3	75.7	20.0	46.4	10.5	70.8	4
Hylocomium splendens	77.9	77.9	76.6	90.5	32.2	58.9	75.0	15.8	45.5	62.2	20.0	28.6	5.3	52.6	9
Plagiothecium saccatum	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1
Plagiothecium asplenioides	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8
Dicranum scoparium	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8
Thuidium tamariscinum	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9
Rhizomnium punctatum	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
Racomitrium rostratum	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8
Rhizidadelphus squarrosus	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
Conocephalum conicum	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
Brachythecium murale	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
Brachythecium rutabulum/sp.	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Campylium stellatum	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Brachythecium sp.	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
Brachythecium salebr. (sp.)	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Cladonia sp.	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Brachythecium velutinum/sp.	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Calypogeia trichomanis	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Peltigera sp.	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Cladonia cf. furcata	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Sanionia uncinata	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
Scleropodium purum	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
Brachythecium glareosum	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Campylium halleri	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Pellia endiviaeifolia	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Placomium cuspidatum	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Rhodobryum roseum	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Hylocomium vernaicum	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Plagiothecium denticulatum	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Barbilophozia barbata	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Scapania sp.	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Bryum capillare	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Bryum sp.	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Ptychodium plicatum	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Cetraria islandica	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Trichum flexicaule	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Placomium elatum	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Bryum caespiticium (sp.)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Pellia quadrata	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Drepanocladus revolvens/sp.	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Cirriophyllum tenuinerve	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Pseudoscleria catenulata	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Pohlia cruda	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Collema sp.	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Lophozia ventricosa	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Trichocolea tomentella	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Racomitrium canescens	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Solorina saccata	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
(cf) Leocolea bantriensis	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Metzgeria pubescens	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Rhizidium rupeum	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Hookeria lucens	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Mnium marginatum (sp.)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Cratoneuron commut. sulcatum	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Curuchium swartzii (sp.)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Barbilophozia sp. (hatcheri)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Cladonia cf. didactyla	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Mnium lacunosum	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Abietinella abietina	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Ptilidium pulcherrimum	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
cf Brachythecium populeum	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Tritomaria exsecta	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Plagiothecium sp.	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Pogonatum urticigerum	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Pohlia drummondii	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Lophozia obtusa	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Lophozia complanata (sp.)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Leocolea muelleri	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Cephalozia cf. loitlesbergeri	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Lepidozia reptans	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Tayloria serrata	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Metzgeria furcata	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Orthothecium rufescens	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Bryum argenteum	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Plagiopus oederi	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Brotherella lorentziana	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Bryum filacium	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Fissidens adianthoides	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Cratoneuron filicinum	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Sphenobolus maritimus	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Antitrichia curtipendula	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Dicranum polysetum	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Emadophila ericetorum	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Thuidium philiberti	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Isopteris muellerianum/sp.	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Pohlia wahlenbergii	3.4														

[illegible]

M. Storch 1983

NATIONALPARK BERCHTESGADEN - STETIGKEITSTABELLE (Fortsetzung)

- 16: Schneeheide-Alpenrosenbusch, Lycopodium-Ausbildung (14)
 17: Schneeheide-Alpenrosenbusch, Amelanchier-Ausbildung (10)
 18: Alpenostflur (19)
 19: Gruenerlenbusch (9)
 20: Dost-Buntreißgrasflur (9)
 21: Rostseedenrasen (8)
 22: Blaugras-Horstseedenrasen (48)
 23: Polsterseedenrasen (13)
 24: Gehölzreiche Gesellschaften auf Feinschuttstandorten (12)
 25: Rostseeden-Alpenrosenrasen (5)
 26: Rotschlingelweide (2)
 27: Borstgrasrasen (3)
 28: Quelltüfen (12)
 29: Braunseedensumpf (3)

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
lokale Charakter- und Differentialarten														
Adenostyles glabra	7.1	60.0	10.5		55.6		56.3		41.7	60.0	100.0			41.7
Heracleolitis perennis		50.0	21.1		55.6		35.4		25.0	20.0	50.0			
Viola riviniana + reich.					44.4		27.1		25.0			66.7		
Maianthemum bifolium	7.1	40.0			55.6		18.8	15.4	25.0		100.0	33.3	16.7	
Listera ovata					55.6		20.9		75.0	20.0	100.0			
Salvia glutinosa					44.4		20.9		83.3	20.0				8.3
Pladiomium undulatum	7.1	10.0		33.3	66.7		8.3			20.0				
Brachypodium sylvaticum					44.4		11.1		8.3	20.0	50.0			
Sanicula europaea		10.0			100.0		22.9		8.3					
Origanum vulgare					33.3		12.5		8.3					
Eurhynchium striatum					33.3		22.9							
Calamintha clinopodium		10.0					12.5		8.3					
Neottia nidus-avis														
Bazzania trilobata	21.4	10.0												33.3
Calamagrostis varia	71.4	100.0	36.8	33.3	100.0		91.7	84.6	75.0	40.0	100.0		25.0	
Ranunculus nemorosus	35.7	30.0	47.4	33.3	66.7	50.0	75.0	46.2	56.7	40.0	50.0	33.3	8.3	
Sesleria varia	57.1	70.0	21.1		33.3	30.0	56.2	33.8	75.0	60.0	50.0		41.7	
Aster bellidiastrium	42.9	40.0	57.4			30.0	54.2	33.3	33.3	20.0			58.3	
Helica nutans	7.1	30.0	15.6		44.4		54.2	33.1	25.0	20.0			16.7	
Melampyrum sylvaticum	71.4	40.0					41.7	30.8	8.3	100.0	50.0	66.7	8.3	
Larix decidua	71.4	100.0	57.9	66.7	22.2	25.0	43.8	7.7	16.7	20.0				
Valeriana tripteris	64.3	20.0	26.3	33.3	11.1		43.8	7.7	16.7	20.0				
Veronica urticifolia	35.7	20.0	26.3	66.7	22.2		43.8	7.7	16.7	20.0			16.7	
Gymnocarpium robertianum	28.6	20.0	36.8	66.7	22.2		37.5		41.7	20.0			8.3	
Knaulia dipsacifolia														
Carex alba		70.0					31.3	15.4	41.7	20.0				
Sorbus aria		70.0					29.2	46.2	83.3	20.0				
Carex flacca		70.0				22.2	58.3	61.5	58.3	100.0	100.0		58.3	
Polypolia chamaecephala	21.4	20.0					58.3	69.2	25.0	100.0	100.0	33.3	8.3	
Euphorbia cyathophylla			5.3		66.7		8.3	46.2	33.3	40.0	50.0	66.7		
Euphorbia amygdaloides					11.1				33.3	40.0	50.0			
Erica herbacea	42.9	100.0					27.1	100.0	25.0					
Lilium martagon	7.1		5.3		33.3		8.3							
Hepatica nobilis		50.0			22.2		8.3							
Rubus saxatilis	28.6	100.0	5.3				25.0	7.7	41.7					
Aconitum napellus	7.1	10.0	26.3		55.6	37.5	14.6							
Centaurea montana		20.0		33.3	44.4		12.5							
Aquilegia atrata							20.8							
Valeriana saxatilis	7.1	20.0					14.6	30.8	8.3	20.0	50.0		25.0	
Amelanchier ovalis		50.0						7.7	16.7					
Molinia arundinacea		20.0					33.3	61.5	66.7					
Polytrichum formosum	64.3	30.0	10.5	33.3			6.3			20.0		33.3	66.7	
Dryopteris austriaca s.str.	64.3	10.0	94.4	66.7						80.0	100.0		58.3	
Viola biflora	64.3	10.0	94.4	66.7		22.2	62.5	20.8						
Gymnocarpium dryopteris	64.3	50.0	26.3	66.7				4.2		20.0	100.0	33.3		
Luzula luzulina	7.1	10.0	10.5		11.1			2.1						
Cardamine flexuosa	14.3		68.4	66.7	22.2									
Phytidadelphus loreus	14.3	10.0	10.5	66.7					7.7	20.0	50.0		8.3	66.7
Luzula pilosa		10.0								40.0	100.0	33.3	8.3	
Carex sylvatica			15.8		33.3		25.0			20.0	50.0		33.3	33.3
Atrichum undulatum			21.1	66.7			12.5			40.0				33.3
Ranunculus repens		10.0	5.3											
Anemone nemorosa							4.2			20.0	50.0	33.3	25.0	
Cirsium palustre		10.0			11.1									
Thelypteris pheopteris		20.0					2.1			20.0		33.3		
Veronica officinalis														
Galium rotundifolium														
Lathraea squamaria														
Schistidium apocarpum	35.7	20.0	15.8		44.4	12.5	45.8		8.3	40.0				33.3
Poa nemoralis	50.0	60.0	10.5		88.9		18.8							
Poa pendulina	50.0	20.0	36.8				18.8			40.0				
Scapania aequiloba	42.9	30.0	21.1	33.3	11.1	12.5	12.5							66.7
Mnium thomsonii	14.3				22.2				7.7					
Cladonia pyxidata (sp.)	14.3				11.1									
Scapania aspera	14.3				11.1									
Clematis alba	42.9	20.0	5.3		11.1									
Lonicera nigra	42.9	20.0				12.5	2.1							
Leptanthus trichophyllum	21.4	10.0	10.5				6.5							
Trentepohlia aurea	21.4	10.0	5.3				18.8	23.1	33.3					
Peltigera leucophlebia	28.6	10.0			11.1		66.7	2.1		16.7				
Hypnum cupressiforme							2.1							
Asplenium trichomanes														
Lonicera xylostemum		7.1			22.2		4.2							
Polypodium vulgare							2.1			25.0				
Peltigera praetextata							16.7							
Encalypta streptocarpa							4.2							
Asplenium ruta-muraria														
Carex brachystachys	14.3		5.3						8.3					

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<i>Isoetheum alopecuroides</i>					11.1		2.1							
<i>Sambucus racemosa</i>							4.2							
<i>Neckera crispa</i>		10.0												
<i>Hetzgeria conuata</i>														
<i>Fraxinus excelsior</i>		10.0	5.3		66.7		22.9		83.3				8.3	
<i>Helleborus niger</i>		10.0					10.4	23.1	50.0	80.0	100.0			
<i>Rubus fruticosus</i>		10.0							16.7					
<i>Polygonatum multiflorum</i>														
<i>Carex ferruginea</i>	42.9	30.0	47.4		11.1	100.0	54.2	23.1	25.0	100.0	50.0		16.7	
<i>Solidella alpina</i>	35.7	10.0	68.4		11.1	87.5	14.6		8.3	80.0	100.0	33.3	33.3	33.3
<i>Heracleum austriacum</i>	14.3	20.0	15.8	33.3		50.0	18.8			20.0	50.0			
<i>Dentaria enneaphyllos</i>	57.1	70.0	63.2	33.3	22.2		8.3							
<i>Aichemilla vulgaris</i>	28.6		100.0	33.3	11.1	100.0	18.8			100.0	100.0	66.7	33.3	33.3
<i>Hypericum maculatum</i>	21.4	20.0	68.4	33.3	22.2		87.5	16.7		80.0	100.0	33.3	8.3	33.3
<i>Luzula sylvatica</i> s.l.	57.1	10.0	57.9	100.0			87.5	18.8						33.3
<i>Adenostyles alliariae</i>	57.1	10.0	69.5	100.0			37.5							66.7
<i>Geranium sylvaticum</i>	50.0	10.0	84.2	66.7	22.2		62.5	25.0		20.0		33.3	16.7	
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	42.9		84.2	100.0										
<i>Polystichum lonchitis</i>	42.9	20.0	57.9		22.2	12.5	10.4			20.0				
<i>Myosotis sylvatica</i>	21.4		42.1	33.3	77.8	25.0	6.3							
<i>Crepis paludosa</i>	7.1	20.0	68.4	66.7	11.1		4.2						58.3	
<i>Aconitum vulpina</i>	14.3		26.3	33.3	11.1		2.1							
<i>Geum rivale</i>			73.7	33.3		37.5							8.3	
<i>Pseudodeskea incurvata</i>			10.5		44.4	50.0	10.4			20.0				
<i>Doronicum austriacum</i>			15.8	66.7										
<i>Coeloglossum viride</i>						12.5	4.2			20.0				
<i>Agrostis alpina</i>	7.1		5.3				4.2							
<i>Leontodon alpinus</i>	28.6		31.6		11.1	75.0	34.6	76.9	50.0	80.0	100.0	66.7	33.3	100.0
<i>Veratrum album</i>			26.3	66.7		62.5	14.6			40.0				
<i>Poa alpina</i>	7.1		31.6			62.5	14.6			100.0	50.0			
<i>Potentilla aurea</i>	7.1					100.0	12.5				50.0	100.0		
<i>Trollius europaeus</i>			31.6			25.0	12.5							
<i>Gentiana pannonica</i>	42.9	10.0	10.5	33.3		50.0	4.2							
<i>Crepis aurea</i>						57.9	10.4			40.0				
<i>Polygonum viviparum</i>	7.1		5.3					7.7		20.0				
<i>Fagus sylvatica</i>		100.0	21.1		77.8		33.3	30.8	83.3					
<i>Polystichum lobatum</i>	21.4		10.5	33.3	77.8		2.1							
<i>Cystopteris fragilis</i>	14.3		42.1		22.2									
<i>Adoxa moschatellina</i>			5.3	33.3									8.3	
<i>Ranunculus lanuginosus</i>			5.3											
<i>Petasites albus</i>			31.6	66.7					8.3					
<i>Carriophyllum piliferum</i>			36.8	66.7		12.5	8.3		16.7	20.0				
<i>Urtica dioica</i>	7.1	20.0	42.1		44.4									
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>			62.5	33.3									8.3	
<i>Impatiens noli-tangere</i>			5.3											
<i>Alnus incana</i>							2.1	15.4	8.3				8.3	
<i>Festuca ovantina</i>						22.2							8.3	
<i>Geum urbanum</i>			5.3	33.3	22.2									
<i>Cirsium oleraceum</i>				33.3					8.3					
<i>Mentha longifolia</i>				33.3									33.3	
<i>Stachys sylvatica</i>			5.3											
<i>Galeopsis speciosa</i>													8.3	
<i>Cirsium arvense</i>														
<i>Stellaria media</i>								7.7					8.3	
<i>Campanula trachelium</i>					77.8		20.8							
<i>Anemula sylvestris</i>					11.1		4.2	15.4	66.7					
<i>Lonicera alpicena</i>	7.1		5.3	33.3			6.3							
<i>Actaea spicata</i>														
<i>Ulmus glabra</i>							2.1							
<i>Aruncus dioicus</i>							2.1		8.3					
<i>Asarum europaeum</i>														
<i>Galium odoratum</i>					11.1									
<i>Bromus benekenii</i>														
<i>Symphytum tuberosum nodosum</i>														
<i>Lunaria rediviva</i>														
<i>Phyllitis scolopendrium</i>														
<i>Festuca altissima</i>														
<i>Eupatorium cannabinum</i>		10.0			88.9		8.3		58.3					
<i>Vincetoxicum hirsutaria</i>					55.6		39.6	7.7						
<i>Corylus avellana</i>							10.4		8.3					
<i>Clematis vitalba</i>							2.1	7.7	16.7					
<i>Epipactis helleborine</i>							4.2							
<i>Clidene rutans</i>					11.1	12.5	14.6							
<i>Entodon concinnus</i>					11.1		27.1	7.7				33.3		
<i>Hypericum montanum</i>							8.3							
<i>Homoiothecium lutescens</i>							14.6							
<i>Cardamine trifolia</i>			5.3											
<i>Myosotis palustris</i>														
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	7.1		21.1		11.1		2.1						16.7	
<i>Brachythecium rivulare</i>				33.3										
<i>Vicia sepium</i>			5.3				4.2						33.3	
<i>Potentilla reptans</i>							11.1							
<i>Carex remota</i>							11.1							
<i>Juncus effusus</i>														
<i>Rosa canina</i>													8.3	
<i>Acaropvion caninum</i>								2.1						
<i>Thelypteris limbosperma</i>		20.0	10.5	33.3			2.1					33.3		66.7
<i>Blechnum spicant</i>		20.0					4.2						33.3	
<i>Carex pallascens</i>						25.0	4.2					66.7		
<i>Lathyrus pratensis</i>					11.1		4.2						8.3	
<i>Holcus lanatus</i>							2.1							
<i>Equisetum sylvaticum</i>														
<i>Francula alnus</i>		10.0												
<i>Berberis vulgaris</i>							6.3	46.2	75.0					
<i>Pleurozium schreberi</i>	64.3	30.0	5.3				53.8		58.3					
<i>Abies alba</i>	16.3	80.0					22.9	23.1	8.3		50.0	33.3		
<i>Lophocolea bidentata</i>	7.1			33.3			4.2		25.0					
<i>Acopodium podagraria</i>										20.0		33.3	16.7	
<i>Ptilium crista-castrensis</i>	42.9	10.0							8.3					

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Sphagnum (cf) nemoreum	14.3	10.0					4.2							66.7
Polytrichum commune												33.3		100.0
Pachythecium undulatum	7.1		10.5											66.7
Adiantum distentifolium														66.7
Carex canescens														100.0
Streptopus amplexifolius			10.5	33.3										
Vaccinium vitis-idaea	00.0	50.0										66.7		
Rhododendron hirsutum	00.0	90.0	21.1				8.3		8.3					
Fragaria nuda	00.0	50.0			11.1	12.5	2.1	7.7	8.3				16.7	
Sorbus chamaemespilus	50.0	60.0	5.3				4.2							
Lycopodium annotinum	71.4	20.0					25.0							
Calamagrostis villosa	52.7	20.0	10.5											
Fritomaria quinqueidentata	52.7	10.0	5.3											
Bazzania tricenata	50.0	10.0					6.3							
Mylia taylori	42.9						6.3							
Parbilophozia lycopodioides	42.9													
Lonicera caerulea	21.4						2.1		8.3					
Betula pubescens	21.4	10.0	5.3											
Listera cordata	21.4													
Cladonia rangiferina	20.6													
Calypogeia neesiana	14.3													
Tetraphis pellucida	14.3													
Pinus cembra	14.3													
Dicranodontium denudatum		10.0					2.1							
Bartramia halleriana														
Salix appendiculata	57.1	20.0	5.3				14.6		25.0					
Rhododendron chamaecistus	21.4		5.3				12.5							
Salix waldsteiniana	14.3						5.3	7.7	8.3				8.3	
Cladonia dracilis macroc.	20.6						2.1							
Juniperus sibirica	21.4							7.7						
Anastrota orcadensis	20.6													
Sphagnum quinquefarium	21.4													
Cirripodium cirrhosum	21.4													
Cardamine amara			57.9									41.7	33.3	
Heliosperma quadridentatum	20.6		25.6									33.3		
Poa hyida	7.1		47.4			37.5				8.3	20.0			
Luzula glabrata	21.4		12.5											
Cystopteris montana	7.1		21.1											
Pellia epiphylla														
Primula elatior			10.5						8.3					
Cicerbita alpina			5.3											
Chiloscyphus pallescens		20.0	21.1									16.7		100.0
Alnus viridis	35.7		10.5				12.5				20.0			
Hynum callichroum	7.1													
Dichodontium pellucidum			21.1								20.0			
Fissidens taxifolius														
Rhizomium magnum			15.8											
Corallorhiza trifida	7.1				11.1									33.3
Heracleum sphondylium eleg.			5.3				2.1							
Sedum album					55.6		8.3			20.0				
Arabis hirsuta			5.3		66.7									
Arabis ciliata					33.3		4.2		8.3					
Carlina acaulis	7.1					87.5	65.8	69.2	8.3	20.0	50.0	100.0		
Phleum alpinum			5.3			75.0	6.3							
Cerastium fontanum s.l.						47.4	2.1			20.0				
Epilobium alpestre	7.1		15.8			47.4	2.1							
Epilobium mutellina						47.4	2.1							
Stellaria graminea	7.1					25.0								
Hieracium villosum			5.3			25.0			4.2					
Cardus personata			5.3			25.0								
Pedicularis recutita			5.3			25.0								
Pedicularis rostrato-spica.	7.1					25.0								
Festuca arundinacea			5.3			25.0								
Androsace chamaejasme						25.0	2.1							
Bartsia alpina						25.0								
Carduus defloratus	14.3	20.0			77.8	25.0	85.4	46.2	50.0	40.0	100.0			
Rhinanthus glacialis							66.7	61.5	16.7	40.0	100.0	33.3	8.3	
Bupththalmum salicifolium		20.0			22.2	25.0	89.6	76.9	75.0					
Thymus polytrichus (sp.)		20.0				12.5	56.3	84.6	16.7	80.0		33.3	8.3	
Scabiosa columbaria	7.1				22.2	25.0	56.3	15.4	41.7	20.0				
Laserpitium latifolium							45.8	15.4	8.3					
Calamita alpina		10.0				66.7	56.8	15.4		60.0				
Carex sempervirens	7.1	10.0	5.3			33.3	25.0	30.8	25.0					
Stachys alopecurus		20.0				33.3	12.5	47.9	38.5	8.3				
Viola hirta					11.1		22.2	15.4						
Anthericum ramosum							22.2	15.4						
Cephalanthera longifolia							12.5					8.3		
Hippocrepis comosa					22.2		33.3	69.2				33.3		
Thesium alpinum					33.3		29.2	61.5						
Drava octopetala	7.1						29.2	61.5	16.7					
Carex firma	14.3						8.3	29.2	16.7					
Carex mucronata							8.3	76.9	8.3	20.0			8.3	
Biscutella laevigata							14.6	29.2						
Primula farinosa							29.2	20.9						
Globularia cordifolia							6.3	20.9						
Gymnadenia odoratissima							6.3	20.9						
Leontodon incanus							5.3	20.9	8.3	20.0				
Gentiana clusii						12.5	18.8	20.9						
Teucrium montanum							2.1	20.9	18.8					
Hieracium staticifolium								20.9	18.8					
Tortella inclinata								20.9	18.8					
Euphrasia salisburgensis							12.5	20.9						
Hieracium piloselloides								20.9	8.3					
Carlina vulgaris								20.9						
Salix elaeagnos							4.2	61.5	83.3				8.3	
Petasites paradoxus							6.3	40.9	41.7					
Prunella grandiflora							8.3	15.4	25.0					
Primula auricula														
Taraxacum officinale						25.0			58.3	20.0				
Arabis pumila	7.1						4.2		41.7					
Kernera saxatilis					11.1		4.2	7.7	20.9					
Viburnum opulus									20.9					
Viburnum lantana									20.9					
Hutchinsia alpina									25.0					

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Tussilago farfara			5.3		33.3		2.1		58.3	80.0			41.7	7
Parnassia palustris	7.1						18.8	30.8	25.0	100.0			28.3	6
Briza media						25.0	20.8	23.1	8.3	60.0			8.3	6
Pellis perennis							12.5			80.0	50.0			
Chrysanthemum leucanthemum						12.5	6.3	30.8		60.0				
Gentiana aspera							8.3			60.0				
Carex flava							29.2	30.8	8.3	100.0			8.3	3
Linum catharticum										80.0				
Sagina saginoides										60.0	50.0			
Hypnum lindberghii								15.4		40.0				
Ranunculus alpestris			5.3							40.0				
Veronica aphylla										20.0				
Plantago lanceolata							16.7	23.1	8.3	60.0		66.7		
Plantago media							18.8	52.8		100.0		66.7		
Polygala amarella	7.1				22.2	37.5	16.7	15.4	16.7					
Gentiana verna							8.3	22.2		100.0				
Trifolium repens					11.1		4.2	22.2		20.0				
Luzula multiflora										100.0				
Festuca pratensis					11.1	12.5				50.0				
Climacium dendroides										50.0			8.3	
Carex montana							2.1			50.0				
Nardus stricta	7.1					37.5	6.3			20.0	50.0	100.0		33.3
Calluna vulgaris		10.0					6.3							
Carex pilulifera												100.0		
Polygala alpestris							4.2			20.0				
Arnica montana												100.0		
Cynosurus cristatus						12.5								
Gentiana lutea							18.8		8.3					
Platanthera bifolia		10.0					2.1	7.7					8.3	
Hieracium pilosella							4.2							
Antennaria dioica								23.1						
Leucobryum glaucum														
Luzula luzuloides														
Dianthus superbus	7.1													
Danthonia decumbens							2.1							
Phleum hirsutum							2.1							
Campanula barbata														
Hieracium caesium														
Hypochoeris radicata														
Caltha palustris			10.5										66.7	100.0
Calliergonella cuspidata								8.3				33.3		
Cratoneuron commutatum	7.1		5.3	33.3				8.3					41.7	33.3
Equisetum arvense														
Bryum pseudotriquetrum			10.5			12.5				20.0				
Carex panicea							2.1	23.1						
Molinia caerulea							2.1	7.7						
Carex davalliana														
Pinguicula vulgaris														
Veronica beccabunga				5.3			2.1	7.7						
Eriophorum latifolium														
Cratoneuron decipiens				5.3										
Carex paniculata														
Epilobium alsinifolium														
Equisetum palustre														
Juncus articulatus (sp.)														
Calvocorsus stiptata						37.5							16.7	100.0
Sphagnum squarrosum														
Juncus filiformis														
Drepanocladus exannulatus														
Carex fusca														
Stellaria uliginosa													8.3	
Epilobium anagallidifolium													8.3	
Callitriche palustris agg.														
Sphagnum girgensohnii														
Vilcomium umbratum	7.1													
Viola palustris														
Philonotis cf caespitosa														
Plagiothecium roeseanum														
sonstige Arten:														
1. Baum- und Straucharten														
Picea abies	57.1	60.0	73.7	100.0	100.0		83.3	84.6	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	66.7
Acer pseudoplatanus	50.0	90.0	42.1	100.0	77.8		45.8	84.6	100.0	20.0	50.0		50.0	
Cornus aucuparia	85.7	60.0	38.9	100.0			10.4							
Daphne mezereum	21.4		5.3	33.3	22.2	75.0	33.3			50.0			8.3	
Rubus idaeus							2.1							
Betula pendula		10.0					2.1							
Pinus sylvestris		10.0					2.1					33.3		
Ribes alpina			5.3		11.1				8.3					
Crataegus monogyna	7.1	10.0						15.4						
Salix glabra							2.1		8.3					
Salix caprea							4.2							
Salix platyphyllos														
Acer platanoides														
Ainus glutinosa														
Salix sp.							2.1						8.3	
Hedera helix							2.1						8.3	
Juniperus communis														
Eunymus europaeus														
Salix purita														
Solanum dulcamara														
Sambucus nigra														
Rhamnus cathartica							2.1							
Ilex aquifolium														
Ligustrum vulgare									8.3					
Salix purpurea														
Rosa cf rubiginosa													8.3	
Prunus avium														
Rosa (cf) micrantha							2.1							
Rumulus lupulus														
Aesculus hippocastanum														
Rhamnus pumila							2.1							
Salix reticulata														
(cf) Cotoneaster integ.														

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2. Krautige und Zwergstraucharten														
<i>Adonis vernalis</i>	35.7	40.0	42.1	100.0	33.3		37.5	30.8	66.7	100.0	100.0	33.3	33.3	
<i>Senecio jacobaea</i>	14.3	10.0	78.9	100.0	100.0	37.5	37.5		25.0	60.0	100.0	33.3	33.3	
<i>Oxalis acetosella</i>	64.3	20.0	63.2	100.0	33.3		16.7		8.3	60.0	100.0	33.3	16.7	66.7
<i>Vismia virgata</i>	21.4	50.0	51.7	66.7	44.4	12.5	20.0		50.0	60.0	100.0	33.3	50.0	100.0
<i>Athyrium filix-femina</i>	42.9	40.0	73.7	100.0	44.4		10.4	7.7	8.3	20.0		33.3	16.7	
<i>Solidago virgaurea</i>	78.9	70.0	26.2	66.7	44.4		33.3							
<i>Homocidus alpinus</i>	7.1	10.0	94.7	100.0	44.4	50.0	27.1			80.0	50.0	100.0		66.7
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	7.1	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	8.3	60.0	50.0	33.3	8.3	
<i>Hieracium sylvaticum</i>	50.0	50.0	10.5	33.3	33.3		25.0	15.4	33.3	60.0	100.0	100.0	66.7	33.3
<i>Campanula trachelium</i>	21.4	40.0	26.2	33.3	33.3		50.0	15.4	33.3	60.0	100.0	100.0	66.7	33.3
<i>Gentiana asclepiadea</i>	92.9	90.0	31.6	33.3	66.7		12.5	92.3	8.3	40.0	100.0	66.7	8.3	
<i>Vaccinium myrtillus</i>	14.3	10.0	31.6	33.3	66.7		12.5	46.2	50.0	20.0	100.0	66.7	8.3	
<i>Potentilla erecta</i>	35.7	20.0	15.3	100.0	100.0		12.5	15.4	25.0	40.0	50.0	33.3	16.7	
<i>Ajuga reptans</i>	7.1	40.0	36.8	66.7	88.9		66.7			20.0				
<i>Carex digitata</i>	14.3	10.0	15.3	33.3	66.7	75.0	14.6			60.0	50.0		8.3	
<i>Myosotis muralis</i>	7.1	40.0	36.8	66.7	88.9		66.7			20.0				
<i>Galium anisophyllum</i>	14.3	10.0	15.3	33.3	66.7	75.0	14.6			60.0	50.0		8.3	
<i>Dracopis filix-mas</i>	42.9	20.0	36.8	66.7	88.9		66.7			20.0				
<i>Deschampsia caespitosa</i>	42.9	20.0	36.8	66.7	88.9		66.7			20.0				
<i>Parthenocissus vitacea</i>	42.9	40.0	42.1	33.3	11.1	50.0	31.3	30.8	16.7	60.0	100.0	33.3	25.0	100.0
<i>Ranunculus montanus</i>	28.6	60.0	47.4	33.3	33.3	12.5	62.5	23.1	33.3	20.0	100.0	100.0	8.3	
<i>Pimpinella major</i>	21.4	40.0	26.2	33.3	33.3		29.2			20.0				
<i>Polyodonotum verticillatum</i>	28.6	10.0	26.2	33.3	33.3		29.2			20.0				
<i>Hebecladus muscosa</i>	21.4	10.0	26.2	33.3	33.3		29.2			20.0				
<i>Lotus corniculatus</i>	21.4	10.0	26.2	33.3	33.3		29.2			20.0				
<i>Epilobium montanum</i>	28.6	10.0	26.2	33.3	33.3		29.2			20.0				
<i>Phytolacca spicata</i>	7.1	10.0	26.2	33.3	33.3		29.2			20.0				
<i>Trientalis europaea</i>	7.1	10.0	26.2	33.3	33.3		29.2			20.0				
<i>Geranium robertianum</i>	42.9	20.0	36.8	66.7	88.9		66.7			20.0				
<i>Acrostichum stoloniferum</i>	42.9	20.0	36.8	66.7	88.9		66.7			20.0				
<i>Asplenium vulgare</i>	42.9	20.0	36.8	66.7	88.9		66.7			20.0				
<i>Asplenium viride</i>	42.9	20.0	36.8	66.7	88.9		66.7			20.0				
<i>Phytolacca orbiculata</i>	42.9	20.0	36.8	66.7	88.9		66.7			20.0				
<i>Campanula cochleariifolia</i>	28.6	10.0	26.2	33.3	33.3		29.2			20.0				
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	7.1	10.0	26.2	33.3	33.3		29.2			20.0				
<i>Lotus corniculatus</i>	21.4	10.0	26.2	33.3	33.3		29.2			20.0				
<i>Hesperis matronalis</i>	35.7	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Dactylis glomerata</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Achillea millefolium</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Dactylorhiza maculata</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Selaginella selaginoides</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Lotus corniculatus</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Silene vulgaris</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Melandrium rubrum</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Epipactis atrorubens</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Rumex acetosella</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Rumex crispus</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Rumex acetosella</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Arabis alpina</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Gymnadenia conopsea</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Circaea intermedia</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Ranunculus acris</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Lamium maculatum</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Scrophularia nodosa</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Poa supina</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Carex ornithopoda</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Poa pratensis</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Luzula campestris</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Anthyllus vulneraria</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Senecio abrotanifolius</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Cephalanthus rubra</i> (sp.)	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Alchemilla hoppeana</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Castanea ovata</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Carex lepidocarpa</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Moehringia trinervia</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Rumex alpinus</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Hieracium sp.</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Elymus europaeus</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Valeriana montana</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Deschampsia flexuosa</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Galeopsis tetrahit</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Melampyrum pratense</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Pyrola rotundifolia</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Pinguicula sp.</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Juncus trifidus</i> ssp. hostii	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Hieracium bifidum</i> (sp.)	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Rumex obtusifolius</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Hieracium sphondylium</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Ranunculus platanifolius</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Gypsophila repens</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Rumex scutellatus</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Peucedanum ostruthium</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Acrostichum giganteum</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Helianthemum nummularium</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Convallaria majalis</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Epipactis palustris</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Gentiana ciliata</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Pyrola uniflora</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Circaea lutetiana</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7	80.0	50.0	66.7	16.7	
<i>Pyrola secunda</i>	14.3	10.0	10.5	11.1	25.0	50.0	43.8	30.8	16.7					

[illegible]

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3. Thallophyten														
Ctenidium molluscum	42.9	40.0	52.6	33.3	66.7	50.0	33.3	30.6	66.7	80.0			25.0	
Tortella tortuosa	71.4	50.0	42.9		100.0	25.0	70.8	69.2	58.3	100.0			8.3	
Placomium splendens	0.0	70.0	42.8				25.0	16.7	40.0			66.7		33.3
Rhytidiaadelphus triquetrus	92.9	60.0	51.6		33.3	25.0	68.8	23.1	16.7	100.0	100.0	100.0		
Plagiophila asplenoides	28.6	20.0	73.7	100.0	11.1	37.0	38.8	8.3	3.3	20.0			8.3	
Plagiophila asplenoides	28.6	20.0	73.7	100.0	11.1	37.0	38.8	8.3	3.3	20.0			8.3	
Fissidens cristatus	21.4	30.0	5.3		33.3		23.1	23.1	33.3	20.0				
Thuidium tamariscinum	7.1	10.0			11.1	12.5	23.1	23.1	33.3	20.0				
Thuidium purpurascens	32.1	10.0			11.1	12.5	23.1	23.1	33.3	20.0				
Plagiomnium rostratum	14.3		5.3		11.1	12.5	23.1	23.1	33.3	20.0				
Rhytidiaadelphus squarrosus	7.1		31.6	33.3			6.3			40.0	100.0	33.3	25.0	100.0
Plagiomnium conicum	14.3		42.9	66.7						20.0				
Rhynchostegium murale	42.9		33.3		11.1	12.5				20.0				
Brachythecium rutabulum/sp.	28.6		42.1	33.3						20.0				
Campylisma stellatum	28.6		42.1	33.3						20.0				
Brachythecium salubre	7.1	10.0			55.6	50.0	10.4	7.7	25.0	60.0			16.7	66.7
Cladonia sp.	28.6		25.8			37.5			8.3					
Brachythecium velutinum/sp.	7.1	10.0	21.1	33.3	11.1	12.5		15.4	8.3			33.3		8.3
Calypogeia trichomanis	7.1	10.0				25.0								
Cladonia cf. furcata	28.6		5.3		22.2		4.2							
Sanionia uncinata	14.3		10.5				4.2							
Scleropodium purum			5.3	33.3	11.1	12.5	16.7			40.0				
cf. Brachythecium glareosum										20.0				
Campylisma halleri	21.4						4.2			20.0				
Pellia endiviaeolia			36.8				4.2			20.0				
Plagiomnium cuspidatum							4.2			20.0				
Rhodobryum roseum		10.0				37.5	6.3							
Plagiomnium pyrenaeicum							4.2							
Plagiomnium denticulatum	21.4		21.1									33.3		
Barbilophozia barbata	7.1		10.5		11.1	12.5	2.1							
Scapania sp.					11.1		4.2							
Bryum caespitium	7.1	10.0					4.2		8.3					
Bryum sp.	7.1	10.0	10.5			12.5	2.1			20.0				
tychodium plicatum					22.2					20.0				
Cetraria islandica	7.1											33.3		
Dicranum flexicaule	7.1						16.7	15.4					8.3	
Plagiomnium elatum			5.3				6.3					33.3	25.0	
Bryum caespitium (sp.)	21.4	10.0			11.1		2.1		8.3	20.0				
Preissia quadrata			5.3				6.3							

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Philonotis fontana			5.3											
Cirriophyllum reichenbachianum														
Plagiothecium laetum														
Homomallium incurvatum														
Bazzania flaccida														
(cf) Lophozia guttulata														
Pannaria pezizoides														
Mnium spinosum														
Bryum cf. pallescens														
Drepanocladus sp.														
Sharpiella seligeri														
Eurhynchium schleicheri														
Jundermannia leiantha														
Isopteridium cf. pulchellum														
Tortula norvegica							2.1							
Homalothecium sericeum							2.1							
Thuidium delicatulum							2.1							
Brachythecium laetum														
Leskeella nervosa														
Pylaisia polyantha														
Brachythecium reflexum														
Hymenostylium recurvirostrum														
Leucodon sciuroides														
Nowellia curvifolia														
Anomodon viticulosus							2.1							
Barbula unguiculata							2.1							
Grimmia sp.							2.1							
Hypnum vaucheri							2.1							
Ricciella sp.														
Brachythecium reflexum														
Campylopus schwarzi														
Eurhynchium cf. praelongum														
Myurocladus luridum														
Hessia uliginosa														
Neckera complanata														
Scepsia cuspiduligera														
Amblystegium juratzkanum														

(Stetigkeitsangaben in Prozent, Aufnahmezahlen in Klammern)

5. Verzeichnis der Aufnahmeorte

Erläuterung: Die Aufnahmepositionen wurden auf den topographischen Karten 1:10 000 ausgemessen, die als Kartierungsgrundlage dienten; dort sind auch die angegebenen Bezugspunkte aufzufinden. Die gemessenen Entfernungen sind Horizontalabstände; die eingeklammerten Zahlen geben die genaue Himmelsrichtung in Grad wieder (vom Bezugspunkt aus gesehen).

- 1: 60 m WSW (241) Schapbach-Diensthütte
- 2: 90 m WSW (255) Schapbach-Diensthütte
- 3: 130 m SW (225) Schapbach-Diensthütte
- 4: 150 m SSW (201) Schapbach-Diensthütte
- 5: 220 m SSW (191) Schapbach-Diensthütte
- 6: 360 m S (173) Schapbach-Diensthütte
- 7: 350 m S (169) Schapbach-Diensthütte
- 8: 400 m SSO (165) Schapbach-Diensthütte
- 9: 310 m W (279) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
- 10: 430 m W (275) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
- 11: 470 m WNW (284) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
- 12: 110 m S (178) Schapbach-Diensthütte
- 13: 1000 m N (357) Stuben-Alm, Brunnen
40 m SW (233) Punkt 824,0
- 14: 960 m N (357) Stuben-Alm, Brunnen
70 m SSW (207) Punkt 824,0
- 15: 920 m N (355) Stuben-Alm, Brunnen
120 m SSW (205) Punkt 824,0
- 16: 890 m N (353) Stuben-Alm, Brunnen
170 m SW (217) Punkt 824,0
- 17: 840 m NNW (348) Stuben-Alm, Brunnen
250 m SW (217) Punkt 824,0
- 18: 800 m N (349) Stuben-Alm, Brunnen
260 m SSW (207) Punkt 824,0
- 19: 860 m NNW (340) Stuben-Alm, Brunnen
330 m SW (230) Punkt 824,0
- 20: 860 m NNW (345) Stuben-Alm, Brunnen
290 m SW (227) Punkt 824,0

- 21: 780 m N (7) Stuben-Alm, Brunnen
280 m SSO (153) Punkt 824,0
- 22: 750 m N (8) Stuben-Alm, Brunnen
300 m SSO (156) Punkt 824,0
- 23: 720 m NNO (18) Stuben-Alm, Brunnen
370 m SSO (146) Punkt 824,0
- 24: 690 m NNO (17) Stuben-Alm, Brunnen
420 m SSO (149) Punkt 824,0
- 25: 570 m NNO (16) Stuben-Alm, Brunnen
- 26: 580 m N (6) Stuben-Alm, Brunnen
- 27: 600 m N (354) Stuben-Alm, Brunnen
- 28: 570 m NNW (337) Stuben-Alm, Brunnen
- 29: 530 m NW (325) Stuben-Alm, Brunnen
- 30: 460 m NW (312) Stuben-Alm, Brunnen
- 31: 930 m NW (312) Stuben-Alm, Brunnen
780 m WSW (239) Punkt 824,0
- 32: 860 m NW (317) Stuben-Alm, Brunnen
680 m SW (235) Punkt 824,0
- 33: 800 m NW (316) Stuben-Alm, Brunnen
680 m SW (231) Punkt 824,0
- 34: 770 m NW (321) Stuben-Alm, Brunnen
630 m SW (227) Punkt 824,0
- 35: 760 m NW (317) Stuben-Alm, Brunnen
680 m SW (227) Punkt 824,0
- 36: 600 m NW (316) Stuben-Alm, Brunnen
700 m SW (214) Punkt 824,0
- 37: 550 m NW (315) Stuben-Alm, Brunnen
710 m SSW (210) Punkt 824,0
- 38: 460 m NW (303) Stuben-Alm, Brunnen
- 39: 720 m WNW (298) Stuben-Alm, Brunnen
920 m SW (221) Punkt 824,0
- 40: 720 m WNW (301) Stuben-Alm, Brunnen
880 m SW (223) Punkt 824,0
- 41: 790 m NW (307) Stuben-Alm, Brunnen
820 m SW (228) Punkt 824,0
- 42: 25 m ONO (63) Schapbach-Diensthütte
- 43: 100 m NO (50) Schapbach-Diensthütte
- 44: 160 m NO (36) Schapbach-Diensthütte
- 45: 220 m ONO (63) Schapbach-Diensthütte
- 46: 220 m NO (51) Schapbach-Diensthütte
- 47: 350 m NO (44) Schapbach-Diensthütte

- 48: 320 m NO (51) Schapbach-Diensthütte
49: 320 m ONO (61) Schapbach-Diensthütte
50: 320 m O (85) Schapbach-Diensthütte
51: 270 m O (93) Schapbach-Diensthütte
52: 90 m NNW (346) Schapbach-Diensthütte
53: 220 m NNW (344) Schapbach-Diensthütte
54: 90 m WNW (289) Stuben-Alm, Brunnen
55: 70 m NNW (328) Stuben-Alm, Brunnen
56: 80 m N (4) Stuben-Alm, Brunnen
57: 170 m NNO (21) Stuben-Alm, Brunnen
58: 130 m NO (43) Stuben-Alm, Brunnen
59: 180 m OSO (103) Stuben-Alm, Brunnen
60: 250 m OSO (117) Stuben-Alm, Brunnen
61: 280 m SSO (150) Stuben-Alm, Brunnen
62: 230 m SSO (151) Stuben-Alm, Brunnen
63: 230 m SSO (161) Stuben-Alm, Brunnen
64: 200 m S (190) Stuben-Alm, Brunnen
65: 300 m SW (221) Stuben-Alm, Brunnen
66: 180 m WSW (239) Stuben-Alm, Brunnen
67: 60 m SW (229) Stuben-Alm, Brunnen
68: 340 m WSW (241) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
69: 440 m WSW (244) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
70: 450 m WSW (237) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
71: 450 m SW (223) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
72: 400 m SSW (207) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
73: 410 m SSW (199) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
74: 420 m S (187) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
75: 240 m S (189) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
76: 250 m SSW (199) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
77: 270 m SSW (209) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
78: 240 m SW (233) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
79: 150 m SSO (154) Forsthaus Ramsau
80: 210 m SO (145) Forsthaus Ramsau
81: 220 m SO (132) Forsthaus Ramsau
82: 210 m OSO (122) Forsthaus Ramsau
83: 200 m SW (233) Forsthaus Ramsau
84: 1320 m NW (325) Stuben-Alm, Brunnen
40 m NW (309) Wirtshaus
85: 1300 m NNW (327) Stuben-Alm, Brunnen
30 m N (352) Wirtshaus

- 86: 570 m ONO (62) Stuben-Alm, Brunnen
120 m NW (310) Futterstelle, nördlicher Stadel
- 87: 560 m ONO (58) Stuben-Alm, Brunnen
160 m NW (313) Futterstelle, nördlicher Stadel
- 88: 550 m NO (52) Stuben-Alm, Brunnen
210 m NW (312) Futterstelle, nördlicher Stadel
- 89: 220 m SSO (152) Schapbach-Diensthütte
- 90: 280 m SSO (154) Schapbach-Diensthütte
- 91: 410 m SSO (152) Schapbach-Diensthütte
310 m NW (323) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
- 92: 240 m NW (321) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
- 94: 90 m WSW (238) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
- 95: 60 m SW (216) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
- 96: 580 m SSW (195) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
290 m NW (323) Punkt 1132
- 97: 650 m SSW (200) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
310 m NW (305) Punkt 1132
- 98: 660 m SSW (202) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
340 m NW (303) Punkt 1132
- 99: 700 m SSW (203) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
340 m WNW (296) Punkt 1132
- 100: 430 m OSO (111) Mitterkaser-Diensthütte
570 m SSW (210) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
- 101: 25 m O (82) Mitterkaser-Diensthütte
- 102: 40 m O (94) Mitterkaser-Diensthütte
- 103: 80 m ONO (76) Mitterkaser-Diensthütte
- 104: 140 m OSO (117) Mitterkaser-Diensthütte
- 105: 180 m OSO (121) Mitterkaser-Diensthütte
- 106: 230 m SO (133) Mitterkaser-Diensthütte
720 m SW (225) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
- 107: 380 m SSO (151) Mitterkaser-Diensthütte
530 m WNW (283) Punkt 1132
- 108: 1140 m NW (314) Stuben-Alm, Brunnen
290 m SSW (201) Wirtshaus
- 109: 1200 m NW (313) Stuben-Alm, Brunnen
270 m SW (213) Wirtshaus
- 110: 1230 m NW (311) Stuben-Alm, Brunnen
310 m SW (221) Wirtshaus
- 111: 1190 m NW (309) Stuben-Alm, Brunnen
370 m SW (213) Wirtshaus

- 112: 1280 m NW (307) Stuben-Alm, Brunnen
400 m SW (227) Wirtshaus
- 113: 1150 m NW (306) Stuben-Alm, Brunnen
440 m SSW (209) Wirtshaus
- 114: 1180 m NW (304) Stuben-Alm, Brunnen
480 m SW (213) Wirtshaus
- 115: 1210 m NW (321) Stuben-Alm, Brunnen
140 m SSW (201) Wirtshaus
- 116: 1250 m NW (320) Stuben-Alm, Brunnen
130 m SW (221) Wirtshaus
- 117: 120 m SW (223) Eckau-Alm, Kaser
- 118: 120 m SSW (211) Eckau-Alm, Kaser
- 119: 380 m SSO (151) Kunterweg-Kirche
230 m O (93) nördliche Sommerau-Holzstube
- 120: 340 m SSO (162) Kunterweg-Kirche
140 m O (94) nördliche Sommerau-Holzstube
- 121: 360 m SSO (166) Kunterweg-Kirche
130 m OSO (107) nördliche Sommerau-Holzstube
- 122: 450 m S (169) Kunterweg-Kirche
180 m SO (136) nördliche Sommerau-Holzstube
- 123: 290 m SSO (148) nördliche Sommerau-Holzstube
310 m SSW (203) Brücke
- 124: 330 m SSO (159) nördliche Sommerau-Holzstube
370 m SSW (205) Brücke
- 125: 430 m SSO (161) nördliche Sommerau-Holzstube
460 m SSW (197) Brücke
180 m WSW (251) Wegkreuzung
- 126: 450 m S (171) nördliche Sommerau-Holzstube
10 m W (270) Weggabelung
- 127: 540 m S (173) nördliche Sommerau-Holzstube
310 m SW (233) Wegkreuzung
- 128: 530 m S (178) nördliche Sommerau-Holzstube
340 m WSW (238) Wegkreuzung
- 129: 590 m S (176) nördliche Sommerau-Holzstube
350 m SW (227) Wegkreuzung
- 130: 550 m SSO (167) nördliche Sommerau-Holzstube
260 m SW (225) Wegkreuzung
- 131: 530 m SSO (159) nördliche Sommerau-Holzstube
190 m SW (221) Wegkreuzung
- 132: 240 m SSW (212) Eckau-Alm, Kaser
- 133: 280 m SW (219) Eckau-Alm, Kaser

- 134: 300 m SW (224) Eckau-Alm, Kaser
135: 280 m WSW (239) Eckau-Alm, Kaser
136: 240 m WSW (249) Eckau-Alm, Kaser
137: 220 m WSW (254) Eckau-Alm, Kaser
138: 210 m W (261) Eckau-Alm, Kaser
139: 180 m W (261) Eckau-Alm, Kaser
140: 130 m WSW (248) Eckau-Alm, Kaser
141: 60 m SW (227) Eckau-Alm, Kaser
142: 100 m O (85) Eckau-Alm, Kaser
143: 360 m OSO (104) nördliche Sommerau-Holzstube
140 m SSO (149) Brücke
144: 410 m OSO (106) nördliche Sommerau-Holzstube
190 m SO (141) Brücke
145: 490 m OSO (117) nördliche Sommerau-Holzstube
180 m NO (43) Wegkreuzung
146: 450 m OSO (119) nördliche Sommerau-Holzstube
160 m NNO (29) Wegkreuzung
147: 530 m SO (131) nördliche Sommerau-Holzstube
80 m O (79) Wegkreuzung
148: 550 m SO (131) nördliche Sommerau-Holzstube
100 m O (91) Wegkreuzung
149: 560 m SO (129) nördliche Sommerau-Holzstube
130 m O (86) Wegkreuzung
150: 590 m SO (131) nördliche Sommerau-Holzstube
130 m OSO (107) Wegkreuzung
151: 310 m SO (124) Schapbach-Diensthütte
152: 330 m OSO (118) Schapbach-Diensthütte
153: 440 m OSO (113) Schapbach-Diensthütte
154: 360 m S (187) Eckau-Alm, Kaser
340 m O (92) Punkt 1300
155: 400 m S (186) Eckau-Alm, Kaser
340 m O (99) Punkt 1300
156: 410 m SSW (194) Eckau-Alm, Kaser
290 m O (99) Punkt 1300
157: 410 m SSW (205) Eckau-Alm, Kaser
210 m O (95) Punkt 1300
158: 420 m SW (215) Eckau-Alm, Kaser
150 m O (85) Punkt 1300
159: 420 m SW (224) Eckau-Alm, Kaser
100 m ONO (58) Punkt 1300

- 160: 450 m SW (228) Eckau-Alm, Kaser
70 m NO (41) Punkt 1300
- 161: 520 m SW (229) Eckau-Alm, Kaser
20 m NW (320) Punkt 1300
- 162: 510 m SW (221) Eckau-Alm, Kaser
60 m SO (124) Punkt 1300
- 163: 660 m SW (227) Eckau-Alm, Kaser
140 m SW (228) Punkt 1300
- 164: 620 m SW (218) Eckau-Alm, Kaser
130 m S (180) Punkt 1300
- 165: 590 m SW (213) Eckau-Alm, Kaser
150 m SSO (155) Punkt 1300
- 166: 690 m NNO (15) Eckau-Alm, Kaser
180 m SW (214) Diensthütte
- 167: 670 m N (7) Eckau-Alm, Kaser
260 m SW (232) Diensthütte
- 168: 690 m N (1) Eckau-Alm, Kaser
310 m WSW (245) Diensthütte
- 169: 680 m N (359) Eckau-Alm, Kaser
320 m WSW (245) Diensthütte
- 170: 680 m N (353) Eckau-Alm, Kaser
390 m WSW (249) Diensthütte
- 171: 700 m NNW (347) Eckau-Alm, Kaser
470 m WSW (253) Diensthütte
- 172: 790 m NNW (348) Eckau-Alm, Kaser
460 m W (264) Diensthütte
- 173: 830 m N (351) Eckau-Alm, Kaser
400 m W (270) Diensthütte
- 174: 790 m N (355) Eckau-Alm, Kaser
340 m W (266) Diensthütte
- 175: 800 m N (1) Eckau-Alm, Kaser
260 m W (267) Diensthütte
- 176: 900 m NNO (15) Eckau-Alm, Kaser
70 m NW (310) Diensthütte
- 177: 540 m SSW (193) Eckau-Alm, Kaser
310 m SO (125) Punkt 1300
- 178: 600 m SSW (193) Eckau-Alm, Kaser
330 m SO (134) Punkt 1300
- 179: 660 m SSW (198) Eckau-Alm, Kaser
320 m SO (145) Punkt 1300

- 180: 650 m SSW (205) Eckau-Alm, Kaser
250 m SSO (155) Punkt 1300
- 181: 750 m SSW (209) Eckau-Alm, Kaser
310 m ONO (65) Punkt 1500
- 182: 820 m SSW (207) Eckau-Alm, Kaser
280 m ONO (77) Punkt 1500
- 183: 840 m SSW (206) Eckau-Alm, Kaser
270 m O (85) Punkt 1500
- 184: 920 m SSW (207) Eckau-Alm, Kaser
240 m O (97) Punkt 1500
- 185: 860 m SSW (212) Eckau-Alm, Kaser
190 m ONO (73) Punkt 1500
- 186: 690 m SSW (203) Eckau-Alm, Kaser
400 m ONO (68) Punkt 1500
- 187: 740 m SSW (201) Eckau-Alm, Kaser
390 m ONO (75) Punkt 1500
- 188: 790 m SSW (198) Eckau-Alm, Kaser
400 m O (85) Punkt 1500
- 189: 830 m SSW (198) Eckau-Alm, Kaser
380 m O (91) Punkt 1500
- 190: 890 m SSW (197) Eckau-Alm, Kaser
380 m O (99) Punkt 1500
- 191: 910 m SSW (199) Eckau-Alm, Kaser
360 m OSO (101) Punkt 1500
- 192: 960 m SSW (201) Eckau-Alm, Kaser
310 m OSO (108) Punkt 1500
- 193: 960 m SSW (204) Eckau-Alm, Kaser
270 m OSO (107) Punkt 1500
- 194: 990 m SSW (209) Eckau-Alm, Kaser
170 m OSO (113) Punkt 1500
- 195: 470 m SO (131) nördliche Sommerau-Holzstube
350 m S (168) Brücke
- 196: 680 m SO (132) nördliche Sommerau-Holzstube
220 m OSO (119) Wegkreuzung
- 197: 710 m SO (132) nördliche Sommerau-Holzstube
240 m OSO (121) Wegkreuzung
- 198: 750 m SO (129) nördliche Sommerau-Holzstube
290 m OSO (113) Wegkreuzung
- 199: 820 m SO (127) nördliche Sommerau-Holzstube
550 m SSW (197) Ramsauer Kirche
80 m NW (324) Wegkreuzung

- 200: 890 m SO (131) nördliche Sommerau-Holzstube
630 m SSW (192) Ramsauer Kirche
40 m SW (227) Wegkreuzung
- 201: 670 m SSW (193) Ramsauer Kirche
70 m SW (215) Wegkreuzung
- 202: 710 m SSW (196) Ramsauer Kirche
120 m SW (227) Wegkreuzung
- 203: 650 m SSW (205) Ramsauer Kirche
170 m W (273) Wegkreuzung
- 204: 700 m SSW (211) Ramsauer Kirche
250 m SSO (147) Wegkreuzung
- 205: 750 m SW (213) Ramsauer Kirche
250 m SSO (161) Wegkreuzung
- 206: 600 m SSO (153) nördliche Sommerau-Holzstube
190 m SSW (194) Wegkreuzung
- 207: 470 m SSO (151) nördliche Sommerau-Holzstube
110 m SW (234) Wegkreuzung
- 208: 560 m NNW (336) Eckau-Alm, Kaser
320 m ONO (77) Punkt 1316
- 209: 580 m NNW (328) Eckau-Alm, Kaser
240 m ONO (74) Punkt 1316
- 210: 520 m NW (325) Eckau-Alm, Kaser
240 m O (89) Punkt 1316
- 211: 660 m NW (321) Eckau-Alm, Kaser
150 m ONO (57) Punkt 1316
- 212: 690 m NW (309) Eckau-Alm, Kaser
20 m ONO (60) Punkt 1316
- 213: 730 m NW (305) Eckau-Alm, Kaser
60 m W (261) Punkt 1316
- 214: 380 m NW (321) Eckau-Alm, Kaser
320 m WSW (251) Punkt 1010
- 215: 390 m NW (322) Eckau-Alm, Kaser
330 m WSW (251) Punkt 1010
- 216: 400 m NW (318) Eckau-Alm, Kaser
370 m WSW (251) Punkt 1010
- 217: 410 m NW (315) Eckau-Alm, Kaser
390 m WSW (251) Punkt 1010
- 218: 430 m NW (303) Eckau-Alm, Kaser
480 m WSW (247) Punkt 1010
- 219: 510 m WNW (297) Eckau-Alm, Kaser
210 m SSO (154) Punkt 1316

- 220: 540 m WNW (289) Eckau-Alm, Kaser
260 m S (173) Punkt 1316
- 221: 530 m WNW (285) Eckau-Alm, Kaser
290 m S (174) Punkt 1316
- 222: 550 m WNW (282) Eckau-Alm, Kaser
320 m S (180) Punkt 1316
- 223: 590 m W (279) Eckau-Alm, Kaser
340 m S (186) Punkt 1316
- 224: 750 m WNW (283) Eckau-Alm, Kaser
310 m SW (215) Punkt 1316
- 225: 130 m OSO (121) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 226: 140 m SSO (159) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 227: 220 m S (187) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 228: 240 m S (181) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 229: 280 m S (171) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 230: 580 m O (79) Wasserbehälter am Watzmannhaus
50 m SSO (167) Falz-Alm, südlicher Kaser
- 231: 610 m O (83) Wasserbehälter am Watzmannhaus
80 m SO (141) Falz-Alm, südlicher Kaser
- 232: 540 m O (78) Wasserbehälter am Watzmannhaus
50 m SSW (211) Falz-Alm, südlicher Kaser
- 233: 490 m O (79) Wasserbehälter am Watzmannhaus
90 m WSW (237) Falz-Alm, südlicher Kaser
- 234: 430 m ONO (66) Wasserbehälter am Watzmannhaus
170 m W (279) Falz-Alm, südlicher Kaser
- 235: 390 m ONO (65) Wasserbehälter am Watzmannhaus
210 m W (275) Falz-Alm, südlicher Kaser
- 236: 350 m ONO (69) Wasserbehälter am Watzmannhaus
240 m W (263) Falz-Alm, südlicher Kaser
- 237: 310 m ONO (59) Wasserbehälter am Watzmannhaus
300 m W (271) Falz-Alm, südlicher Kaser
- 238: 300 m NO (39) Wasserbehälter am Watzmannhaus
380 m WNW (283) Falz-Alm, südlicher Kaser
- 239: 560 m ONO (74) Wasserbehälter am Watzmannhaus
25 m WNW (300) Falz-Alm, südlicher Kaser
- 240: 350 m S (184) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
560 m OSO (110) Punkt 1465
- 241: 440 m S (188) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
570 m OSO (120) Punkt 1465
- 242: 500 m S (187) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
610 m SO (124) Punkt 1465

- 243: 540 m S (187) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
620 m SO (127) Punkt 1465
- 244: 490 m S (173) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
700 m OSO (119) Punkt 1465
- 245: 460 m SSO (167) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
720 m OSO (114) Punkt 1465
- 246: 530 m SSO (159) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
830 m OSO (115) Punkt 1465
- 247: 500 m SSO (152) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
840 m OSO (109) Punkt 1465
- 248: 460 m SSO (147) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
840 m OSO (105) Punkt 1465
- 249: 200 m NO (51) Archenkanzel
- 250: 340 m NO (47) Archenkanzel
1090 m SO (124) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 251: 460 m NO (41) Archenkanzel
1080 m OSO (118) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 252: 540 m NNO (29) Archenkanzel
1000 m OSO (113) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 253: 560 m NNO (26) Archenkanzel
960 m OSO (111) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 254: 470 m NNO (31) Archenkanzel
1000 m OSO (117) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 255: 590 m NNO (19) Archenkanzel
890 m OSO (109) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 256: 650 m N (6) Archenkanzel
760 m OSO (106) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 257: 600 m N (356) Archenkanzel
660 m OSO (111) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 258: 750 m SW (232) Herrenroint-Diensthütte
370 m NW (321) Punkt 1460
- 259: 740 m SW (228) Herrenroint-Diensthütte
320 m NW (324) Punkt 1460
- 260: 720 m SW (216) Herrenroint-Diensthütte
180 m NNW (339) Punkt 1460
- 261: 730 m SW (235) Herrenroint-Diensthütte
410 m NNW (326) Punkt 1460
- 262: 760 m WSW (239) Herrenroint-Diensthütte
470 m NW (321) Punkt 1460
- 263: 620 m SW (232) Herrenroint-Diensthütte
400 m NNW (341) Punkt 1460

- 264: 600 m SW (233) Herrenroint-Diensthütte
420 m NNW (343) Punkt 1460
- 265: 580 m SW (225) Herrenroint-Diensthütte
350 m N (351) Punkt 1460
- 266: 560 m SW (225) Herrenroint-Diensthütte
360 m N (354) Punkt 1460
- 267: 790 m SSW (207) Herrenroint-Diensthütte
50 m N (3) Punkt 1460
- 268: 850 m SSW (207) Herrenroint-Diensthütte
20 m WSW (250) Punkt 1460
- 269: 650 m SW (219) Herrenroint-Diensthütte
250 m N (349) Punkt 1460
- 270: 580 m WSW (239) Herrenroint-Diensthütte
480 m NNW (343) Punkt 1460
- 271: 670 m WSW (241) Herrenroint-Diensthütte
490 m NNW (333) Punkt 1460
- 272: 700 m WSW (251) Herrenroint-Diensthütte
600 m NNW (330) Punkt 1460
- 273: 860 m WSW (248) Herrenroint-Diensthütte
610 m NW (314) Punkt 1460
- 274: 660 m W (258) Herrenroint-Diensthütte
680 m NNW (335) Punkt 1460
- 275: 590 m W (259) Herrenroint-Diensthütte
670 m NNW (341) Punkt 1460
- 276: 580 m WSW (255) Herrenroint-Diensthütte
630 m NNW (341) Punkt 1460
- 277: 550 m WSW (247) Herrenroint-Diensthütte
560 m NNW (345) Punkt 1460
- 278: 570 m WSW (242) Herrenroint-Diensthütte
510 m NNW (343) Punkt 1460
- 279: 600 m WSW (236) Herrenroint-Diensthütte
450 m NNW (341) Punkt 1460
- 281: 140 m NW (303) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 282: 190 m WNW (287) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 283: 200 m WNW (281) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 284: 180 m W (267) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
- 285: 200 m OSO (115) Eckau-Alm, Kaser
- 286: 250 m O (98) Eckau-Alm, Kaser
- 287: 250 m OSO (121) Eckau-Alm, Kaser
- 288: 240 m SO (133) Eckau-Alm, Kaser
- 289: 250 m SO (139) Eckau-Alm, Kaser

- 290: 290 m SSO (149) Eckau-Alm, Kaser
291: 270 m SSO (165) Eckau-Alm, Kaser
292: 660 m WSW (241) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
160 m S (187) Punkt 1465
293: 710 m WSW (239) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
210 m SSW (195) Punkt 1465
294: 770 m WSW (239) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
260 m SSW (204) Punkt 1465
295: 790 m WSW (238) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
280 m SSW (204) Punkt 1465
296: 940 m SW (234) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
450 m SSW (208) Punkt 1465
297: 950 m SW (231) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
470 m SSW (204) Punkt 1465
298: 860 m WSW (238) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
350 m SSW (210) Punkt 1465
299: 640 m WSW (236) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
210 m S (173) Punkt 1465
300: 600 m WSW (241) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
140 m SSO (167) Punkt 1465
301: 660 m SSO (155) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
550 m SSW (211) Punkt 1330
302: 630 m SSO (155) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
530 m SW (214) Punkt 1330
303: 640 m SSO (151) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
490 m SSW (211) Punkt 1330
304: 600 m SSO (149) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
450 m SW (215) Punkt 1330
305: 640 m SO (145) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
440 m SSW (207) Punkt 1330
306: 730 m SSO (148) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
500 m SSW (200) Punkt 1330
307: 820 m SSO (155) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
650 m SSW (199) Punkt 1330
308: 910 m SSO (159) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
320 m OSO (101) Punkt 1132
309: 760 m SSO (159) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
270 m ONO (72) Punkt 1132
310: 860 m NW (317) Stuben-Alm, Brunnen
680 m SW (235) Punkt 824,0

- 311: 860 m NW (317) Stuben-Alm, Brunnen
680 m SW (235) Punkt 824,0
- 312: 860 m NW (317) Stuben-Alm, Brunnen
680 m SW (235) Punkt 824,0
- 313: 860 m NW (317) Stuben-Alm, Brunnen
680 m SW (235) Punkt 824,0
- 314: 860 m NW (317) Stuben-Alm, Brunnen
680 m SW (235) Punkt 824,0
- 315: 180 m OSO (121) Gotzenthaldiensthütte
- 316: 190 m SO (127) Gotzenthaldiensthütte
- 317: 250 m OSO (111) Gotzenthaldiensthütte
- 318: 960 m NO (35) Wasserbehälter am Watzmannhaus
130 m WNW (296) Mitterkaser-Alm, südlicher Kaser
- 319: 850 m NO (35) Wasserbehälter am Watzmannhaus
170 m W (258) Mitterkaser-Alm, südlicher Kaser
- 320: 790 m NNO (25) Wasserbehälter am Watzmannhaus
320 m W (266) Mitterkaser-Alm, südlicher Kaser
- 321: 680 m NNO (23) Wasserbehälter am Watzmannhaus
400 m WSW (254) Mitterkaser-Alm, südlicher Kaser
- 322: 110 m SW (221) Gotzenthaldiensthütte
- 323: 110 m WSW (247) Gotzenthaldiensthütte
- 324: 160 m W (269) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 325: 220 m W (274) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 326: 240 m W (277) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 327: 310 m W (277) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 328: 350 m W (280) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 329: 370 m WNW (281) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 330: 400 m W (279) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
390 m S (173) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation
- 331: 360 m S (179) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation
- 332: 390 m S (182) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation
- 333: 450 m S (185) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation
- 334: 470 m S (181) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation
- 335: 430 m NO (34) Gotzenthaldiensthütte
370 m S (178) Punkt 1160
- 336: 470 m NO (53) Gotzenthaldiensthütte
470 m SSO (161) Punkt 1160
- 337: 470 m ONO (71) Gotzenthaldiensthütte
610 m SSO (159) Punkt 1160
- 338: 540 m ONO (75) Gotzenthaldiensthütte
650 m SSO (152) Punkt 1160

- 339: 420 m O (79) Gotzenthal-Diensthütte
670 m SSO (163) Punkt 1160
- 340: 440 m O (92) Gotzenthal-Diensthütte
780 m SSO (163) Punkt 1160
- 341: 580 m OSO (109) Gotzenthal-Diensthütte
960 m SSO (160) Punkt 1160
- 342: 740 m OSO (112) Gotzenthal-Diensthütte
1100 m SSO (155) Punkt 1160
- 343: 620 m ONO (77) Gotzenthal-Diensthütte
710 m SSO (146) Punkt 1160
- 344: 140 m SO (123) Priesberg-Alm, Punkt 1460
860 m SSW (195) Brennhütte
- 345: 200 m OSO (110) Priesberg-Alm, Punkt 1460
830 m SSW (191) Brennhütte
- 346: 260 m OSO (111) Priesberg-Alm, Punkt 1460
850 m S (187) Brennhütte
- 347: 390 m O (97) Priesberg-Alm, Punkt 1460
800 m S (177) Brennhütte
- 348: 530 m O (82) Priesberg-Alm, Punkt 1460
700 m SSO (166) Brennhütte
- 349: 560 m O (81) Priesberg-Alm, Punkt 1460
690 m SSO (163) Brennhütte
- 350: 650 m ONO (77) Priesberg-Alm, Punkt 1460
670 m SSO (155) Brennhütte
- 351: 620 m ONO (74) Priesberg-Alm, Punkt 1460
630 m SSO (157) Brennhütte
- 352: 240 m OSO (111) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 353: 100 m SSO (147) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 354: 130 m SSO (167) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 355: 150 m S (190) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 356: 140 m SSW (209) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 357: 750 m SSW (198) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
270 m WNW (287) Punkt 1132
- 358: 250 m WNW (301) Schapbach-Diensthütte
- 359: 310 m NW (308) Schapbach-Diensthütte
- 360: 200 m S (178) Stuben-Alm, Brunnen
- 361: 640 m SW (213) Stuben-Alm, Brunnen
260 m NNW (328) Punkt 1362
- 362: 860 m SSW (208) Stuben-Alm, Brunnen
200 m W (271) Punkt 1362
- 363: 340 m OSO (107) Stuben-Alm, Brunnen

- 364: 240 m SO (123) Stuben-Alm, Brunnen
365: 350 m SO (140) Stuben-Alm, Brunnen
180 m N (357) Punkt 1234
366: 280 m SSO (157) Stuben-Alm, Brunnen
367: 450 m SSO (153) Stuben-Alm, Brunnen
60 m NNW (326) Punkt 1234
368: 550 m SO (134) Stuben-Alm, Brunnen
170 m ONO (70) Punkt 1234
369: 380 m WSW (256) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
400 m NO (51) Mitterkaser-Diensthütte
370: 80 m NO (35) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
371: 170 m W (269) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
372: 170 m NW (323) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
373: 260 m SW (234) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
374: 260 m SW (223) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
375: 570 m ONO (58) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
420 m NW (307) Punkt 1460
376: 570 m OSO (121) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
460 m SW (223) Punkt 1460
377: 480 m SO (125) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
520 m SW (231) Punkt 1460
378: 260 m SSW (196) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
379: 320 m N (2) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
380: 400 m NW (311) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
410 m S (187) Punkt 1132
381: 800 m NW (303) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
470 m WSW (241) Punkt 1132
382: 580 m NNW (328) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
180 m SSW (198) Punkt 1132
383: 260 m NW (304) Kühroint-Alm, Wasserbehälter
384: 550 m N (7) Eckau-Alm, Kaser
130 m N (357) Punkt 1010
385: 330 m NNW (340) Eckau-Alm, Kaser
220 m WSW (239) Punkt 1010
386: 260 m WNW (295) Stuben-Alm, Brunnen
387: 430 m NNO (12) Stuben-Alm, Brunnen
388: 110 m O (84) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
389: 160 m ONO (76) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
390: 140 m N (5) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
391: 210 m NW (323) Lahnwald-Diensthütte
392: 150 m NW (318) Lahnwald-Diensthütte

- 393: 110 m NNO (31) Lahnwald-Diensthütte
 394: 130 m ONO (66) Lahnwald-Diensthütte
 395: 160 m SO (127) Lahnwald-Diensthütte
 396: 280 m S (185) Lahnwald-Diensthütte
 397: 230 m SW (231) Lahnwald-Diensthütte
 398: 160 m SW (231) Lahnwald-Diensthütte
 399: 190 m W (271) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
 400: 210 m W (259) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
 401: 180 m WSW (247) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
 402: 210 m SW (235) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
 403: 180 m SW (221) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
 404: 180 m NNW (329) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
 405: 220 m N (349) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
 406: 200 m NNO (23) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
 407: 820 m N (355) Ofental-Diensthütte
 90 m SW (221) Kehre
 408: 580 m NNW (337) Ofental-Diensthütte
 420 m SSW (211) Kehre
 409: 560 m NNW (342) Ofental-Diensthütte
 400 m SSW (205) Kehre
 410: 680 m N (357) Ofental-Diensthütte
 220 m S (185) Kehre
 411: 670 m N (1) Ofental-Diensthütte
 220 m S (172) Kehre
 412: 590 m N (10) Ofental-Diensthütte
 330 m SSO (161) Kehre
 413: 240 m WNW (297) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
 414: 330 m WNW (297) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
 415: 700 m N (10) Lahnwald-Diensthütte
 570 m SO (123) Kehre
 416: 580 m N (359) Lahnwald-Diensthütte
 550 m SO (140) Kehre
 417: 620 m N (9) Lahnwald-Diensthütte
 600 m SO (131) Kehre
 418: 310 m OSO (118) Schapbach-Diensthütte
 419: 750 m OSO (120) Engert-Alm, Kaser
 320 m N (2) Hirschlache
 420: 730 m SO (124) Engert-Alm, Kaser
 280 m N (349) Hirschlache
 421: 820 m SO (130) Engert-Alm, Kaser
 160 m N (350) Hirschlache

- 422: 930 m SO (135) Engert-Alm, Kaser
40 m NNO (19) Hirschlache
- 423: 1100 m SO (126) Engert-Alm, Kaser
240 m O (82) Hirschlache
- 424: 1190 m SO (127) Engert-Alm, Kaser
310 m O (95) Hirschlache
- 425: 320 m S (175) Engert-Alm, Kaser
- 426: 330 m SSO (163) Engert-Alm, Kaser
- 427: 360 m SSO (164) Engert-Alm, Kaser
- 428: 370 m SSO (155) Engert-Alm, Kaser
- 429: 340 m SSO (154) Engert-Alm, Kaser
- 430: 440 m SSO (151) Engert-Alm, Kaser
- 431: 450 m SO (145) Engert-Alm, Kaser
- 432: 200 m S (179) Engert-Alm, Kaser
- 433: 190 m SSW (203) Engert-Alm, Kaser
- 434: 320 m O (83) Sulzenstein-Diensthütte
- 435: 290 m O (84) Sulzenstein-Diensthütte
- 436: 380 m SO (137) Sulzenstein-Diensthütte
- 437: 380 m SSO (158) Sulzenstein-Diensthütte
- 438: 440 m S (171) Sulzenstein-Diensthütte
- 439: 470 m S (169) Sulzenstein-Diensthütte
- 440: 520 m SSO (159) Sulzenstein-Diensthütte
440 m NNO (31) Hirschbichlkopf 1377,9 m
- 441: 360 m NO (42) Hirschbichlkopf 1377,9 m
- 442: 450 m NO (52) Hirschbichlkopf 1377,9 m
- 443: 390 m ONO (57) Hirschbichlkopf 1377,9 m
- 444: 280 m ONO (61) Hirschbichlkopf 1377,9 m
- 445: 210 m ONO (65) Hirschbichlkopf 1377,9 m
- 446: 220 m O (80) Hirschbichlkopf 1377,9 m
- 447: 640 m SSW (193) Stuben-Alm, Brunnen
170 m NNO (31) Punkt 1362
- 448: 900 m SW (213) Stuben-Alm, Brunnen
290 m W (271) Punkt 1362
- 449: 380 m NNW (330) Mittereis-Diensthütte
- 450: 380 m NNW (338) Mittereis-Diensthütte
- 451: 470 m NNW (339) Mittereis-Diensthütte
1070 m W (263) Hocheiskopf 1699,4 m
- 452: 600 m NNW (345) Mittereis-Diensthütte
1070 m W (272) Hocheiskopf 1699,4 m
- 453: 720 m NNW (347) Mittereis-Diensthütte
1080 m W (278) Hocheiskopf 1699,4 m

- 454: 1070 m WNW (288) Hocheiskopf 1699,4 m
360 m WSW (240) Hirschlache
- 455: 1230 m WNW (287) Hocheiskopf 1699,4 m
490 m WSW (253) Hirschlache
- 456: 940 m NO (46) Engert-Alm, Kaser
180 m WNW (296) Weggabelung
- 457: 790 m NO (46) Engert-Alm, Kaser
260 m W (262) Weggabelung
- 458: 520 m S (171) Engert-Alm, Kaser
590 m WNW (287) Hirschlache
- 459: 590 m S (173) Engert-Alm, Kaser
580 m W (280) Hirschlache
- 460: 540 m S (177) Engert-Alm, Kaser
640 m WNW (283) Hirschlache
- 461: 540 m S (182) Engert-Alm, Kaser
680 m WNW (281) Hirschlache
- 462: 660 m S (171) Engert-Alm, Kaser
550 m W (273) Hirschlache
- 463: 540 m SSO (166) Engert-Alm, Kaser
540 m WNW (288) Hirschlache
- 464: 310 m ONO (69) Mittereis-Diensthütte
- 465: 420 m ONO (61) Mittereis-Diensthütte
30 m NNO (30) Abzweigung
- 466: 470 m ONO (57) Mittereis-Diensthütte
90 m NNO (27) Abzweigung
- 467: 530 m NO (53) Mittereis-Diensthütte
160 m NNO (26) Abzweigung
- 468: 400 m WSW (251) Hocheiskopf 1699,4 m
710 m SSO (153) Hirschlache
- 469: 260 m WSW (251) Hocheiskopf 1699,4 m
- 470: 50 m WSW (254) Hocheiskopf 1699,4 m
- 471: 340 m SSO (167) Sulzenstein-Diensthütte
- 472: 230 m SSO (162) Sulzenstein-Diensthütte
- 473: 250 m S (176) Sulzenstein-Diensthütte
- 474: 290 m S (183) Sulzenstein-Diensthütte
- 475: 310 m S (189) Sulzenstein-Diensthütte
- 476: 80 m SSW (193) Sulzenstein-Diensthütte
- 477: 70 m SSO (167) Sulzenstein-Diensthütte
- 478: 40 m O (100) Sulzenstein-Diensthütte
- 479: 390 m SSO (166) Sulzenstein-Diensthütte
- 480: 230 m SSO (150) Sulzenstein-Diensthütte

- 481: 270 m SO (128) Sulzenstein-Diensthütte
- 482: 180 m SO (127) Sulzenstein-Diensthütte
- 483: 130 m O (94) Sulzenstein-Diensthütte
- 484: 120 m ONO (63) Sulzenstein-Diensthütte
- 485: 160 m ONO (66) Sulzenstein-Diensthütte
- 486: 240 m O (97) Sulzenstein-Diensthütte
- 487: 270 m O (96) Sulzenstein-Diensthütte
- 488: 320 m S (181) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
- 489: 220 m OSO (119) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
- 490: 380 m OSO (121) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
- 491: 630 m NNW (341) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
- 450 m WNW (284) Punkt 805
- 492: 1080 m N (359) Lahnwald-Diensthütte
- 80 m NO (53) Kehre
- 493: 1110 m N (350) Lahnwald-Diensthütte
- 110 m NW (304) Kehre
- 494: 1120 m NNW (340) Lahnwald-Diensthütte
- 60 m NNW (345) Kehre
- 495: 1050 m NNW (331) Lahnwald-Diensthütte
- 150 m WSW (237) Kehre
- 496: 990 m NNW (329) Lahnwald-Diensthütte
- 190 m SW (221) Kehre
- 497: 960 m NNW (327) Lahnwald-Diensthütte
- 260 m SW (219) Kehre
- 498: 890 m NW (324) Lahnwald-Diensthütte
- 310 m SSW (209) Kehre
- 499: 630 m SSW (204) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
- 1050 m NNW (338) Ofental-Diensthütte
- 390 m WNW (281) Kehre
- 500: 560 m SSW (199) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
- 340 m WNW (294) Kehre
- 501: 580 m S (190) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
- 250 m WNW (292) Kehre
- 502: 580 m S (185) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
- 190 m WNW (293) Kehre
- 503: 590 m S (172) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
- 90 m NNW (326) Kehre
- 504: 610 m S (170) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
- 70 m NNW (343) Kehre
- 505: 600 m SSO (163) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
- 110 m NNO (29) Kehre

- 506: 230 m NNW (326) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
507: 250 m NNW (341) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
508: 280 m N (351) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
509: 350 m WSW (254) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
510: 340 m W (261) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
511: 310 m W (274) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
512: 310 m WNW (285) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
513: 610 m NNO (12) Lahnwald-Diensthütte
630 m SO (129) Kehre
514: 420 m NO (46) Mittereis-Diensthütte
790 m S (173) Hirschlache
515: 590 m W (261) Hocheiskopf 1699,4 m
600 m SSO (167) Hirschlache
516: 620 m W (266) Hocheiskopf 1699,4 m
550 m S (169) Hirschlache
517: 660 m W (280) Hocheiskopf 1699,4 m
390 m S (171) Hirschlache
518: 720 m WNW (285) Hocheiskopf 1699,4 m
320 m S (177) Hirschlache
519: 780 m WNW (286) Hocheiskopf 1699,4 m
290 m S (187) Hirschlache
520: 850 m WNW (289) Hocheiskopf 1699,4 m
240 m SSW (200) Hirschlache
521: 940 m WNW (296) Hocheiskopf 1699,4 m
150 m WSW (236) Hirschlache
522: 570 m W (280) Hocheiskopf 1699,4 m
430 m SSO (159) Hirschlache
523: 520 m W (279) Hocheiskopf 1699,4 m
470 m SSO (155) Hirschlache
524: 470 m W (277) Hocheiskopf 1699,4 m
510 m SSO (151) Hirschlache
525: 420 m W (275) Hocheiskopf 1699,4 m
550 m SSO (147) Hirschlache
526: 380 m W (269) Hocheiskopf 1699,4 m
527: 360 m W (278) Hocheiskopf 1699,4 m
528: 330 m WNW (293) Hocheiskopf 1699,4 m
529: 350 m NW (304) Hocheiskopf 1699,4 m
530: 420 m NW (308) Hocheiskopf 1699,4 m
1020 m NO (35) Mittereis-Diensthütte
531: 550 m NW (303) Hocheiskopf 1699,4 m
980 m NNO (27) Mittereis-Diensthütte

- 532: 1250 m NNO (24) Wimbachschloß, trigonometrischer Punkt
1150 m NNW (327) Schüttalpel-Diensthütte
760 m ONO (75) Kitzkartauern 1647,0 m
- 533: 1220 m NNO (21) Wimbachschloß, trigonometrischer Punkt
680 m ONO (73) Kitzkartauern 1647,0 m
- 534: 1210 m NNO (19) Wimbachschloß, trigonometrischer Punkt
650 m ONO (71) Kitzkartauern 1647,0 m
- 535: 1160 m NNO (19) Wimbachschloß, trigonometrischer Punkt
620 m ONO (75) Kitzkartauern 1647,0 m
- 536: 1090 m NNO (17) Wimbachschloß, trigonometrischer Punkt
570 m O (80) Kitzkartauern 1647,0 m
- 537: 1060 m NNO (19) Wimbachschloß, trigonometrischer Punkt
570 m O (83) Kitzkartauern 1647,0 m
- 538: 990 m NNO (17) Wimbachschloß, trigonometrischer Punkt
520 m O (89) Kitzkartauern 1647,0 m
- 539: 240 m N (351) Lahnwald-Diensthütte
- 540: 350 m N (352) Lahnwald-Diensthütte
- 541: 480 m NNW (338) Lahnwald-Diensthütte
640 m ONO (67) Punkt 1180
- 542: 520 m NNW (332) Lahnwald-Diensthütte
600 m ONO (62) Punkt 1180
- 543: 250 m SO (127) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
- 544: 420 m SO (128) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
460 m NNO (27) Kehre
- 545: 430 m SO (138) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
380 m NNO (25) Kehre
- 546: 480 m SO (137) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
370 m NNO (31) Kehre
- 547: 530 m SO (141) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
320 m NO (39) Kehre
- 548: 850 m SO (143) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
390 m O (93) Kehre
- 549: 930 m SO (141) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
470 m O (97) Kehre
- 550: 870 m NO (34) Ofental-Diensthütte
530 m OSO (109) Kehre
- 551: 820 m NO (37) Ofental-Diensthütte
560 m OSO (115) Kehre
- 552: 930 m NNW (337) Schüttalpel-Diensthütte
990 m O (85) Kitzkartauern 1647,0 m

- 553: 960 m NNW (341) Schüttalpel-Diensthütte
1040 m O (82) Kitzkartauern 1647,0 m
- 554: 960 m NNW (347) Schüttalpel-Diensthütte
1150 m O (82) Kitzkartauern 1647,0 m
- 555: 920 m NNW (347) Schüttalpel-Diensthütte
1140 m O (84) Kitzkartauern 1647,0 m
- 556: 860 m NNW (342) Schüttalpel-Diensthütte
1090 m O (88) Kitzkartauern 1647,0 m
- 557: 780 m NNW (344) Schüttalpel-Diensthütte
1130 m O (91) Kitzkartauern 1647,0 m
- 558: 840 m N (349) Schüttalpel-Diensthütte
1200 m O (88) Kitzkartauern 1647,0 m
- 559: 810 m N (351) Schüttalpel-Diensthütte
1230 m O (89) Kitzkartauern 1647,0 m
- 560: 670 m NNW (348) Schüttalpel-Diensthütte
1220 m O (95) Kitzkartauern 1647,0 m
- 561: 660 m NNW (345) Schüttalpel-Diensthütte
1190 m O (97) Kitzkartauern 1647,0 m
- 562: 550 m NNW (343) Schüttalpel-Diensthütte
1220 m OSO (102) Kitzkartauern 1647,0 m
- 563: 440 m N (350) Schüttalpel-Diensthütte
1320 m OSO (105) Kitzkartauern 1647,0 m
- 564: 960 m NNW (334) Schüttalpel-Diensthütte
940 m O (85) Kitzkartauern 1647,0 m
- 565: 880 m NNW (333) Schüttalpel-Diensthütte
940 m O (90) Kitzkartauern 1647,0 m
- 566: 830 m NW (325) Schüttalpel-Diensthütte
1070 m NO (38) Wimbachschloß, trigonometrischer Punkt
- 567: 800 m NW (318) Schüttalpel-Diensthütte
970 m NO (39) Wimbachschloß, trigonometrischer Punkt
- 568: 1000 m NW (305) Schüttalpel-Diensthütte
800 m NNO (23) Wimbachschloß, trigonometrischer Punkt
- 569: 330 m O (97) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 570: 280 m O (100) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 571: 200 m ONO (74) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 572: 160 m NO (55) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 573: 30 m W (276) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 574: 120 m W (271) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 575: 200 m W (277) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 576: 220 m W (266) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 577: 230 m W (258) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel

- 578: 320 m WSW (247) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
180 m NO (39) Kapelle St. Johann und Paul
- 579: 240 m SSW (207) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 580: 210 m S (189) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 581: 50 m WNW (296) St. Bartholomä, Forsthaus
- 582: 130 m W (259) St. Bartholomä, Forsthaus
- 583: 230 m SO (127) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 584: 180 m SO (130) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 585: 170 m SSO (157) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 586: 270 m SSO (166) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 587: 330 m S (169) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
480 m O (97) Kapelle St. Johann und Paul
- 588: 360 m S (173) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
460 m OSO (101) Kapelle St. Johann und Paul
- 589: 210 m SW (217) St. Bartholomä, Forsthaus
- 590: 200 m SSW (206) St. Bartholomä, Forsthaus
- 591: 300 m SSW (194) St. Bartholomä, Forsthaus
- 592: 420 m SSW (191) St. Bartholomä, Forsthaus
170 m NNW (348) Bootshaus
- 593: 520 m SSW (194) St. Bartholomä, Forsthaus
110 m NW (311) Bootshaus
- 594: 640 m SSW (205) St. Bartholomä, Forsthaus
220 m W (268) Bootshaus
- 595: 420 m SSO (166) St. Bartholomä, Forsthaus
350 m W (260) Futterstelle Raitl, Stadel
- 596: 500 m S (175) St. Bartholomä, Forsthaus
130 m NO (45) Bootshaus
- 597: 610 m SSW (191) St. Bartholomä, Forsthaus
70 m WSW (252) Bootshaus
- 598: 640 m SSW (192) St. Bartholomä, Forsthaus
90 m WSW (242) Bootshaus
- 599: 690 m S (190) St. Bartholomä, Forsthaus
120 m SW (215) Bootshaus
- 600: 770 m SSW (193) St. Bartholomä, Forsthaus
210 m SW (217) Bootshaus
- 601: 810 m SSW (191) St. Bartholomä, Forsthaus
240 m SSW (205) Bootshaus
- 602: 850 m SSW (193) St. Bartholomä, Forsthaus
930 m SO (139) Kapelle St. Johann und Paul
- 603: 890 m SSW (195) St. Bartholomä, Forsthaus
920 m SO (143) Kapelle St. Johann und Paul

- 604: 910 m SSW (199) St. Bartholomä, Forsthaus
890 m SSO (147) Kapelle St. Johann und Paul
- 605: 930 m SSW (200) St. Bartholomä, Forsthaus
880 m SSO (148) Kapelle St. Johann und Paul
- 606: 910 m SSW (205) St. Bartholomä, Forsthaus
820 m SSO (150) Kapelle St. Johann und Paul
- 607: 970 m SSW (207) St. Bartholomä, Forsthaus
800 m SSO (155) Kapelle St. Johann und Paul
- 608: 1040 m SSW (211) St. Bartholomä, Forsthaus
810 m SSO (162) Kapelle St. Johann und Paul
- 609: 1040 m SW (213) St. Bartholomä, Forsthaus
770 m SSO (164) Kapelle St. Johann und Paul
- 610: 950 m SW (215) St. Bartholomä, Forsthaus
700 m SSO (160) Kapelle St. Johann und Paul
- 611: 890 m SW (215) St. Bartholomä, Forsthaus
660 m SSO (155) Kapelle St. Johann und Paul
- 612: 810 m SW (223) St. Bartholomä, Forsthaus
530 m SSO (154) Kapelle St. Johann und Paul
- 613: 720 m SW (231) St. Bartholomä, Forsthaus
410 m SSO (146) Kapelle St. Johann und Paul
- 614: 570 m SW (225) St. Bartholomä, Forsthaus
480 m SO (126) Kapelle St. Johann und Paul
- 615: 180 m N (356) St. Bartholomä, Forsthaus
- 616: 640 m SSW (196) St. Bartholomä, Forsthaus
140 m W (258) Bootshaus
- 617: 610 m SSW (205) St. Bartholomä, Forsthaus
220 m W (278) Bootshaus
- 618: 630 m SSW (208) St. Bartholomä, Forsthaus
260 m W (277) Bootshaus
- 619: 490 m S (179) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
470 m OSO (118) Kapelle St. Johann und Paul
- 620: 400 m S (187) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
390 m OSO (111) Kapelle St. Johann und Paul
- 621: 350 m SSW (195) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
320 m OSO (102) Kapelle St. Johann und Paul
- 622: 150 m WNW (288) Kapelle St. Johann und Paul
- 623: 220 m WNW (294) Kapelle St. Johann und Paul
- 624: 290 m WNW (297) Kapelle St. Johann und Paul
- 625: 360 m WNW (287) Kapelle St. Johann und Paul
130 m NO (51) Abzweigung

- 626: 410 m WNW (283) Kapelle St. Johann und Paul
80 m NNO (27) Abzweigung
- 627: 350 m W (269) Kapelle St. Johann und Paul
- 628: 490 m W (276) Kapelle St. Johann und Paul
60 m WNW (292) Abzweigung
- 629: 530 m W (277) Kapelle St. Johann und Paul
100 m WNW (295) Abzweigung
- 630: 650 m WNW (289) Kapelle St. Johann und Paul
760 m N (10) Punkt 1444
- 631: 660 m WNW (291) Kapelle St. Johann und Paul
780 m N (10) Punkt 1444
- 632: 700 m WNW (287) Kapelle St. Johann und Paul
740 m N (5) Punkt 1444
- 633: 720 m WNW (283) Kapelle St. Johann und Paul
700 m N (3) Punkt 1444
- 634: 720 m W (277) Kapelle St. Johann und Paul
620 m N (2) Punkt 1444
- 635: 800 m W (274) Kapelle St. Johann und Paul
600 m N (355) Punkt 1444
- 636: 860 m W (269) Kapelle St. Johann und Paul
520 m NNW (347) Punkt 1444
- 637: 920 m W (268) Kapelle St. Johann und Paul
530 m NNW (340) Punkt 1444
- 638: 920 m W (264) Kapelle St. Johann und Paul
470 m NNW (339) Punkt 1444
- 639: 950 m W (260) Kapelle St. Johann und Paul
420 m NNW (333) Punkt 1444
- 640: 870 m W (259) Kapelle St. Johann und Paul
390 m NNW (343) Punkt 1444
- 641: 220 m NW (309) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 642: 280 m WNW (296) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 643: 380 m WNW (298) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
450 m N (10) Kapelle St. Johann und Paul
- 644: 460 m WNW (299) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
490 m N (1) Kapelle St. Johann und Paul
- 645: 1390 m SSW (196) Archenkanzel
560 m W (278) Punkt 605,1
- 646: 1380 m SSW (199) Archenkanzel
630 m W (280) Punkt 605,1
- 647: 1410 m SSW (200) Archenkanzel
670 m W (279) Punkt 605,1

- 648: 1400 m SSW (203) Archenkanzel
740 m W (280) Punkt 605,1
- 649: 1390 m SSW (206) Archenkanzel
800 m WNW (282) Punkt 605,1
- 650: 1410 m SSW (208) Archenkanzel
850 m WNW (282) Punkt 605,1
- 651: 1470 m SSW (209) Archenkanzel
880 m W (278) Punkt 605,1
- 652: 1460 m SSW (206) Archenkanzel
820 m W (277) Punkt 605,1
- 653: 1090 m S (178) Archenkanzel
600 m SO (131) Punkt 1088
- 654: 1040 m S (180) Archenkanzel
540 m SO (130) Punkt 1088
- 655: 1010 m S (180) Archenkanzel
520 m SO (128) Punkt 1088
- 656: 970 m S (182) Archenkanzel
460 m SO (127) Punkt 1088
- 657: 990 m S (185) Archenkanzel
440 m SO (131) Punkt 1088
- 658: 1040 m S (186) Archenkanzel
450 m SO (138) Punkt 1088
- 659: 1130 m S (187) Archenkanzel
450 m NW (314) Punkt 605,1
- 660: 1110 m S (190) Archenkanzel
480 m NW (312) Punkt 605,1
- 661: 1100 m SSW (191) Archenkanzel
530 m NW (311) Punkt 605,1
- 662: 1110 m SSW (195) Archenkanzel
570 m NW (308) Punkt 605,1
- 663: 1270 m S (185) Archenkanzel
310 m WNW (299) Punkt 605,1
- 664: 1250 m S (187) Archenkanzel
370 m WNW (299) Punkt 605,1
- 665: 1250 m S (188) Archenkanzel
390 m WNW (298) Punkt 605,1
- 666: 1210 m SSW (191) Archenkanzel
460 m WNW (299) Punkt 605,1
- 667: 1170 m SSW (193) Archenkanzel
520 m WNW (302) Punkt 605,1

- 668: 1170 m SSW (199) Archenkanzel
620 m WNW (299) Punkt 605,1
- 669: 1140 m SSW (199) Archenkanzel
650 m WNW (301) Punkt 605,1
- 670: 1190 m SSW (203) Archenkanzel
730 m WNW (297) Punkt 605,1
- 671: 1260 m SSW (203) Archenkanzel
720 m WNW (291) Punkt 605,1
- 672: 670 m WNW (295) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
580 m NNW (340) Kapelle St. Johann und Paul
- 673: 680 m WNW (292) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
560 m NNW (337) Kapelle St. Johann und Paul
- 674: 620 m WNW (290) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
510 m NNW (341) Kapelle St. Johann und Paul
- 675: 560 m WNW (287) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
450 m NNW (343) Kapelle St. Johann und Paul
- 676: 130 m O (91) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 677: 150 m S (175) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 678: 160 m S (184) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 679: 140 m SSW (194) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 680: 130 m SW (229) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 681: 180 m WSW (256) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 682: 200 m SW (233) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 683: 290 m SW (235) St. Bartholomä, Wildfütterung, Stadel
- 684: 210 m WSW (255) St. Bartholomä, Forsthaus
- 685: 280 m SW (227) St. Bartholomä, Forsthaus
- 686: 320 m SW (221) St. Bartholomä, Forsthaus
- 687: 400 m SSW (210) St. Bartholomä, Forsthaus
280 m NNW (327) Bootshaus
- 688: 460 m SSW (205) St. Bartholomä, Forsthaus
230 m NW (317) Bootshaus
- 689: 740 m SSW (199) St. Bartholomä, Forsthaus
240 m WSW (238) Bootshaus
- 690: 790 m SSW (198) St. Bartholomä, Forsthaus
830 m SO (140) Kapelle St. Johann und Paul
- 691: 60 m N (10) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 692: 140 m N (3) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 693: 190 m N (359) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 694: 190 m NNW (345) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 695: 190 m NNW (327) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
- 696: 270 m NW (323) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation

- 697: 370 m NW (319) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
698: 390 m NW (305) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
699: 620 m NW (303) Mittlerer Hirschenlauf, Punkt 1520
860 m NO (51) Punkt 1471
700: 610 m NW (313) Mittlerer Hirschenlauf, Punkt 1520
970 m NO (50) Punkt 1471
701: 630 m NW (316) Mittlerer Hirschenlauf, Punkt 1520
1000 m NO (49) Punkt 1471
702: 610 m NW (321) Mittlerer Hirschenlauf, Punkt 1520
1060 m NO (50) Punkt 1471
703: 550 m NNW (327) Mittlerer Hirschenlauf, Punkt 1520
1110 m NO (53) Punkt 1471
704: 780 m S (182) Priesberg-Alm, Punkt 1460
390 m SW (221) Quelle
705: 690 m S (180) Priesberg-Alm, Punkt 1460
310 m SW (228) Quelle
706: 650 m S (173) Priesberg-Alm, Punkt 1460
210 m SW (221) Quelle
707: 600 m S (171) Priesberg-Alm, Punkt 1460
170 m SW (231) Quelle
708: 640 m NO (37) Gotzenthal-Diensthütte
270 m SO (143) Punkt 1160
709: 760 m NO (41) Gotzenthal-Diensthütte
320 m OSO (118) Punkt 1160
710: 790 m NO (44) Gotzenthal-Diensthütte
360 m OSO (117) Punkt 1160
711: 840 m NO (47) Gotzenthal-Diensthütte
420 m OSO (111) Punkt 1160
712: 930 m NO (46) Gotzenthal-Diensthütte
450 m O (99) Punkt 1160
713: 800 m ONO (59) Gotzenthal-Diensthütte
540 m SO (123) Punkt 1160
714: 780 m ONO (62) Gotzenthal-Diensthütte
590 m SO (128) Punkt 1160
715: 750 m ONO (65) Gotzenthal-Diensthütte
600 m SO (131) Punkt 1160
716: 770 m O (80) Gotzenthal-Diensthütte
790 m SO (138) Punkt 1160
717: 690 m ONO (72) Gotzenthal-Diensthütte
670 m SO (140) Punkt 1160

- 718: 660 m N (3) Gotzenthal-Diensthütte
200 m WSW (249) Punkt 1160
- 719: 680 m N (1) Gotzenthal-Diensthütte
220 m W (258) Punkt 1160
- 720: 750 m N (359) Gotzenthal-Diensthütte
220 m W (277) Punkt 1160
- 721: 800 m N (357) Gotzenthal-Diensthütte
270 m WNW (285) Punkt 1160
- 722: 840 m N (355) Gotzenthal-Diensthütte
310 m WNW (291) Punkt 1160
- 723: 890 m N (357) Gotzenthal-Diensthütte
310 m WNW (301) Punkt 1160
- 724: 950 m N (3) Gotzenthal-Diensthütte
270 m NW (323) Punkt 1160
- 725: 250 m N (349) Gotzenthal-Diensthütte
- 726: 420 m NNW (341) Gotzenthal-Diensthütte
480 m SW (227) Punkt 1160
- 727: 670 m NNO (13) Gotzenthal-Diensthütte
100 m SW (224) Punkt 1160
- 728: 650 m NNO (16) Gotzenthal-Diensthütte
110 m SSW (203) Punkt 1160
- 729: 1040 m NNO (19) Gotzenthal-Diensthütte
180 m WNW (289) Abzweigung
- 730: 1010 m NNO (14) Gotzenthal-Diensthütte
270 m WNW (282) Abzweigung
- 731: 1020 m N (9) Gotzenthal-Diensthütte
360 m WNW (281) Abzweigung
- 732: 1030 m N (9) Gotzenthal-Diensthütte
350 m WNW (285) Abzweigung
- 733: 1050 m N (7) Gotzenthal-Diensthütte
380 m WNW (288) Abzweigung
- 734: 1060 m N (3) Gotzenthal-Diensthütte
460 m WNW (287) Abzweigung
- 735: 1060 m N (1) Gotzenthal-Diensthütte
510 m WNW (285) Abzweigung
- 736: 1080 m N (1) Gotzenthal-Diensthütte
510 m WNW (287) Abzweigung
- 737: 370 m NO (41) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
710 m OSO (104) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation
- 738: 370 m NNO (25) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
620 m OSO (101) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation

- 739: 400 m NNO (25) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
620 m O (99) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation
- 740: 380 m NNO (17) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
570 m O (99) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation
- 741: 360 m N (11) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
530 m OSO (101) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation
- 742: 410 m N (10) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
530 m O (95) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation
- 743: 440 m N (0) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
460 m O (92) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation
- 744: 500 m N (359) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
450 m O (84) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation
- 745: 540 m N (353) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
390 m O (78) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation
- 746: 570 m NNW (344) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
310 m ONO (73) Kessel, verfallene Seilbahn, Talstation
- 747: 440 m S (171) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
130 m SW (233) Punkt 1240
- 748: 400 m S (177) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
160 m WSW (256) Punkt 1240
- 749: 340 m S (190) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
230 m W (276) Punkt 1240
- 750: 310 m SSW (211) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
340 m WNW (285) Punkt 1240
- 751: 330 m SW (220) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
400 m WNW (285) Punkt 1240
- 752: 370 m SW (225) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
450 m WNW (284) Punkt 1240
- 753: 370 m SW (229) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
470 m WNW (285) Punkt 1240
- 754: 450 m SW (231) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
150 m N (2) Punkt 858
- 755: 510 m WSW (241) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
220 m NNW (337) Punkt 858
- 756: 580 m WSW (254) Kessel, verfallene Seilbahn, Bergstation
340 m NW (324) Punkt 858
- 757: 120 m ONO (73) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
- 758: 260 m ONO (69) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
- 759: 380 m ONO (65) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
380 m NW (323) Punkt 1330

- 760: 530 m NO (50) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
510 m NNW (341) Punkt 1330
- 761: 420 m ONO (65) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
370 m NNW (329) Punkt 1330
- 762: 420 m OSO (105) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
170 m W (279) Punkt 1330
- 763: 430 m OSO (120) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
210 m WSW (248) Punkt 1330
- 764: 460 m SO (139) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
340 m SW (231) Punkt 1330
- 765: 390 m SSO (151) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
430 m WSW (241) Punkt 1330
- 766: 660 m SO (143) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
450 m NO (55) Punkt 1132
- 767: 530 m O (99) Schapbach-Alm, südlicher Kaser
80 m NW (323) Punkt 1330
- 768: 230 m WSW (255) Grubermahd-Diensthütte
- 769: 660 m SSO (155) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
170 m ONO (67) Kehre
- 770: 760 m SSO (156) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
180 m O (100) Kehre
- 771: 60 m SO (141) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
- 772: 820 m NNW (327) Lahnwald-Diensthütte
500 m SW (225) Kehre
- 773: 1350 m NNW (341) Lahnwald-Diensthütte
430 m NW (304) Kehre
- 774: 610 m N (353) Lahnwald-Diensthütte
820 m ONO (59) Punkt 1180
- 775: 280 m WSW (251) Hirschbichtal, Wildfütterung, Stadel
- 776: 500 m SW (235) Hocheiskopf 1699,4 m
840 m SSO (159) Hirschlache
- 777: 490 m SW (235) Hocheiskopf 1699,4 m
840 m SSO (158) Hirschlache
- 778: 710 m O (92) Diensthütte Wasser-Alm
70 m NO (50) Punkt 1455
- 779: 700 m O (90) Diensthütte Wasser-Alm
80 m NNO (32) Punkt 1455
- 780: 710 m O (88) Diensthütte Wasser-Alm
110 m NNO (31) Punkt 1455
- 781: 750 m O (83) Diensthütte Wasser-Alm
190 m NNO (27) Punkt 1455

- 782: 720 m O (80) Diensthütte Wasser-Alm
210 m NNO (14) Punkt 1455
- 783: 740 m ONO (74) Diensthütte Wasser-Alm
290 m N (11) Punkt 1455
- 784: 760 m ONO (71) Diensthütte Wasser-Alm
340 m N (11) Punkt 1455
- 785: 790 m W (258) Röthbach, Punkt 1240
190 m S (185) Punkt 1362
- 786: 820 m W (263) Röthbach, Punkt 1240
150 m SSW (199) Punkt 1362
- 787: 760 m W (264) Röthbach, Punkt 1240
110 m S (180) Punkt 1362
- 788: 730 m W (271) Röthbach, Punkt 1240
30 m OSO (115) Punkt 1362
- 789: 610 m W (277) Röthbach, Punkt 1240
160 m ONO (75) Punkt 1362
- 790: 530 m W (280) Röthbach, Punkt 1240
440 m SSW (197) Punkt 703
- 791: 580 m W (273) Röthbach, Punkt 1240
520 m SSW (199) Punkt 703
- 792: 640 m W (271) Röthbach, Punkt 1240
120 m O (99) Punkt 1362
- 793: 640 m W (268) Röthbach, Punkt 1240
140 m OSO (112) Punkt 1362
- 794: 560 m W (266) Röthbach, Punkt 1240
210 m OSO (109) Punkt 1362
- 795: 90 m NNW (335) Diensthütte Wasser-Alm
- 796: 220 m N (357) Diensthütte Wasser-Alm
- 797: 250 m N (353) Diensthütte Wasser-Alm
- 798: 100 m WSW (237) Wasserberg 1487 m
- 799: 80 m S (183) Wasserberg 1487 m
- 800: 20 m OSO (120) Wasserberg 1487 m
- 801: 50 m OSO (107) Wasserberg 1487 m
- 802: 190 m OSO (121) Wasserberg 1487 m
- 803: 250 m OSO (121) Wasserberg 1487 m
- 804: 310 m OSO (101) Wasserberg 1487 m
- 805: 420 m O (79) Wasserberg 1487 m
150 m O (90) Punkt 1340
- 806: 300 m O (86) Wasserberg 1487 m
- 807: 500 m ONO (75) Wasserberg 1487 m
410 m NW (305) Punkt 1548

808:	100 m	SO	(131)	Röthbach, Punkt 1240
809:	80 m	S	(171)	Röthbach, Punkt 1240
810:	30 m	SO	(140)	Röthbach, Punkt 1240
811:	130 m	ONO	(66)	Röthbach, Punkt 1240
812:	150 m	ONO	(63)	Röthbach, Punkt 1240
813:	210 m	ONO	(57)	Röthbach, Punkt 1240
814:	310 m	NO	(49)	Röthbach, Punkt 1240
815:	410 m	NO	(40)	Röthbach, Punkt 1240
	370 m	O	(82)	Röthbach, Punkt 820
816:	460 m	NNO	(32)	Röthbach, Punkt 1240
	370 m	ONO	(70)	Röthbach, Punkt 820
817:	320 m	NNO	(26)	Röthbach, Punkt 820
818:	260 m	NNO	(17)	Röthbach, Punkt 820
819:	150 m	N	(359)	Röthbach, Punkt 820
820:	230 m	NNW	(348)	Röthbach, Punkt 820
821:	200 m	N	(9)	Fischunkel, Punkt 703
822:	310 m	N	(6)	Fischunkel, Punkt 703
823:	520 m	NNW	(334)	Pletzgraben, Punkt 831
	270 m	WSW	(253)	Quelle
824:	560 m	NNW	(337)	Pletzgraben, Punkt 831
	240 m	W	(263)	Quelle
825:	580 m	N	(350)	Pletzgraben, Punkt 831
	130 m	WNW	(282)	Quelle
826:	670 m	N	(357)	Pletzgraben, Punkt 831
	150 m	NNW	(332)	Quelle
827:	660 m	N	(359)	Pletzgraben, Punkt 831
	120 m	NNW	(343)	Quelle
828:	660 m	N	(9)	Pletzgraben, Punkt 831
	130 m	NO	(35)	Quelle
829:	690 m	NNO	(14)	Pletzgraben, Punkt 831
	190 m	NO	(47)	Quelle
830:	660 m	NNO	(15)	Pletzgraben, Punkt 831
	170 m	ONO	(57)	Quelle
831:	540 m	NNO	(12)	Pletzgraben, Punkt 831
	90 m	OSO	(106)	Quelle
832:	400 m	NNW	(344)	Pletzgraben, Punkt 831
	210 m	SW	(219)	Quelle
833:	360 m	N	(354)	Pletzgraben, Punkt 831
	200 m	SSW	(199)	Quelle
834:	420 m	N	(8)	Pletzgraben, Punkt 831
	140 m	SSO	(165)	Quelle

- 835: 470 m NNO (13) Pletzgraben, Punkt 831
120 m SO (139) Quelle
- 836: 440 m NNO (24) Pletzgraben, Punkt 831
200 m SO (134) Quelle
- 837: 420 m NNO (29) Pletzgraben, Punkt 831
250 m SO (137) Quelle
- 838: 480 m NO (41) Pletzgraben, Punkt 831
330 m OSO (122) Quelle
- 839: 540 m NO (43) Pletzgraben, Punkt 831
370 m OSO (114) Quelle
- 840: 530 m NO (36) Pletzgraben, Punkt 831
310 m OSO (112) Quelle
- 841: 220 m NNW (328) Diensthütte Vogelhütte
- 842: 180 m WSW (249) Diensthütte Vogelhütte
- 843: 130 m W (265) Diensthütte Vogelhütte
- 844: 70 m NNO (19) Diensthütte Vogelhütte
- 845: 100 m SW (223) Diensthütte Vogelhütte
- 846: 120 m SW (214) Diensthütte Vogelhütte
- 847: 170 m SSW (208) Diensthütte Vogelhütte
- 848: 210 m SSW (205) Diensthütte Vogelhütte
- 849: 250 m S (188) Diensthütte Vogelhütte
- 850: 320 m S (179) Diensthütte Vogelhütte
- 851: 290 m SSO (147) Diensthütte Vogelhütte
- 852: 320 m NW (304) Diensthütte Vogelhütte
- 853: 320 m WNW (293) Diensthütte Vogelhütte
- 854: 320 m W (273) Diensthütte Vogelhütte
- 855: 350 m W (277) Diensthütte Vogelhütte
- 856: 380 m WNW (287) Diensthütte Vogelhütte
- 857: 370 m N (11) Jennerbahn-Mittelstation, trigonometrischer Punkt
480 m OSO (120) Punkt 900
- 858: 500 m NNO (15) Jennerbahn-Mittelstation, trigonometrischer Punkt
480 m OSO (104) Punkt 900
- 859: 480 m NNO (25) Jennerbahn-Mittelstation, trigonometrischer Punkt
560 m OSO (107) Punkt 900
- 860: 510 m NNO (24) Jennerbahn-Mittelstation, trigonometrischer Punkt
560 m OSO (104) Punkt 900
- 861: 560 m N (7) Jennerbahn-Mittelstation, trigonometrischer Punkt
410 m O (96) Punkt 900
- 862: 600 m N (359) Jennerbahn-Mittelstation, trigonometrischer Punkt
330 m O (91) Punkt 900

- 863: 460 m N (356) Jennerbahn-Mittelstation, trigonometrischer Punkt
350 m OSO (115) Punkt 900
- 864: 100 m ONO (56) Diensthütte Wasser-Alm
- 865: 80 m O (85) Diensthütte Wasser-Alm
- 866: 150 m O (94) Diensthütte Wasser-Alm
- 867: 160 m O (78) Diensthütte Wasser-Alm
- 868: 200 m O (88) Diensthütte Wasser-Alm
- 869: 210 m OSO (112) Diensthütte Wasser-Alm
- 870: 250 m SO (139) Diensthütte Wasser-Alm
- 871: 1010 m ONO (68) Engert-Alm, Kaser
60 m SW (233) Kehre
- 872: 700 m O (95) Engert-Alm, Kaser
120 m ONO (67) Kehre
- 873: 420 m O (78) Engert-Alm, Kaser
90 m S (185) Brücke

Lebenslauf

Am 11. 7. 1952 wurde ich als Sohn des Bankangestellten Hans Storch und seiner Ehefrau Edeltraud Storch, geb. Zech, in München geboren. Von 1959 bis 1963 besuchte ich in München die Volksschule, anschließend bis 1972 das Humanistische Gymnasium am selben Ort.

Vom WS 1972/73 bis SS 1978 studierte ich an der Universität München Biologie und schloß das Studium am 25. 4. 1978 mit dem Diplom ab. Die Fächer der mündlichen Diplomprüfung waren Botanik, Zoologie und Bodenkunde; die Diplomarbeit erfolgte auf dem Gebiet der Vegetationskunde.

Von Juni 1978 bis Mai 1980 und von Oktober bis Dezember 1980 war ich als wissenschaftlicher Angestellter an der Lehrereinheit Vegetationskunde der Forstwissenschaftlichen Fakultät der Universität München tätig. Im SS 1981 nahm ich das Promotionsstudium am Fachbereich Biologie der Universität München auf; es wurde am 31. 7. 1984 abgeschlossen.

